

HERCVLIS
SAXONIÆ
MEDICINÆ
PROFESSORIS ORDINA-
RII PRIMARI IN ACADE-
MIA PATAVINA,
DE PULSIBVS

Tractatus absolutissimus,
OMNIBVS MEDICINÆ
STVDIOSIS APPRIME NECES-
sarius & utilis.

PRIORI NON SOLVM VBERIOR, SED
& tersior, ita vt alijs omnino ab ipso videatur.
REVISVS, EMACVLATVS ET INDICE
copioso instructus

A
PETRO VFFENBACHIO MED. D. REIPVBL. FRANCO-
furtensis Medico-Physico ordinario.



MDC

IV.

PROSTAT
In Nobilis Francofurti Paltheniana.
Cum gratia & privilegio Cesar. Maiest.



LECTORI CANDIDO ET BENEVOLO

Ti. 2. 1. 1. 1.

Petrus Vffenbach Medicus

QUOD de Indo quodam sigittandi arte celeberrimo scribitur, quod cum in bello captus & ab Alexandro Magno iussus, ut, ni mortem subire vellet, artis suæ specimen quam primum ederet, apertè recusauerit, veritus scilicet, ne, cum artē iam multis diebus non exercuisset, abertaret, & ita fama sua videtur indignus. Idem sane de præceptore meo Hercule Saxonia Medico excellentissimo, affirmari potest. Is etenim ne quid nomine suo famæque apud omnes perillustri minus dignum in lucem prodeat, omnibus viribus præuenire & auertere conatur.

Vix enim triennium iam elapsum est, cum tractatus de pulsibus, de vrinis ac de signis & symptomatibus febrium putridarum intra priuatos parietes ab eo dictatos publici iuris fecerim, quo adeo se offensus ait, ut nil iniocundius, nil molestius, nihilque acerbius a me pati potuerit.

Præterquam enim, quod in inscio illo & inconsulto hoc fecerim, sua etiam hæc scripta longe inferiora esse, quam ut prælo committi debuissent, ansamque ceu minus culta, minus ordinate, perfecte ac concinne tradita, præbitura sciolis male de se sentiendi, suamque famam corroderent.

Quorum sane primum quamuis negare non ausim, eo tamen animo me fecisse Deum ipsum ac concientiam meam testor, quo & reliqua eiusdem proxime antelapsis Nundinis prælo commisi, ut scilicet tibi, amice lector, virum hunc immortalitate dignum, quemque patris loco semper amo, notum facerem, eiusque scripta, quibus tamen, nemine etiam inuidente solus frui potuissem, communicarem.

Alterum vero, quod sua longe inferiora ait, quam ut lucem publicam videant, non libenter concesserim: habeant enim Græci, habeant Arabes & Latini, tam præci, quam recentiores suam laudem, hunc tamen tanti omnes ij mecum faciunt, quibus tractatunculas illas a me publicatas legete contigit (contigit autem plurimis, adeoque multis, ut omnia exemplaria ad vicimum fere sint distracta) ut inter præclarissimos totius mundi Medicos illum merito numerandum arbitrentur. Id quod etiam in causâ cõprimis fuit cur publicas lectiones eiusdem nunc demum ediderim, cum scilicet. viderē adeo ab omnibus effigitari, tantoque alios laborasse studio, ut præcepto istius Alexandri Massariæ cineres resuscitarent. Quo et ego animo diutius me continere potuerim, equidem non vidi, ni ingratitude macula notari voluerim.

Vt ut sit, quantum præceptotem meum a me offensus doleo, tantum e contra mihi ipsi gratulor, quod adeo in hoc lectori profuerim, ut iam secunda & tertienationi editione de pulsibus frui possit, quam, ne quid desideret, et ceteris eius operibus adiunxi.

Tum itaque amice Lector, erit promptitudinem hanc meam agnoscere, itaque autotis, si qua forte adhuc erga me feruet tua intercessione contemperate, quod sane eo libentius feceris, cum in Montagnana emaculando nouaq; veste induendo, tota hac æstare sudauerim, saltem ut bibliothecam tuam de die in diem amplificarem.

Faxit Deus Opt. Max. ut quemadmodum mentem desiderio inservitendi omnibus flagrantem gero, ita in primis erga hunc virum, ceterosque in toto studiorum cursu suame sedulitate informarunt omnes, re ipsa gratus existere queam. Vale.

Francos. Calend. Septembr. Anno 1603.

(1) 9



IN
PERILLVSTRIS,
Et Excellentissimi Viri
HERCVLIS SAXONIÆ,
Præceptoris semper Observantissimi,
LIBROS DE PULSIBUS
EPIGRAMMA.



S Cuius ingenio Phœbeos versere campos,
Vt noua Pæoniis germina fundat ager.
Sic veterum monumenta amant, cum Pierius Sol
Illustras clarys scriptis areclusa genis.
Mæla tulit, fecitque vigens Asclepeia Pillas
Hellenus, ut Medica floreant Artis honos.
At qui Atlanteos Coi penetrare recessus
Ausis, inaccessum quis superare nemum?
Quæve tuos Galene queat de Pulsibus amœnis
Vincere, seriffonis quin rapiatur aquis?
Multi vim secere libris, genioque sagaci,
Attamen AEsclepias vix subtere domos.
Illuxit tandem Medico clarissimus Orbi
SAXONIA, Atque gloria rara chori.
Hercule digna paras, Phœbea Pæonias arte
Vincis, Apollinea dum seris Artis opus.
Hesperidam sacros genio penetrant in Hortos,
Vidit sacrescens aurea poma manu.
Ecce tuum Galene chaos super axis, & or bem,
Hippocrates, genio tentat adire tuum.
Hic Asclepiadas dictus, calamoque superbo
Defricat, & saphico dogmata falsa sale.
Abstrusum en tentant opus, describere pulsus,
Cum tamen asperior non sit in Arte labor.
En pulsus palmare facit, quos prisca vetustas
Credidit incertis semper habere vicet.
Nunc pulsus mecum, & visa certissimus in dex,
Nunc pulsus morbo s indicat omnigenos.
O genium felix, cuius de fonte liquores
Ambrosii manant, Pieridumque dapeis.
Virtutis monumenta tua, nomenque manebunt,
Dum Sol flammiferus Astra rotabit equis.

Ludebas Claudius Deodatus Gebvreylenfis
Alfata, Philosoph. & Medic. Doct.



INDEX CAPITVM TRIVM LIBRORVM DE PVLSIBVS HERCVLIS SAXONIÆ PATAVINI. CAPITA PRIMI LIBRI.

Cap. I. DE praesentia contemplationis pulsuum. pag. 1	qualitas unius illius, in unica arteria sede.	32
II. De pulsuum nomine.	ibid. XXXIV. De pulsibus multis, ex parte rhythmici.	33
III. De pulsuum definitione.	2	ibid.
IV. De primis pulsuum differentiis.	10 XXXV. De celeritate, ac raritate, & rhythmi in	33
V. Virum inter pulsuum vehementem, & languidum, uno illis inaequalitate.		33
VI. Ex primis quing. pulsuum differentiis, quae magis, & quae minus proprie dicantur.		12
VII. De pulsibus calidis, & frigidis.	ibid.	
VIII. De pleno, & vacuo pulsibus secundum Gal. ibid.	Cap. I. De necessitate, & difficultate dignationis pulsuum.	39
IX. De pleno, & vacuo pulsibus propriis sententia.	14	
X. De compositis pulsuum differentiis.	ibid.	II. Quo ordine tractanda sit pulsuum dignatio
XI. De pulsibus inaequalibus in genere.	15	ibid.
XII. De inaequalitate Systematica in genere, & de inaequalitatibus aequaliter in specie.	ibid.	III. De diffinitione, atque libris partibus dignationis.
XIII. De his quibusdam inaequalitatibus inaequaliter, & de inaequalitate Systematica.	16	IV. De Symplicibus generis, & de Gal.
XIV. De intermittentibus, atque intercurrentibus pulsibus.	ibid.	V. De Symplicibus generis, & de Gal. doctrina, & de praesentia, & de celeritate, & de raritate, & de rhythmo.
XV. De inaequalitatibus disparibus in uno illis, atque in unica arteria parte.	ibid.	VI. De Symplicibus generis, & de Gal. doctrina, & de praesentia, & de celeritate, & de raritate, & de rhythmo.
XVI. De pulsibus in unica illis interruptis.	17	VII. De his, quae circa pulsuum differentias sunt dignationis in genere, & primo de moderatis, & immoderatis dignationibus.
XVII. De pulsibus recurrentibus secundum Gal.	18	IX. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XVIII. An pulsus Diacritici mali, vel curati fuerit comparati.	19	X. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XIX. Quis, & quotuplex sit Diacritus ex Gal.	21	XI. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XX. De inaequalitate diacritica partium arteriarum in una diffinitione.	23	XII. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXI. De continua unius pulsus inaequalitate, sub quibus duobus aequaliter fallit.	24	XIII. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXII. De inaequalitate in arteria sede.	25	XIV. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXIII. De pulsibus ordinatis, atque inordinatis.	ibid.	XV. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXIV. De Naturalibus pulsibus rhythmicis.	ibid.	XVI. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXV. De pulsibus Arhythmicis.	27	XVII. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXVI. De compositis inaequalitatibus in genere.	28	XVIII. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXVII. De compositis inaequalitatibus in specie.	ibid.	XIX. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXVIII. De pulsibus undulosis, & maculosis, atque For. morante.	29	XX. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXIX. De pulsibus Helicis.	ibid.	XXI. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXX. De pulsibus Sereptis.	30	XXII. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXXI. De quatuor pulsuum differentiis.	ibid.	XXIII. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXXII. De quatuor pulsuum differentiis, quae ex Pulsu Arthritico sunt.	ibid.	XXIV. De celeritate, ac raritate, & de superlativorum pulsuum dignatione.
XXXIII. De inaequalitatibus differentiis, ex parte inae-	31	



IN

PERILLVSTRIS,
Et Excellentissimi Viri
HERCVLIS SAXONIÆ,
Præceptoris semper Obſervantiſſimi,
LIBROS DE PULSIBVS
EPIGRAMMA.



*ICinus ingenio Phœbeos vertere campos,
Vt noua Pæoniæ germina fundat ager.
Sic veterum monumenta micant, enim Pierius Sol
Illustras clarys scripta reclusa genis.
Multa tulit, fecisque vicens Aſclepia Pollas
Huſſenius, vi Medica floreas Artus honos.*

*At quis Atlanteas Coi penetrare recessus
Ausus, inaccessum quis superare nemus?
Quirætuos Galenæ quæat de Pulsibus amnis
Vincere, terrisonis quin rapiatur aquis?
Multi vim fecere laboris, genioque sagaci,
At tamen AEsclepias vix subiere damos.
Iluxit tandem Medico clarissimus Orbi
SAXONIA, Atque gloria rara chori.
Hercule digna parat, Phœbea Pæonias arte
Vincit, Apollinea dum feris Artus opus.
Hesperidam sacros genio penetravit in Hortos,
Victricis referens aurea poma manu.
Ecce tuum Galenæ chaos super auit, & orbem,
Hippocrates, genio sensat adire tuum.
Hic Aſclepiadas dictis, calamoque superbus
Defricat, & sophico dogmata falsa sale.
Abstrusum en tentavit opus, describere pulsus,
Cum tamen asperior non sis in Arte labor.
En pulsus palmare facis, quos prisca vetustas
Credidit incertis semper habere vices.
Nunc pulsus necis, & vista certissimus in dex,
Nunc pulsus morbos indicat omni genos.
O genium felix, cuius de fonte liquores
Ambrosii manant, Pieridamque dapeis.
Virtutis monumenta tua, nomenque manebunt,
Dum Sol flammiferis Astrarotabis equis.*

*Ludebat Claudius Deodatus Gebvverlenſis
Alſata, Philoſoph. & Medic. Doct.*



INDEX CAPITVM
TRIVM LIBRORVM DE PVLSIBVS
HERCVLIS SAXONIÆ
PATAVINI.
CAPITA PRIMI LIBRI.

Cap. I. DE præstantia contemplationis pulsum. pag. 1	qualitatis vnius illius, in unica arteria sedo. 32
II. De pulsum nomine. ibid.	XXXIV. De pulsum inutilibus ex parte rhythmo- 32
III. De pulsum definitione. 2	rum. ibid.
IV. De primis pulsum differentis. 12	XXXV. De crebritate, ac raritate, & rythmi in 33
V. Viram inter pulsum vehementem, & languidum, vne illi inaequalitate. 33	
VI. Ex primis quing. pulsum differentis, quæ ma- 33	
gno, & quæ minus proprie dicantur. 32	
VII. De pulsu calido, & frigido. ibid.	
VIII. De plene, & vacue pulsu secundum Gal. ibid.	Cap. I. De necessitate, & difficultate dignationis pul- 39
IX. De plene & vacue pulsu propriis sententia. 14	sum. 39
X. De compositis, pulsum differentis. ibid.	II. Quæ ordine tractanda sit pulsum dignatio 39
XI. De pulsum inaequalibus in genere. 15	ibid.
XII. De inaequalitate Systematica in genere, & de 15	III. De diffinitione, atque illius partibus digne- 40
inaequalitibus æqualiter in specie. ibid.	scendo. 40
XIII. De abis quibusdam inaequalibus inaequaliter, 16	IV. De Systole & gnoscerda ex Gal. 41
inaequalitate systematica. 16	V. An systole ex Gal. de virna sit perceptibilis 42
XIV. De intermittentibus, atq. intercurrentibus pul- 16	VI. De systoles dignatione ex propria sententia, & 43
sibus. ibid.	de utriusque quævis dignatione. 43
XV. De inaequalibus disparibus in vno illi, atque 17	VII. Systoles dignationem fore nullius esse utilita- 44
unica arteria parte. ibid.	tis. 44
XVI. De pulsum in unico illi interruptis. 17	VIII. De iis, quæ circa pulsum differentias sunt 45
XVII. De pulsu recurrente secundum Gal. 18	dignoscenda in genere, & primo de moderati, & 45
XVIII. An pulsu Dicroti males, vel rariis rite 19	immoderati dignatione. 45
fuerit comparatiui. 19	IX. De comparatiuorum, & superlatiuorum pul- 45
XIX. Quis, & quotuplex sit Dicrotus ex Gal. 21	sum dignatione. 45
XX. De inaequalitate diuersarum partium arteria, 23	X. De pulsu morbo, & non morbo dignatione. 46
in vna diffinitione. 23	ibid.
XXI. De continuo vni pulsu inaequalitate, sub 24	XI. De differentiarum dignatione in specie, & pri- 47
varietate vni æqualiter facta. 24	mo magis parui, & specierum. 47
XXII. De inaequalitate in arteria sede. 25	XII. An longitudo, latitudo, & altitudo pulsu feor- 48
XXIII. De pulsu ordinate, ac quæmodo ordinate. ibid.	sim dignosci possint, & de longitudo, ac breuitate 48
XXIV. De Naturalibus pulsum rhythmi. ibid.	dignoscenda. 48
XXV. De pulsu Arithmi. 27	XIII. De latitudine, & altitudine dignoscenda 49
XXVI. De compositis inaequalibus in genere. 28	49
XXVII. De compositis inaequalibus in specie. ibid.	XIV. De celeris, tardis, ac moderati, celerioris at- 50
XXVIII. De pulsu vndoso, vermiforme, atq. Fer- 29	que tardioris pulsu dignatione. 50
micante. 29	XV. De frequentis, rari, moderati pulsu di- 51
XXIX. De pulsu Hellice. ibid.	gnatione. 51
XXX. De pulsu strepente. 30	XVI. De vehementis, ac languidi dignatione. 54
XXXI. De ignoti pulsum differentis. ibid.	XVII. De duri, ac molli pulsu dignatione. ibid.
XXXII. De Logici pulsum differentis, quæ ex 31	XVIII. De vacui, ac pleni pulsu dignatione. 55
usu Arrii non sunt. ibid.	XIX. De Rhythmorum dignoscendorum ratione 56
XXXIII. De inaequalibus differentis, ex parte ina- 56	

Capita Tertii Libri.

Cap. I. De pulsuum causis in genere.	18	XXXIV. Quomodo dua contraria qualia et eodem tempore simul reperiuntur.	20
II. De facultatu pulsuum.	19	XXXV. Quasi causa disparitatis inaequaliter facta in uno idem.	21
III. De languiderum pulsuum causis in genere ibid.		XXXVI. In quibus affectionibus disparis pulsus inaequaliter inueniuntur.	22
IV. De languide facultatu pulsuum ob exsolutionem.	20	XXXVII. De causis disparitatis aequaliter facta in unico idem.	24
V. De pulsibus facultatis aggravata.	21	XXXVIII. In quibus affectionibus fieri pulsus disparis aequaliter.	25
VI. De quodam dubio, atque eius solutione.	22	XXXIX. Quid sit febris inaequalitas.	26
VII. De pulsibus facultatis utroque modo affecta.	23	XL. De pulsuum interrupti causis.	27
VIII. De Abolitorum, atque omnium Myrorum degeneratione.	ibid.	XLI. Quasi dissolutum causis, & quae producantur modum.	29
IX. De aliorum omnium languiderum degeneratione.	24	XLII. De quibusdam Antis contra propositam sententiam & eorum dissolutione.	26
X. De causis gravantis distinctione, quas facultatis sequitur exsolutionem.	ibid.	XLIII. Quomodo interrupti pulsus causa distinguantur, ac causis Decretis.	28
XI. De mediatis causis propter quas Languor facultatis.	25	XLIV. Quomodo tam varie interruptorum ac durorum causa inter se distinguantur.	29
XII. An sit pulsus languidus inaequalis ex inaequaliter duobus temporibus.	26	XLV. De expectatione nonnullorum Galenicorum, & eorum resolutione.	ibid.
XIII. De mediatis causis propter quas suffocatur facultas.	27	XLVI. De altero quodam loco in 3. de prog. ex pulsibus.	33
XIV. Quomodo loci, causae affectionum proposita distinguantur, ac distinguantur pulsus.	28	XLVII. De quodam dubio, atque eius dissolutione.	ibid.
XV. Quae & quomplex sit osus.	29	XLVIII. De transgressionis collatione ex causa, & eorum resolutione.	31
XVI. De pulsuum differentis ex usu consuetudinibus.	ibid.	XLIX. Quomodo ex inaequalitate, aequaliter praesentibus pulsibus.	32
XVII. Aqua causae sit: magnitudo, celeritas atque densitas.	30	L. Quasi causa, & effectus uniusmodi disparitatis pulsuum in aere.	33
XVIII. Quasi mediae antea caloris causa. ib.		LI. De transgressionis pulsuum causis.	34
XIX. Quomodo antea caloris causa inter se distinguantur.	31	LII. De transgressionis pulsuum causis.	35
XX. An ex corde interpretato magni ac celeris red. de pulsibus pul.	ibid.	LIII. De transgressionis pulsuum causis.	36
XXI. Quasi celeritas autem calorem indicant.	32	LIV. De pulsibus affectionum animi, praecipue vero de amore.	37
XXII. Quasi celeritas praeter naturam hic pulsus sequatur.	33	LV. De pulsibus instrumentis in genere.	38
XXIII. De causis paritatis, carditatis, ac raritatis diaphoresi, tam mediatis, quam immediatis. ib.		LVI. De anti, ac motu pulsus causis mediatis, & immediatis.	ibid.
XXIV. Quomodo causa & effectus frigidi inter se distinguantur.	ibid.	LVII. In quibus aff. ibi. reperitur pulsus durus, ac molli.	ibid.
XXV. Quomodo distinguantur magni, & parvi pulsus, quos per naturam vel immutatio inter se distinguantur.	34	LVIII. Quomodo raritatis causa, & effectus inter se distinguantur.	39
XXVI. Quomodo singularium pulsuum proxima causae sit se distinguantur ex uniusmodi magnitudine, celeritate, parvo, raro, ac tarde.	ibid.	LIX. De causis, & affectionibus, plenis, & vacuis pulsibus.	40
XXVII. De pulsibus Systoles.	35	LX. An sit instrumentaria causa pulsus alios, lates, longos, & oppositi effectus, & pulsus.	41
XXVIII. De causis tam immediatis, quam mediatis, quae contrahunt parvas, ac tardas, ac carditatis, & eorum resolutione.	36	LI. De causis pulsuum magni, parvi, alti, & humilis, latus angustis, longis & brevis, ex instrumentis.	42
XXIX. De distinctione causarum nulla, vel diminuta substantia.	ibid.	LII. De figurarum & aequalium pulsuum causis, & instrumentis.	43
XXX. De pulsibus inaequalibus utrisque.	37	LIII. Quasi sit proprius pulsus inaequalis instrumentis, & ibi.	44
XXXI. Quasi inaequalium pulsuum causa, ex paritate.	ibid.	LIV. De uniusmodi pulsibus, quos inter se distinguantur.	45
XXXII. Quasi causa inaequalis pulsus in uno idem & in pluribus locis.	38	LXV. An duo inaequalis pulsus in uno idem tempore duritiae ac molitiae.	46
XXXIII. De secunda inaequalitatis causis, quae in duobus aeternis reperiuntur.	39	LXVI. De inaequalitatem ex causa, & eorum resolutione.	47
		LXVII. De causis inaequalitatis pulsuum plenis ac vacuis.	48

Index Capitulum

<i>LXIX. De compositorum pulsuum differentis in XCI. De strepente pulsus causis, ex propria sententia.</i>	118	119.	129
<i>LXX. Quid modis continentes causa inter se com-</i>	119	XCII.	De intermitentium compositorum causis. 140
<i>ponantur.</i>	119	XCIII.	De materia, loco, & affectionibus intermit-
<i>LXXI. De pulsuum ex facultatis cum usu complica-</i>	120	sentiam in accensio.	141
<i>tionis.</i>	120	ibid. XCIV.	Quomodo distinguantur intermitentium
<i>LXXII. De pulsuum Instrumenti & viti.</i>	121	causis inter se.	142
<i>LXXIII. De pulsuum facultatis & Instrumenti.</i>	121	XCIV.	De causis & affectionibus intercurrentium. 143
<i>LXXIV. De crasmodi continentes causarum com-</i>	122	ex unica affectione in variis predictis pulsibus. 144	
<i>plicata.</i>	122	ibid. XCV.	Quinam sunt omnium affectionum pulsuum
<i>LXXV. De albis humilibus, latius, angustis, longis, brevibus, & quibuslibet vitiis causis.</i>	123	causis. 145	
<i>LXXVI. De albis humilibus, latius, angustis, longis, brevibus, & quibuslibet vitiis causarum compositorum causis.</i>	123	XCIX.	De futurorum praesagio, & primo quantum
<i>LXXVII. Quomodo hi pulsus ex causis compositorum, ab-</i>	124	sine praesagio. da.	151
<i>his distinguantur, qui ex se sunt instrumenti. 124</i>	124	XCIX.	Quid sit modus, quo hac praesagiri possint. ibid.
<i>LXXVIII. De inaequalium pulsuum ex compositorum C. Ex quibusnam pulsibus morbi praedici possint, & pri-</i>	125	mo de languido ex dissolutione.	152
<i>ncipio ad eundem differens in genere.</i>	125	153	
<i>LXXIX. De compositorum causis inaequalium in vitiis C. De Vermiculorum praesagio.</i>	126	157	
<i>ibid.</i>	126	CII.	De Mynerorum praesagio. ibid.
<i>LXXX. De causis inaequalium pulsuum dispari-</i>	127	CIII.	De intermitentium praesagio. 154
<i>um vitiis illius, ex se propria sententia.</i>	127	CIV.	De Intercursum praesagio. 155
<i>LXXXI. De intercursum, & praecipue Capiti in-</i>	128	CV.	De intercurrentium praesagio. 157
<i>tu causis.</i>	128	CVI.	De intercurrentium praesagio. 158
<i>LXXXII. De decretis duri causis ex Galeno.</i>	129	CVII.	De praesagio disparium pulsuum in vitiis illius
<i>LXXXIII. Galeni opinio de decretis pulsuum examina-</i>	130	atque in accensio.	160
<i>tionis.</i>	130	CIX.	De vitiis pulsuum praesagio. 159
<i>LXXXIV. De decretis duri causis, & affectionibus, CIX.</i>	131	De decretis pulsuum praesagio. ibid.	
<i>ex propria sententia.</i>	131	CX.	De decretis praesagio. 160
<i>LXXXV. Quomodo in duro pulsuum tamen vibra-</i>	132	CXI.	De vibrati praesagio. ibid.
<i>ti, quam vibrato bina sunt pulsatio.</i>	132	CXII.	De Convulsus pulsuum praesagio. 161
<i>LXXXVI. De compositorum vitiis pulsuum causis.</i>	133	CXIII.	De Tremulis & palpitantibus pulsuum praesagio.
<i>LXXXVII. Quomodo proposita vitiis pulsuum affec-</i>	134	162	
<i>tionis inter se distinguantur.</i>	134	CXIV.	Quomodo ex pulsuum, morbi, aut salutis re-
<i>LXXXVIII. De decretis pulsuum causis, & affectionibus.</i>	135	pus praesagiri possint. ibid.	
<i>ibid.</i>	135	CXV.	Quid sit collisio, aut cruditas signi-
<i>LXXXIX. De compositorum omnium pulsuum causis.</i>	136	cent.	162
<i>LXXXX. De tremulis pulsuum causis.</i>	137	CXVI.	De pulsuum craticis. 163
<i>XC. De strepente pulsuum causis, ex aliorum senten-</i>	138	CXVII.	De pulsuum speciem crisi demonstranti-
<i>tia.</i>	138	bus.	164





DE PULSIBVS LIBER PRIMVS.

AVTHORE
HERCVLE SAXONIA
PATAVINO.

CAPVT I.

De præstantia contemplationis Pulsuum;



Contemplatione Pulsuum ne habet Ars medica quid præstan-
tus, nec magis necessarium, aut habebit vnquam. Quid enim ad-
mirabilis, quidue magis diuinum, quam vnica Arteriz morio-
ne, totius vitæ statum cognoscere, atque eiusdem gubernacula
temperare? Pulsus viralis facultatis robur, atque infirmitatem e-
docet, arteriz naturam aperit, caloris incrementa ac decremen-
ta declarat, humorum essentiam, copiam, qualitates, motus,
quietes, atq; locos insinuat: temperamentorum, habituum cor-
poris, ætatum, sexuumque discrimina ponit, Aeris conditionem,

*Præstantia
contempla-
tionis pulsu-
um.*

corporis & animi motus, somnos, vigilas, cibos, poriones, inanitiones, repletiones, at-
que Venerea demonstrat; Latentes morbos, causas, atque symptomata detegit, criticos
naturæ motus signat; eorum denique omnium, quæ in ægris futura sunt, fidus, certusque
est prænuncius. Pulsus illi sunt, à quibus portissimum viuendi ratio, sanguinis missio, pur-
gatio, atque aliz quæcunque vacuationes peti consueuerunt. Signa profecto omnium
honestissima, nobilissima, viris tantum doctis, atque ingeniosis dignissima: & quod ma-
gis est, omnium minime fallacia. Quicquid enim Celsus in oppositum hæc de re scriptum
reliquerit, pulsibus scilicet, tanquam fallaci signo minime esse fidendum, ego contrari-
am tueri partem cogor, pulsibus scilicet (si quis proprias illorum causas cognouerit, fa-
miliarefque probe inter se distinxerit) nil minus fallax haberi posse.

Arduum profecto est, singulas eorum differentias memoria tenere: adhuc magis o-
perosum, easdem dignoscere, omnium autem difficillimum, ex iisdem & præsentia scire,
& futura diuinare: Si tamen solers non abfuerit studium, non diligentia, non exercitatio,
sed iugis adfuerit labor, nil tandem tam arduum, tam difficile, tamque salubre erit,
quod non superari possit. Age igitur rem aggrediamur, & à nominali definitione initium
faciamus, vt deinde ad essentialem transeamus, mox ad differentias & dignotionem pro-
perabimus, tandem ad causas & præfagia sermonem conuertemus.

*Autoris in-
tentio.*

CAPVT II.

De Pulsuum nomine.

Pulsus nomen, antiquitus tripliciter acceptum inuenio: primo, pro cordis palpitatio-
ne: secundo, pro vehementi tantum arteriarum motu, qui oculis sit conspicuus: ter-
tio, pro

*triplex pul-
sum acci-
piunt.*

A

tio, pro

rio, pro eo cordis, & arteriarum motu, qui à generationis primordiis incipiens, ad vitæ vf. ^A que finem indefinenter perficitur. Nullam, ex hisce tribus significationibus ignorauit Hippoc. sed primam (Cuius auctorem facit Galen. *Egimium*) atque secundam, ipse ab his, qui ante illum fuerunt, acceperit, pro priisque scriptis inseruit; tertiam vero ipsemet auctor fuit: quam tamen nō excoluit aut perfecit: sed illo multo posteriores, Praxagoras primū, mox Herophilus, deinde Galenus, maximo studio amplexati sunt, absolutissimamq; reddiderūt. Hinc iure Gal. modo Hippocratem omnium primum facit, qui arteriarum motum pulsū vocauerit: modo eūdem, antiquo vsum fuisse vocabulo, scribit. Primus sane fuit, qui perennem omnium arteriarum motum, pulsū nuncuparet; non primus, qui palpitatiōi, vel motui oculis tantum conspicuo, nomen hoc, acceptum fertet.

Verba Gal. quæ libro illo, *quod animi mores sequantur corporis semper attentum*, ca. 2. scribit, illud aperte docent, quæ sic habent: *Venas, & ipsas arterias, veteres appellabant idē, sapius est ostensum, nondum tamen omnem arteriarum motum, pulsatum nominabant. sed cum solum, qui sensu ipso, ab homine plane vehementi perciperetur. At Hippoc. vtpote qui primus omnium consuetudini, quæ postea increbuit, iniitum dedit, omnium, quisquis esset, arteriarum motum, pulsatum nominauit.* Ex quibus verbis constat, Galenū voluisse, pulsū nomen, pro perenni arteriarum motu acceptum, ab Hippoc. fuisse adinuentum. vehementem vero, & oculis cōspicuum motum, fuisse antiquiorem, quo vsum esse Hippocrar. ex 2. *Epid. sectio. 5. in fine*, his verbis colligitur: *Cui vena, quæ in cubito est, pulsauerit, furiosus erit, & iracundus euadit, cui sensum mota fuerit, lentus.* Venæ nomine veterum more, vt antea dicebamus, arterias intelligit. ^C

Cæterum cordis palpitatiōem, & ab Hippoc. & à prius illis medicis, pulsū nomine donatam fuisse, ex 6. de placit. Hippoc. & Plat. 1. coll. girur. vbi Galen. hæc scripta reliquit: *Ex eodem enim est pulsuum agitatio, sed secundum naturam. Pulsus vero nomen in præsentia ita accipi velim, sicut Praxagoras, & Herophilus, atque omnes fere posteriores ad nostram vsque ætatem vsi sunt. Nam antiquior huiusce vocabuli vsui, vt in Erasistrati & Hippoc. scriptis videre licet, diuersus quidam est, de quo nonnulla postea dicemus. Cum ergo proprium cordis motum, nos pulsū appellamus, palpitatio affectus, in secunda significatiōe nominabitur, &c.* Ex dictis autem Galen. facile si bi ipsi conciliari potest, qui aliquando, vt 1. de puls. differ. scribit: *Omnium, igitur, quorum ad nos memoria peruenit, princeps nomen pulsus, Hippocras, iterū prædixit; Quandoque vero, vt 3. de Crisib. omnia, exceptis pulsibus, ab Hippoc. scripta fuisse dixit: Atque lib. de præcognit. ad 2. posthūmum 12. eum, nec attigisse quidem affirmauit. Facile inquam, conciliari potest: nam pulsus in tertia significatiōe accepti, nominis tantum fuit inuentor Hippoc. differentiarum vero, dignotionis, eausarum, atque præ sagii Galenus, ante Galen. Praxagoras, & Herophilus.*

Nos ergo prima, atque secunda pulsus notione prætermisā, huius tertie definitionem proponemus, quæ pro cordis, & arteriarum motu, à generationis primordiis, vsque ad vitæ finem persistente, accepta fuit.

CAPUT III.

De pulsuum definitione.

Etiam si plures sint pulsuum definitiones, à Gal. 4. de puls. diff. propositz. hanc tamen ^B tanquam reliquis omnibus absolutiorem, ab eo exceptam, ego libentissime quoque admitto, inquit tecipio: *Pulsus est dilatacio, & constructio cordis & arteriarū, à facultate pulsifica, ab calidi innati intellam, & spiritū animalium regenerationem. Dilatacio & constructio, sunt generis loco: Cor & arteria, sunt subiectum: facultas pulsifica, est causa efficiens; cætera finis loco subnectuntur.*

Quod ad genus attinet, non est quidem simplex, sed compositum, ex duplici motu, & quiete: dilatatio enim, seu diastole, est vnus motus: cōstrictio seu systole, secundus; post diastolen, antequam incipiat systole, est vna quies, exterior dicta: post systolen, est altera, interior nuncupata: genus itaque pulsus, est totum aggregatum, ex duplici motu, & duplici ^F quiete. De singulis quæsitum aliquando fuit, sintne vere actiones, nec ne? Quieres existimant plurimi, nil aliud esse, quam cessationes, ab actione, quod tamen minime admittendū: quanquam enim quietes nō sint motus, sunt tamē alicuius facultatis actiones, de qua postea

Hippoc. primus pulsū nominat.

Cordis palpitatio, quod nomen pulsus nomine donatur.

Quid pulsus

Cuius pulsus. Quæ quæ sunt actiones.

A postea differemus: quarum vtraque peculiarem quendam habet finem, cum motu illo conspirantem, cuius ipsa sit quies: sic enim externa perficit id, quod egit diastole, & interna explet, quod facit systole: Sūt ergo actiones, non tamen motus. Sed & systolen plurimi putarūt cessationem esse à motu, potius quàm motum; idque exemplo à respiratione deprompto, comprobare tentarunt: sicut enim docet Gal. 2. de motu muscul. 9. fieri expirationem, nullo operante musculo, sed tantum confidente ob grauitatem thoracis existimant hi, fieri contractionem, nulla agente facultate, sed confidente tantum arteria. Et quanquam videant Gale. dicentem, magnam fieri mouentibus muscularis expirationem, idcirco aliud esse docere thoracem, aliud vero reclinare, de eide enim ex grauitate, reclinare vero ex motu voluntario, ob musculos expirationi dicatos; ex hoc nedum mutant sententiam, sed in eadem magis confirmantur. Inquiunt enim, statim sequi systolen, nō esse motum, sed concidentiam, quia systole non est motus voluntarius, vt magna exspiratio, sed naturalis tantum.

Cæterum quantopere à scopo aberrant isti, sicut & Herophilus, qui systolen quidem esse motū, diastolen vero, ad naturale statū reditum putauit, paulo inferius exponemus. Nunc autem donec id probemus, supponamus, systolen, non minus quam diastolen, motum esse; quiescentes vero nō esse motus, at tamen actiones.

His ergo de genere præmissis, ad subiectum veniamus. Cor primò, ac per se est pulsus subiectum, subindè vero arteriæ, non quidem asperæ, quæ nullam cum pulsū communicationem, sed læues, & ex Aorta ducentes originem; de quibus multæ quoque tam apud antiquos, quam apud Neoterios, exorta sunt quæstiones: atque illa primum, An cerebri arteriæ, eodem moueantur tempore, quo reliquæ: Secundo, An simul cum corde dilatentur, atque constringantur, an potius motum habeant à corde diuersum? Ad primam quod attinet, non desere plurimi, qui partim ex his, quæ sensu apparet; partim vero ex Gal. auctoritate, cōprobare conati sunt, diuerso tēpore moueri cerebrū, ab arterijs totius corporis: Ventriculi enim reuera aliū videtur habere motū, arteriarum motui cōtrarium. Sic tamen facillè, atque breui hæc conciliatur quæstio: Cerebrū duplicem habere dilatationis, ac constrictionis motum, vnum quidem, in sui substantia, alterum vero in ventriculis: Sunt autem hi, apprimè inter se contrarij; dum enim constringitur cerebri substantia, ventres dilatantur; dum dilatatur substantia, ventres constringuntur. Constrictionis, atque dilatationis substantiæ cerebri, sit ab arterijs per eandem substantiam, atque membranas disseminatis, & hæc conuenit cum distentione & constrictione aliarum omnium arteriarum, & cordis. Dilatatio, & constrictionis ventriculorum, sequitur priorem hanc substantiæ cerebri dilatationem, atque constrictionem, idcirco diuerso fit tempore, dum enim cerebrum constringitur, ventriculi dilatantur, & cōtra. Sed hoc nihil refert, neque enim quærimus, an motus ventriculorum cerebri, eodem fiat tempore, quo motus aliarum omnium arteriarum; sed an motus arteriarū cerebri, fiat eodē tēpore cū alijs? Hunc ergo substantiæ motū, eodem fieri tempore demonstrauius, illum vero ventriculorū, diuerso, quod quidem, nedum contrariū est, imo vero nostram confirmat sententiam. Si enim ex his duabus dilatationibus, & constrictionibus, prior est causa secūda;

E & prior motus, qui in membranis, & cerebro fit, eo ipso contingit tempore, quò & in corde & arterijs, sequetur vnum in omnibus esse arterijs motum, atque ab vnica mouente prodire facultate.

Quod si quis mordicus sustinere voluerit, non à solis cerebrum moueri arteriis, sed propriam obtinuisse vim mouentem, id illi libens, volensque concedam, dūmodo id nobis admittat, vnam ex his facultatibus, cū altera non pugnare, sed vtranque eodem tempore eodemque modo, suas explere actiones. Mouentur ergo arteriæ omnes simul. At vero vtrum dilatentur, constringanturque simul, cū corde, dubium sanè atque controuersū semper extitit. Sunt qui existiment, quorum princeps ex antiquioribus fuit Erasistratus, quem Galenus huius opinionis authorem facit, dilatato corde, arterias constringi, constrictione corde, easdem dilatari quam sententiam acceperunt Auicenna, & Ioannes Guinterius Andernacus, quorum nullus cum alio prorsus conuenit: Aulennas enim vult dilatari arterias ex influente spiritu: Auerrh. autem, ex ebulliente, ac spumante sanguine; Turisani, ex sanguinis

*Quiesci illi
aduenit, ut
motus.*

*Systole a quo
est motus
atque diastole
subiectum
pulsus.*

Duplices cerebri motus.

*Arterius substantiæ
cerebri.*

*Motus ventriculorum
cerebri.*

*Vnum in omnibus
arteriis motum
ab vnica
discreta
facultate mouente.*

*Propriū in
esse cerebri
facultatem
mouentem.
Erasistrati
dogma.
Auic. apud
Andernacum.*

*Turisani
sententia.*

*Andernacum.
Petrus Ap-
ponensis.*

nis, & spiritus effervescencia. Andernacus denique, & ex repletione, & ex vi quadam ipsi-
met arteriis insita, non autem à corde recepta. Erasistrati sententiam, existimavit Petrus
Apponensis aliquando fuisse Galenum amplexatum, eo quod in libello, qui compendium
pulsuum est inscriptus, apertissimis verbis, autor ille protulerit, arterias tunc distendi, cum
cor ipsum contrahitur: contrahi vero, cum distenditur, dicit eo illum sibi contradi-
xisset arbitrat. Cæterum, quam alienus fuerit Gal. noster ab hac opinione, legitimi illius Libri
docent, in quibus nil magis impugnare videtur, quam hoc Erasistrati dogma, quo asserit,
arterias non simul cum corde moveri. Legantur illius verba, quæ habentur 4. de puls. diff. 2.
& 3. de prasag. expul. 3. & lib. An sanguis in arteriis continetur, cap. 7. & 5. de usu part. 21. præci-
pue autem libro de puls. utilitate 4. quid enim Galen, hac de re sentiat, cuius patebit: sic e-
nim illius verba habent: *Huius autem duplicis, & compositi arteriarum motus, quem nunc pul-
sum appellamus, auctor & origo, Cor est, sicuti tum à nobis, tum ab aliis, ante nos, quam plurimum, est
proditum, non tamen ad eum modum, quo Erasistratus existimavit, sed sicut Herophylus & Hippoc-
ratesque Philosophantium, & Medicorum veterum probatissimi quique. Nam in cordis corpore
vis est, unde distrahitur, ac dilatur, in omnes arterias per ipsarum tunicas influens, sic eas cogit,
aperitque quemadmodum ipsum cor: Sicuti igitur illud, cum dilatur, ea quæ a oculis suis appropin-
quant, trahit, cum contrahitur, expellit, sic & arteria, cum se aperit, ad se undique trahunt, cum
contrahuntur, in omnem partem expellunt. Quantum ergo flet Gal. ab hac sententia, nemo
in Gal. vel mediocriter versatus, non novit. Sed quid dicemus ad locum libri, qui compen-
dium pulsuum inscribitur? An non cuique constat, Gal. esse librum illum, quem in fine
artis Medicinalis, se scripturum pollicetur? Et libro, de propriis libris inscripto, asserit scri-
ptum esse: Fateor, & dicitur est à Gal. liber doctus, & Galeno dignus, qui inter legitimos le-
gatur, synopsisque sexdecim librorum de pulsibus inscribitur: Compendium vero pulsuum,
quod iure optimus, inter spurios est relatum, & in quo absurda hæc legitur sententia, à
Gal. libris prorsus est expungendum, utpote, quod ita ieiune, frigide arque inepte omnia
pertrahet, ut nedum à Galen. sed potius à Galen. hoste, conscripum videatur. Quis enim
apud Galen. inueniat inquam, aut usquam, pulsus subintrantis, aut persequutionem pari-
entis, aut acuti, aut continui, aut fugati mentionem saltem? Quis, quæso, non vider, quam
falsa sint, quæ in eodem libello, de palpiratione, tremore, ac spasmo conscribuntur, quod
scilicet, sint meningum affectus? mitto alia, pleraque omnia, iis omnino contraria, quæ
Gal. in legitimis pulsuum libris edocuit: Iure ergo potuit hic autor, à Gal. in cordis, & arte-
riarum motu, dissentire, qui ab eiusdem doctrina, studio, ordine, & elocutione tantopere
declinat. Est itaque constans, vnaque Gal. mens, cni & ego subscribo, arterias simul cū cor-
de moveri, quod ipse 3. de prasag. expul. 2. hoc confirmat experimento, manu scilicet, vno
& eodem tempore, & carpo, & cordi applicatæ eodem quoque tempore occurrere motū.*

Quod si quærat quispiam, qui fieri possit, ut dum arteriæ nil à corde recipiunt, di-
stendantur, cum vero recipiunt, contrahantur? Et quomodo vas contractum, quod qua-
tenus contractum est, ciuitatem amittit, imperuium, & receptioni ineptum redditur, à
corde tunc temporis, quidpiam suscipere possit? Dico distendi arterias, etiam si nil à cor-
de suscipiant, quia aliunde trahunt; externum scilicet aerem, per vniuersi corporis habi-
tum, tenuiorem vero sanguinem, ac spiritum, ex sibi proximis venis. Contrahi vero etiā
si recipiant, quia quantum recipiunt, tantum eodem tempore euacuant. Recipiunt
vero, tamen si contrahantur, quia in hac contractione, non ita corrugantur, ac
constringuntur, ut imperuiæ maneat, sed naturalem retinent cavitatem, quæ libere pos-
sit spiritus, sanguis, fuligo, forte etiam aer, ut mox dicam, à corde in arterias transmitti.
Addo distentionem non fieri ab impleione, aut contractionem, ab euacuatione, sed à
facultate pulsifica, ut antea monui, quæ ideo distendit, ut impleat, & ideo contrahit, ut ex-
pellat. Idcirco cum vnicā hæc sit, tam in corde, quam in arteriis vnus quoque et utrobique
distentionis, ac contractionis motus. Quæ si vera sunt, ut verissima esse censeo, apertis-
sime constat, falsas esse omnium illorum sententias, qui dixerūt, arterias diuerso moveri
tempore, ab ipso corde, quorum falsitatem nunc multo reddemus apertioerem, cum de
mouentis facultatis natura disseruerimus.

Quid ergo, ac qualis sit facultas, quæ pulsus facit, quonam instrumento vtatur, &
qua ratione, ac modo operetur, & antiquitus, & nostris quoque temporibus dubitat, diuq;
admo-

*Compendii
pulsuum,
quod extitit,
non esse Gal-
leni syno-
psin.*

*Arterias si-
mul cum
corde mou-
eri.*

*Quomodo
distenditur,
à cordis ar-
teria.
Quomodo
eodem con-
trahantur.*

*Distentionem
fieri à facul-
tate pulsifi-
ca.*

De Pulsibus.

5

- A** admodum acri ingeniorum seruire, discerptum est. Plurimi existimant, nullam esse facultatem, pulsui efficiendo dicatam, sed hanc accidentariam esse actionem, ex repletione scilicet, vel euacuatione procedentem; tunc enim distendi arterias, cum aere, aut spiritu, aut sanguine & spiritu, implerentur; contrahi vero, cum euacuarentur, vt ex Aristotele, lib. de respiratione, atq; aliis colligitur. Alii arbitrati sunt, à forma viuents pulsus prodire; Alii vero, à facultate, quam nonnulli credidere, esse nativum calorem; Alii à constantione; Alii temperamenti proprietatem; Quidam corporum structuram; nonnulli spiritum; Alii quàm à facultatem incorpoream, pulsficam dictam, vitalis speciem, quæ his omnibus instrumenti loco vtatur. Cui quidem sententiæ, ego quoq; adhæreo. Alias omnes prætermittendas, ac refutandas esse ratus. Ad primam, n. quod attinet, si accidentaria esset pulsus operatio, si inquam, ex solo spiritu, vel aere, vel sanguine, vel pluribus vel omnibus implentibus, aut ebullientibus fieret distentio, mox euacuatis iis, aut refrigerentibus, contractio, nullum profectò seruare pulsus rhythmum, nullam æqualitatem, aut ordinem, aut firmitatem, aut perennitatem, sed omnia semper essent improporcionata, confusa, inordinata, & breui accidentia.

Opiniones de pulsum efficitur causa.

Prædicta opiniones exq. mutantur.

Aristoteles sanatur.

Quæ sit vera anima efficitur, corpus pulsum causat. Anima naturalis potest esse sensu.

Quid contrariis pulsficæ, ad pulsum edendum.

Spiritus concurrens ad pulsum edendum.

Accedit, quod in corporibus, vel à natura, vel ex causis externis impense refrigeratis nulla deberet fieri distentio, quia nulla esset ebullitio, atq; spumificatio, vt ex hoc, & Aristotelis, & Turisani opinio statim fuere videatur. Nec minus secunda reprobada est, quæ vult, à viuents forma, pulsus prodire: Vero enim vero, tamesi ab animalis animæ omnes promaneant actiones, non tamē ab ea fluūt immediate, verum medijs quibus proprijs quibusdā facultatibus, quæ & obiectis, & operationibus inter se distinguuntur, idcirco tot constitui debent, quot sunt sensibiles in corpore partes, atq; eandem vñs, actionesque. Est ergo immediata pulsus causa, facultas pulsfica vocata, in secunda qualitatis specie reponenda, quæ naturalem potentiam atq; impotentiam vocauit Aristot. in qualitatibus prædicamento. Hæc genere est vnica, specie multiplex, alia enim est quæ distendit, alia quæ contrahit, vt a de præf. ex pulsf. docuit Gal. Imo vero, alia est quæ getes molitur, ab ea quæ motu præstat. Et adhuc alia est, quæ quieti exteriori, alia quæ interiori incūbit. Sūt oīa (vt dixi) potentia, vel facultates, in secunda qualitatis specie, ad vitalem spectantes, sūtque ab anima sensitiua perfecta tūquam à substantiali forma. Quomodo autem à naturali, & animali vitalis distinguatur, nō est præsentis disputationis; hoc vnum sciuisse sat sit, vitalem hanc facultatem inter naturalem, atq; animale esse mediam; neque enim per electionē, vt animalis, neq; quantum potest, vt naturalis, sed prout vsus postulat, modo magis, modo minus operatur. Vtatur autem pro pulsu perficiendo remperie, conformatione, calore innato, fibris ac spiritu; quanquam illustratione illum agere Galen. censuerit. Et tamesi de fibris putauerint quidam, ad Aeris attractionem, ac fuliginum expulsiōnem, minimē cōferre, sed ad sanguinem tantū ac spiritum; cum tamen certo certius sit, nec posse attrahi sanguinem, ac spiritum, qui attrahatur & aer; neq; posse protrudi spiritum, quin simul singulis expellatur, quod quæ sit, vt asseramus longitudinalium villorum contractionē, inservire attractioni tantum sanguinis, ac spiritus, non item aeris. latitudo nullum vero contractionum ope spiritum præcipue distribui, fuliginem minimē, cui ad expulsiōnem naturalem arteriarum concidentia sufficiat? Nimis subtiles, & extra rem, vt ingenue dicam videntur mihi quæstiones istæ à quibus propterea abstinentum, atq; pro constanti habendum, si brarum opera, sanguinem, spiritum, aerem ac fulgines, intro, forasq; moueri. Melius porro, aut deterius operantur fibræ istæ, pro vario cordis, atq; arteriarū statu. Accedere enim optimo partium temperamento, structura, calore innato, atq; spiritu, optimē munus suum obeunt; perperam autem, si opposito modo res se habeat. Quale autem esse debeat hoc temperamentum, qualis structura, quis sit calor innatus, ac quotuplex, quis etiā ac quotuplex spiritus, longa admodum oratione persequi possemus; Hæc tamen loco, breuissimè explicabimus; Hunc scilicet ad pulsum edendum concurrere, nō illustratione tantum, vt quandoque visus est voluisse Gal. sed & corporea substantia. Si enim corporea hac substantia non ageret facultas, nulla esset ratio, cur Gal. quorundā pulsū inx qualium in vicino istu causam afferens, facultatis imbecillitatem esse dixerit, quæ non possit perinde in remotas à corde partes extendi, atque in proximās. Si enim facultas il-

lustratione agit (dammodo instrumenta sint bene disposita) nihil est, quod possit prohibere, quominus in proximas cordi arterias diffusa, non etiam in remotas transeat. Illustrationem quidem adinittimus, propter quā, momento fere temporis, mouendi vim in singulas transire etiam minimas, tenuissimasque arterias conspiciamus: corporā tamen spiritus substantiam minime excludendam esse putamus. Quia vero non vnicus est spiritus, quem arteriæ continent, non cuiusque vim hanc inouentem inbuimus, sed in sito & influenti per membranas, minime vero influenti: per cavitates. Gignitur autem insitus spiritus ex duplici substantia, primo quidem ex seminali materia, caloreque ipsiusmet arteriis innato, secundo autem ex vitali spiritus à corde per easdem arteriarum cavitates confluyente, ut pluribus in locis Gal. docuit, præcipue verò *simpl. cap. 9.* Hic ergo sic perfectus & elaboratus, quanquam omnium operationum instrumentum esse censetur, ex se tamē

Arterii duplicem continent spiritum: spiritum ex duplici materia, spiritum ex semine, spiritum ex calore, spiritum ex vitali spiritu.

pulsus non edit, sed tunc tantum, cum spiritu à corde per arteriarum membranas diffusio misceatur. Hic enim qui per substantiam fluit, cum præcipuus sit pulsus author, insitus excitat, roborat, atque ad motum impellit, ut tandem ex ambo bus inuicem mixtis, agentibusque motus in arteriis celsulet. Ex eo autem, qui per cavitates meat, nullum aliud recipiunt arteriæ commodum, quam proprii, ac insiti caloris perfectionem, ac tutelam. Non enim ad motum alia ratione conferre, apposito admodum consuevit Gal. experimēto, quod proponit in lib. *an sanguis in arteriis contineatur*, inscripto, *x. vlt. vbi* sic scriptum reliquit: *Arteriam unam à magnis, & conspicuis quampiam nudabis, primoque pelle remota, ipsam, ab adiacenti suppositoque corpore, tamdiu separare non graue erit, quoad funiculum circumdare valeas, deinde secundum longitudinem arteriam incide, saltemumque conuicuum & pernis m, inforamen intrude, vel aneam fistulam, quo & vulnus obturetur, & sanguis exilire non possit. Quo ad hunc si se arteriam habere conspicias, ipsam totam pulsare videbis, cum primum vero, obduti laqueum contrahens, arteria tunicas calamo obstrinxerit, non amplius arteriam ultra laqueum palpare videbis, & si sanguis, & spiritus, ad arteriam, quæ est ultra laqueum, senti prius faciebat per calami foratur cavitatem. Quod si propterea pulsarent arteria pulsarent etiam tum partes, quæ sunt ultra laqueum, sed non pulsant. Ergo perspicuum est, quoniam moueri possit desinunt, non per spiritum, in cavitatibus discurrentem, sed ob virtutem, in tunicis transmissam, arterias à corde moueri. Hac tenus Gal. Certum est igitur, pulsificam facultatem esse potentiam de secunda qualitatis specie, cordi primo insitam, arteriis vero accedentem, non quasi per plumbeos canales, sed per instrumenta viuētia, non per cavitates, sed per ipsamet membranam, non spiritu, & substantia corporea tantum, sed facultate etiam, & illustratione: manifestari vero vno & eodem tempore vtroque, mediante eodem calore, spiritu, optimaque partium temperie, ac structura. Quod si ita res habet, ut illam habere existimo, statim ruit Quintern placitum, quo arterias propriam habere vim mouentem, à corde diuersam, adstruere conabatur. Si enim arteriæ hanc à corde recipiūt, & eodem tempore cum corde mouentur, præter omnem rationem, propria illis tribuitur facultas, cordis motui contrariæ. At vero ex his fundamētis euerititur quoque & Auicennæ, & omnium Affectarum sententia. Quandoquidem si nō distenduntur arteriæ, quod impleantur, sed implentur, quod distendantur, oportet sane distentionē esse facultatis distendentis opus, non materię adimplentis, ut prædictis videbatur.*

Vitæ pulsificam arteria necesse est, non inuoluntaria.

Quintern placitum, quo arterias propriam habere vim mouentem, à corde diuersam, adstruere conabatur.

Auicenna, & Affectarum sententia.

Herophilus de systole & diastole sententia.

Herophilus de systole & diastole sententia.

De Aristotelis autē, & Tnrisani sententiā, quā falsa sit, ex antea dictis aperteissime constat. Patet quinetiam eorum refutatio, qui in dubiū reuocabant, utrum omnes pulsus partes, essent actiones, ac motus, nec ne: Et primum quidem refutatur Herophilus, qui systolen tantum à facultate fieri existimauit, diastolen vero, reditum esse ad naturalem statum, non aliā profecto ob causam, quam quod videret arterias, post mortē distentas esse. Hic minime credendū: Non enim ideo extenduntur arteriæ post mortē, quod redeant ad naturalem statum, sed quod indurentur. Idcirco si calida aqua foueātur, statim subsident. Minus vero illis assentiendum, qui diastolen tantū motū esse affirmabant, à facultate productam, systolen vero arteriæ subsidentē esse ab eiusdem grauitate prodromū asserēbāt. Si enim hoc esset, profecto nec rhythmus seruaretur, qualis seruatur, neque vsus systole adeo præstans esse, qualis est, fuliginum scilicet expulsiō; nec denique maior, aut celerior, quandoque esset systole, ipsa diastole. Ambo ergo hi motus, imo & ambæ quietes, sunt à pulsifica facultate cordi insita, atque arteriis communicata. Quo fit ut & legitima palpitatio-

*Quem de
pulsi defen-
sit à vera
palpatione.*

Ané, & ab alio quocunque cordis motu distinguantur. Palpitatio enim solius morbi est operatio, non facultratis. Alii vero motus, ut alimentum attractio, quo nutritur cor, & eorum excrementorum expulsio, quæ post alimentum coctionem remanent, ad naturalem facultatem referuntur, non ad pulsificam. Idcirco horum finis nullus est alius, quam cordis nutritio & accretio; Pulsus autem finis, & usus ab his longe est diuersus. De quo quidem nunc aliqua dicenda super sunt, ad vltimam definitionis partem spectantia.

Usus ergo finalis causæ rationem obtinet, & duplex à Gal. proponitur: caloris nativi commodatio, & spiritus resectio. Quis vero hic sit natiuus calor, quæ commodatio, quis spiritus, qui resectitur, & quo modo hæc fiant, patet explicandum.

*Duplex pul-
suum usus.*

Ad primum quod spectat, existimant nonnulli, caloris nomen, non minus intelligi illud, qui in sinistro continetur sinu, quam eum, qui per totum, ac singulas est diffusus partes. Ego vero cum Gal. lib. de vsu puls. cenfeo, cor non ea egere refrigeratione quæ efficit arteriarum distentionem: sed illi aerem suscipere, quem ab arteria venali suscipit, quod triplici confirmatur ratione: primo, quia si cor aerem ab Aorta susciperet, vel illum in arteriarum contractione reciperet, vel in distentione, non in contractione; quia tunc cor spiritum, & sanguinem ad arterias impellit, nulla autem est ratio, cur eodem tempore cor det atque recipiat. Multo minus distentionis tempore: Etenim tunc clausum est ostium; ergo nullo tempore. Secundo, non potest aer per minimas arterias ab ambitu corporis receptus, tam breui transmitti ab extremis ad intimas usque; ad ipsum cor. Et dato, quod intraretur ex transitu per totas arterias calidus euassisset: Forte iam consumptus esset, cum in alimentum spiritus transiret, ut mox ostendam. Confirmatur hæc ratio, quia si profunda, atque cordi proxima arteria à corde ipso vel arteriis propinquis trahitur, dum distenduntur, non autem à toto, ut mox ostendam, ergo multo minus ipsum cor, ab arteriis minimis aerem suscipere poterit. Ratio est in promptu: si enim arterie, quæ arteriis hisce minimis sunt proximiores, ab illis non trahunt, sed potius à corde tanquam proximiores; quæ erit ratio, cur ipsum cor magis distans, hoc debet accipere nulla profecto; cor ergo à toto nihil trahit. Tertio, si cordis calor ex aere per arterias suscepto refrigeraretur, ergo sublata etiam respiratione, animal viveret. At non vivit, ergo non refrigerat cor ex aere per arterias attracto. Calor itaque, qui commodatur expulsi, est illarum corporis partium, non autem cordis.

Cor non uiget refrigeratione ab arteriis non distentione; sed aere à cordi arteria suscipit.

Quæ calor, pulsi opus, ventilatur, quem de partibus corporis partes trahuntur.

Ex facie quædam sententia.

*Antiqui de
pulsi.*

Confirmatur hæc ratio, quia si profunda, atque cordi proxima arteria à corde ipso vel arteriis propinquis trahitur, dum distenduntur, non autem à toto, ut mox ostendam, ergo multo minus ipsum cor, ab arteriis minimis aerem suscipere poterit. Ratio est in promptu: si enim arterie, quæ arteriis hisce minimis sunt proximiores, ab illis non trahunt, sed potius à corde tanquam proximiores; quæ erit ratio, cur ipsum cor magis distans, hoc debet accipere nulla profecto; cor ergo à toto nihil trahit. Tertio, si cordis calor ex aere per arterias suscepto refrigeraretur, ergo sublata etiam respiratione, animal viveret. At non vivit, ergo non refrigerat cor ex aere per arterias attracto. Calor itaque, qui commodatur expulsi, est illarum corporis partium, non autem cordis.

Dicitur, alia profunda ac cordi proxima, de prioribus nemo dubitat, quin aerem externum suscipiant, dum dilatantur; De profundis autem & cordi proximis alia est ratio. Cum enim minime à tam remota parte possint trahere, & dato quod possent, non inuenirent aerem quem traherent, utpote qui iam in alius corporis partibus esset dispersus & consumptus; idcirco voluit Gal. 3. de Nat. Facul. cap. 14. hæc partim à corde, partim à sibi proximis arteriis attrahere: quod tamen dubio non vacat: Etenim si ita res se haberet, tunc trahere deberet, cum distenduntur, aer vero eo tempore elanditur ostiolum: ergo nec à corde videtur attractio fieri posse. Secundo, si attraheret ab arteriis proximis, non propterea aerem susciperent, quo calorem innatum refrigeraret, cum arterie illæ præter sanguinem spiritumque, aut spiritum, nihil in se contineant. Quid ergo dicendum: Non placet profecto quod

Erun dam responsio, qui dicunt, non inconuenire, arterias, quæ circa viscera sunt, parum refrigerari; imo vero, hoc naturæ illarum partium, quæ coctioni sunt: dicat, ut coctio ipsa citius ac melius perficiatur, appime conuenire. Levis est, ut arbitror, esponsio: Etenim quamuis innatus viscerum calor non debeat infringi, attamen nec suffocari debet: At quo maiores sunt arterie, quo plures, ac maioris momenti sunt concoctiones, eo plus abundat calor & fuligo, eoque maiori opus est refrigeratione, atque ventilatione. Unde ergo habebunt arterie istæ magnæ, ac profundæ ventilationem hanc? Cenfeo ego magnæ hæc arterias, quæ naturalibus infusæ sunt partibus, frigidum illum suscipere aerem, qui per os in ventriculum & intestina ingreditur. Nemo quippe ibi inficias, inspiratione, quæ per os fit, & nares, non in cerebrum tantum, sed, ut auctor est Hippocrates lib. de Flat. in ventriculum quoque aerem ipsum rapi, hunc vero in viscerum arterias distribuere. Si enim concedit Medicorum scola, aliquid tenuioris chyli à ventriculo arterias haurire, cur quæso non concedet, easdem aerem trahere posse, qui chylo multo tenuior est? Ita de viscerum arteriis sentio,

Adillas vero quod attinet, quæ à corde subeunt collum, & quæ porrigitur per spinam, Gal. sententiam recipio, has ab eodem corde aeternum excipere. Neque valet, quod tunc ostium sit occlusum; quandoquidem, in vivente corpore omnium unus est consensus, una conspiratio, ut & arteriæ à corde, & vicissim cor ab arteriis aliquid attrahere, & suscipere valeant; potissimum vero, cum quod suscipitur, tenue & paucissimum sit.

Quod si dicamus, arterias tunc à corde aeternum suscipere, cum contrahuntur, nihil fortè à ratione alienum pronuntiabimus. Cum enim spiritui ac sanguini tunc pateat aditus, quid quæso prohibet, quo minus quoque paulo antea in corde receptus, simul cum reliquis duobus corporibus transmittatur, quanquam ab arteriis non trahatur? Hic ergo est calor, qui commoderatur; hæc sunt partes, in quibus residet; hæc sunt loca, per quæ aer ducitur.

Quæ vero sit hæc commoderatio, & qua ratione fiat, nunc paucis est apertendum. Ut conservetur calor, opus habet alimento, quo reficiatur, & motu, quo ventilletur, ne suffocationis incurrat periculum, vel ex quiete, vel ex fuliginum copia. Sic videmus flammam quandoque interire, vel quia materiam deferat, vel quia suffocetur: excitati autem, ubi ad materiam convertitur, aut ventilatur. Pari ergo ratione innatus animantis calor deficit, ubi ad superiora, & exteriora nimium movetur, sicque à materia recedit vel suffocatur in partibus internis, dum neque ventilatur, nec à fuliginibus expurgatur. Commoderabitur vero cum modicè refrigeretur, & modicè ventilletur. Refrigeratur, attracto per distentionem aere, nec nimium calido, nec plus satis frigido, nimia enim refrigeratio extinguit, sicut caliditas excedens suffocat. Ventilatur autem, & motu, & fuliginum evacuatione: Motus autem per distentionem, fuliginis expulsio per contractionem comparatur. Hæc omnia in corde sunt, pulmonum, arteriarumque venarum, quas læues etiam appellant, ope, in toto vero mediante Aorta.

Sed ambiget quispiam, quomodo per eandem arteriam venalem tot refrigerari, atque à fuliginibus vindicari possit, cum recepto in cor aere, ostium claudatur, ne amplius in arteriam remeare possit. At, si non tedit aer, multo minus fuligo, quæ aere longe est crassior. Dico fuliginem in arteriam venalem transire, ostio quantumvis clauso, quia membranae, quæ huic ostio præ sunt, aliis pauciores & tenuiores sunt. Cum enim reliquis cordis valis trigeminas, ac solidiores dederit natura membranas, huic tantum binas concessit, ac tenuiores, quo facilior esset fuliginum transitus. Adde exiguum esse fuliginis partem illam, quæ per ostiolum hoc transeat, maiorem enim portionem simul cum sanguine, ac spiritum, in Aortam mitti, ut propterea tanto minus necessaria fuerit patens via à corde in pulmones, quanta minor reliqua est fuliginum portio in ipso corde.

Sed quid dicemus ad propositam instigationem de aere? si per ostiolum illud non potest fuligo excernitur, ergo & aer paulo antea receptus multo tenuior excernetur, ergo frustra recipitur aer in cor, ut refrigeret. Huic instantiæ respondeo, aerem statim ac receptus fuerit, refrigerare, ita ut non frustretur tot suo fine, etiam si mox aer iterum excernatur. Addo, naturam de eo retinendo, quod vtile est, semper magis esse sollicitam, atque ideo aerem tanquam vtilem retinere, fuliginem vero excernere. Itaque ut tandem omnia in unum colligamus, quæ ad hæc pertinent: cordis, calor ex venali arteria commoderationem suscipit, viscerum veto ac partium cordi proximarum, ex locis, quos antea docuimus: Reliquatum denique totius corporis partium, per illa arteriæ Aortæ germina, quæ in totius ambitum infertuntur. Hæc enim dum dilatantur, aerem hauriunt, qui frigidus a qualitate attemperat: impetu autem quodam receptus, movet ventilatque. Qui vero conflringuntur, fuligines expurgant. Ut si autem impetuosi hic aeris motus à fibris fiat, distentio autem non impetuosa absque fibrarum actione, quæstio est apud me inanis & illi similis, quam antea quoque reieci. Ego enim nullum reor fieri cordis à pulvisca facultate motum absque fibris. Magis quidem, ac minus impetuosum esse non recuso, sed huius diversitatis causam, non in illud refertam esse puto, quod quandoque quietæ fibræ, quandoque autem operentur, sed quod aliquando magis, aliquando minus moveantur, prout usus maior vel minor est, facultasque validior aut imbecillior. Hi ergo sunt præcipue pulsuum usus, quibus tamen alii non spernendi copulantur.

Et enim in distensione cor non modo trahit ab arteria venali aerem, sed & à venæ cavae trunco

commo-
dationem
partium
est
sunt.

qua calor
circum-

Respiratio
ne animan-
tis calor de-
ficit.

quomodo
per arteriam
venalem
verificetur
et fuli-
ginis excer-
nuntur.
Nullo cor-
dis arteria-
rum venarum
motu oblique
fibris exten-
sione.

Alia pulsuum
visus.

A trunco sanguinem: Aorta vero arteria, cum suis ramis, dum distenditur, suscipit similiter aerem, spiritum, ac sanguinem; contracta vero, simul cum fuligine, spiritum pariter ac sanguinem ad varias partes impellit. Haecenus de priori pulsum usu, caloris scilicet moderatione. De altero nunc dicendum, spirituum regeneratione scilicet.

Quæritur autem primo, quales nam hi sint spiritus, quos aer per arterias attractus reficit? Non possunt profecto esse vitales in corde existentes, si vera sunt, quæ hæcenus diximus aerem scilicet per arterias attractum ad internas profundasque partes non peruenire. Reliquum est ergo, ut videamus, reficiantur ne spiritus cuique parti corporis insit, an animales, qui in cerebro sunt, an trique, & quomodo? Refici spiritus, cuique parti insitos ex aere attracto, docet & ratio, & Gal.

*Qui non
corporis spi-
ritum ab at-
tracto aere
reficiantur:*

B Ratio quidem, Nam si vitalis in corde reficitur, aere per pulmones suscepto, & animalis ex eodem per nares ad cerebrum transeunte, ceterum quæso vitalis ille spiritus, qui in cunctis reperitur corporis partibus, ex aere per transpirationem attracto refici non poterit? Hoc præter rationem, docet quoque Gal. 6. in sextam Epid. 3. Et quanquam ibi de Asclepiadis mente loqui videatur, hoc tamen propria confirmat opinione 7. de placit, dum inquit, spiritum, qui in arteriis est, vitalem esse, in arteriis & corde gigni, nihilque ob stare, quo minus ex attracto aere, ipse arteriarum concurrente tamen corde, illum gignant. Cum ergo de vitali nulla sit dubitatio, multo minus de animali, ex Gal. sententia, ambigendum esse videtur. Etenim passim ille affirmat, duplicem esse pulsum usum, caloris com-
moderationem, & spiritus animalis refactionem; à quo minime dissentit Hippo, dum

C scribit, in principio libri de Alimento: principium alimenti spiritus, esse os, nares, atque alia respirationem, ubi per aliam respirationem hanc ipsam intelligit, quæ per totum sit corpus, quod arteriarum pulsum. Hinc Gal. lib. de usu puls. inquit, id, quod præstat cordi respiratio, præstat pulsum calori totius corporis: communem autem esse utriusque spiritus nutritionem, verum magis arteriarum propriam. Hæc ergo, etiam si aperta videantur, non tamen difficultate carent, minime enim constat, an aer ille per arterias susceptus, primo in vitalem vertatur, ut antea ostendimus, mox in animale; an potius immediate animalis euadat materia. Nam si dicamus, in vitalem primo transire, mox in animale, quatenus arterias carotides subit, ibique elaboratur; profecto id neque necessarium, neque utile esse debuit. Quandoquidem tantam suppediratur continuo spirituum vitalium

*Dubium de
Aere in spi-
ritu vitali,
et huius in
animali ef-
fectus.*

D arteriis carotidibus, & cerebro cor ipsum, quanta est necessaria pro illorum generatione: si ergo cor ipsum satisfacit necessitati cerebri, non videntur profecto vlla ex parte arteriarum, pleuræ, choroidis, eo vitali spiritu indigere, qui in arteriis continetur, & per transpirationem generatur, ut animale efficiant.

Quod si dicamus immediate conuerti ætæri per transpirationem susceptum, in spiritum animale, non potest sane hoc fieri, nisi supponamus, spiritum animale per totum corpus esse diffusum. Hoc tamen est controuersum, actiones enim motuæ, ac sensitiuas videtur Gale. voluisse fieri potius illustratione, quam corporea spiritus substantia: quod si illustratione, ergo non reperitur in toto spiritus animalis, idcirco ex transpiratione gigni non potest. Itaque omni ex parte dubia videtur hæc sententia. In qua tamen

*Spiritum an-
imale per
vitali refici
potius quam
ex Aere.*

E difficultate, ego magis in eam inclino partem, spiritum scilicet animale refici ex vitalligenito in singulis etiam corporis partibus, quam ut credam, ex aere ipso, per transpirationem immediate suscepto fieri. Ratio partim colligitur ex dictis, partim ex Galeno confir-
mat.

Colligitur quidem ex dictis: Etenim si animalis spiritus, corporea sui substantia in totum corpus non distribuitur, ergo neque inibi ex aere refici potest. Multo autem minus aer ille per transpirationem susceptus poterit cerebrum petere, atque ibidem animales spiritus gignere. Etenim antequam cerebrum ingrediatur, in vitalem erit mutatus: ergo nullo modo potest aer ille immediate animalis spiritus materia euadere. Quod etiam ex Gal. colligitur qui lib. de usu resp. inquit, aerem inspiratum, minori sui parte, ad cerebrum deferri, quo spiritus animales generentur. At si minori parte eo defertur ille, qui per respirationem suscipitur, quid quæso de illo censendum, quem dat corporis transpirationem? sane minime credi debet, eundem posse, aut debere immutatum, à remotissimis locis in cerebrum tendere. Dicitur itaque ratio, aerem transpiratione susceptum, primo in vitalem abire, mox anima-

Arteria spiritum animalium
sum cerebri
communica-
tant.

Ad rationem vero contra hæc adductam, qua dicebamus, cor posse huic transmissio-
ni spirituum vitalium, abq; articularum spiritu, sufficere: Concedo quidem, cor posse suf-
ficere, dico tamen quod etiam sufficeret, nil prohibere, quo minus arteriæ spiritum, quem
continent, cerebro communicent: Si enim contrax, non fulgines tantum, sed & san-
guinem & spiritum in omnes corporis partes propellant, nulla profecto est ratio, cur etiam
in plexum choroidem mittere non possint. Cum autem miserint, cur aeri per nates sus-
cepto permixtus, non euadet materia animalis, sicuti & ille, quem mittit cor ipsum? Ra-
tio profecto hoc suadet. Hoc igitur modo censeo aerem transpiratione receptum ani-
malis spiritui conferre.

Spiritus non
nutritur, sed
generatur.

An vero aer per nates susceptus, antequam in animalis spiritus materiam abeat, per
pulmones in cor, & ex corde in cerebrum iterum ascendant, ut voluit Erasistratus, alterius
est considerationis. Nobis liceat Gal. amplexari sententiam iam explicatam, & ab eo ex-
perimentis confirmatam, aerem scilicet per nates attractum in spiritum animale statim
transire, Vtrum vero Erasistrati dogma euertant, illa Gal. experimenta, & vtrū Gal.
hæc in se sibi omnino constet, nec ne, alij disputent, iudicentque: Nos enim huic disputa-
tioni de pulsum viti, finem imposuimus, duo adhuc adnotabimus, quæ ad spiritus propo-
sitos spectant; primum est, illos reuera non nutriri, sed generari potius: quia nil nutritur,
quod permanens, & constans non sit, spiritus autem in continuo esse motu, atq; dissolutione,
recte annotauit Turisianus, *Art. med. 41.* Verius itaque generatur, quam nutriantur.

Aerem non
offerem sim-
plicem.

Alterum est, in hac parte minime audiendos esse illos qui aerem minime spiri-
tuum animalium esse materiam contendunt, quod aer sit res simplex; ex simplici ve-
ro nil compositum vel gigni vel ali posse, apud omnes esse receptissimum. Non enim co-
cedimus aerem esse rem simplicem, imo vero, in nostra hac inferiori regione, valde compo-
situm affirmamus, Addo, non ex solo aere, sed ex aere, & vitali spiritu gigni animales.

Patent ergo omnes propositæ definitionis partes, omniumq; difficultatum solu-
tiones: Ad differencias itaque transcamus.

CAPVT IV.

De primis pulsum differentiis.

Primo pul-
sum de differe-
ntia, age-
nare.

EX pulsum differentiis, quædam primæ sunt, simplices, conspiciæ, & ex usu artis: quæ-
dam vero secundæ, compositæ, obscuræ, inutiles, ac logicæ. Priores sunt, quæ à genere
pulsum, causa effectiua, ac subiecta materia capiuntur, tanquam partibus essentiam pulsum
constituentibus.

Differentia
à loco, in
que sit mo-
tus.

Et à genere quidem, cum sit motus, atq; in omni continuo motu ad sit locus & tem-
pus: In omni vero discreto intervallo; atq; inter duos contrarios motus, duæ quietes, tria
pulsum genera defumuntur, quorum vnum quodq; suas habet specificas differencias.

Etenim quo ad locum, in quo sit motus, triplex oritur pulsum: Magnus, Paruus, & Mo-
deratus: prout arteria, quæ monetur, dum distenditur, magnum occupat, secundum omnes
dimensiones, spacium, vel minimum, vel moderatum. Rursus autem, quia omnis magni-
tudo triplicem habet dimensionem, longitudinis scilicet, latitudinis, ac profunditatis,
hinc nouem adhuc, exurgunt specificæ differencias, ab istis tribus dimensionis speciebus
acceptæ, sunt autem

Longus,	Breuis,	Moderatus.
Altus,	Humilis,	Moderatus,
Latus	Angustus,	Moderatus:

Ex his vero nouem, ad inuicem mixtis, 27. produnt, quas confusionis evitandæ cau-
sa, consilio prætermittito.

Differentia
à tempore
motus.

A tempore motus, triplex quoque exurgit differentia.

Celeris, Tardi, Moderati.

Quæ celer
pulsum,

Est vero celer, non qui cito absoluitur, nec tardus, qui agere: Sed celer est, qui magnum spatium
cito transiit, ac cito se expedit: Tardus vero, qui ad modicum etiam percurrendum, longum requirit
tempus, & tarde admodum se expedit. Ex quibus & moderatus patet.

Quæ a Tar-
di,

A b intervallo pariter, vel si alicui magis placeat, ab vtraque quiete oriuntur crebri,
rati, moderati.

Nam

A Nam creber est, cuius intervallum inter duas diastoles, sit brevis: Rarus autem, cuius longum sit. Quod si percipiatur contractio, creber erit, cuius tam externa quies, quam interna est brevissima, Rarus autem, cuius quietes sunt protensæ: Moderatus medio se habet modo. Cui vero systole vix ac forte ne vix quidem deprehendi possit, satius erit, frequentem, ac raram ab intervallo desumere, quam à quietibus, sed de hac te infra. Et hæc tunc de differentiis, à genere ac ceptis.

A facultate autem mouente, triplex oritur pulsus, Vehemens, Languidus, Moderatus.

Est vero vehemens, qui maximam habet contentionem, validumq, solum: Languidus è contra; Moderatus autem, medio se habet modo. Sed de moderato, in sequenti cap. nonnulla profereamus.

B Denique à subiecta materia, triplex oritur pulsus: Durus, Mollis, Medius.

Durus quidem est, qui prementis non cedit. Mollis, qui facillime cedit: Medius, medio modo se habet. Hæc tunc de primis, ac simplicibus pulsuum differentiis.

Sed antequam ad alias descendamus, quæremus primo, sitne inter vehementem ac languidum, moderatus pulsus, qui inter naturalium pulsuum classem recensatur.

CAPVT V.

Vtrum inter pulsuum vehementem, ac languidum detur moderatus?

Q Væsiuit aliquando Gal. 1. de puls. caus. 7. vtrum inter vehementem, ac languidum pulsuum, moderatus sit constituendus, variasque hinc inde proponit rationes: quid tandem ipse sentiat, aperte non docet. Nos itaque pro huius quæstionis resolutione, vehementem pulsuum dupliciter considerari posse dicimus: vel ratione propriæ essentiae tantum, vel ratione propriæ essentiae comparatæ ad usum.

Si consideretur ratione propriæ essentiae, nullus est pulsus medius naturalis inter vehementem, & languidum. Etenim pulsus vehementis essentia ex naturali provenit corâs temperie; At vero, inter naturalem, & præter naturalem temperiem, nulla datur mediocris; idcirco, mutata quam primum naturali hac temperie, pulsus qui infra hunc vehementem fuerit, languidus; qui supra, vel vibratus, vel alio quovis modo vehemens nuncupabitur. Vibratus quidem, si durus; non vibratus, si duritie careat. Et hi omnes quatenus in temperiem cordis apprimere vitiosam sequuntur, præternaturales omnino censentur.

D Sed datur alius quidam vehemens, ab his diuersus, cum scilicet naturalis cordis temperies sit integra, vsus tamè sit auctus: Hic enim intra naturæ leges, ratione propriæ essentiae, continetur, vsus tamen ratione poterit dici, vel naturalis, vel non naturalis, vel præter naturam, habebitque pro medio priorem illum vehementem, ab vsu aucto minime imbutum. Explicò: constituamus primum naturale cordis temperamentum triplex, vnum, moderatissimum, alterum calidissimum; tertium quod ad frigidum vergat: Pulsus moderati, & calidioris temperamenti, erunt ambo vehemèntes, sed hoc discrimine, quod qui sequitur temperamentum calidius, absolute vehemens erit: qui moderatum, dicitur medius & vehemens: medius quidem, respectu illius, qui sit in tēporie calidissima: vehemens autem, si conferatur cum pulsu temperamenti frigidioris. Ambo tamen isti vehemèntes,

E erunt naturales, quia ambo naturalem sequuntur temperiem. Idcirco, non valet in hoc casu: id quod scribit Paulus, medium tantum vehementem esse naturalem, eo quod stabilis sit, ac permanens, non autem mutabilis, ut alter, qui iram, vel aliam consimilem sequitur causam. Non enim semper hic sequitur momenanea causam, sed quandoq, ut diximus, permanentem, nempe intemperiem calidam, intra limites sanitatis constitutam. Hoc igitur primo modo datur duplex vehemens naturalis, quorum vnus moderatus vocabitur.

Constituamus secundo, corpus optime temperatum intra naturæ leges constitutum, sed quod circa non naturales causas, tripliciter se habeat, aliud enim sit à nulla alteratione: aliud vero, ab animi motu aut corporis, cibo, potu, aliæ consimili causa supercalcfactum; tertium ex propositis causis aliquatenus sit refrigeratum. Primi corporis pulsus, erit vehemens, ratione optime temperaturæ, medius autem respectu pulsus supercalcfacti, ac refrigerati: Sed qui sequitur auctum calorem, pariter vehemens erit naturalis, quia naturalem sequitur temperiem: quanquā ratione non naturalis causæ, non naturalis quoq, dici possit: Eadem est ratio pulsus vehementis ex naturali temperie prodeuntis, sed comparati, cui

vbi

vſu aucto, ex cauſa præter naturam. Vſus etenim, à cauſa præter naturali auctus, modera-
tum nunquam efficit pulſum, ſed quod impellatur facultas, à calore febrili, vehementè,
immoderatumque: vno verbo, ratione vſus, præternaturalem; qui tamen naturalis, in
propria eſſentia eſt conſtituendus, quod mutatum adhuc non ſit naturale cordis tempe-
ramentum.

Nec obiiciat quiſpiam, cum febrili intemperie naturalem ſtare non poſſe. Eſſi enim
febrilem intemperiem concedamus eſſe morboſam, attamen dum facultatis robur non
deſtruit, vehementiam adimere non poteſt.

Sed ruruſum inſtabit quiſpiam, omnem cordis intemperiem non tantum augere v-
ſum, quantum etiam lædere facultatem. Cui reſpondeo aliud eſſe, mutari cordis tempe-
ramentum, aliud vero mutatum eſſe. Dum mutatur, non deſtruitur facultas, ſed vſus tā-
tum augetur, vel imminuitur: Cum vero iam mutatum fuerit, tum facultas ipſa neceſſa-
rior redditur languidior; fortior autem nunquam, etiam ſi calidius cor euaserit. Ergo per
leuioreſ febres, vt Ephemeræ, tertianæ ſque benignæ, alteratur quidem cordis temperies,
vſusque augetur, facultatis tamen eſſentia non corrumpitur, imo vero ab vſu aucto im-
pulſa, fortius agit: hinc vehementem proferit pulſum, ratione eſſentia: naturalem; ratio-
ne vero vſus aucti præter naturam; qui habet pro medio pulſum à nulla cauſa, à nulla cali-
da intemperie, impulſum. Sic ergo patet, dari pulſum medium inter vehemētem, ac lan-
guidum, quatenus medius accipitur pro illo, quem procreat facultas naturalis, modera-
tum conſequens temperamentum, & à nullo vſu, ex cauſa non naturali, vel præter natu-
ram impulſa. Ad reliqua ergo progrediamur.

CAPVT VI.

*Ex primis quinque pulſuum differentiis, quæ magis, & quæ minus pro-
pria dicuntur.*

EX quinque propoſitis pulſum differentiis, tres illæ priores, à conſequentibus motum
deſumptæ, omnium maxime ſunt propriæ: reliquæ duæ non item. Quandoquidem
poteſt motus eſſe ſine ictu, ac ſine vlla arteria: mollitie vel duritie, non poteſt tamen eſſe
continuus, abſque tempore & loco, neque diſcretus, abſque quiete, & intervallo. Hinc
Galen. 1. de pulſ. dignot. differentiæ ab ictu, & arteria: ſtatu acceptas, minus proprias appel-
lat. Quod ſi inter ſe duæ iſtæ conferantur, adhuc minus propria eſt, quæ ad arteria: ſtatum
ſpectat, quam quæ ad ictum. Nam etſi motus poſſit eſſe ſine ictu, & ſine arteria: mollitie
ac duritie, ictu tamen nūquam poteſt eſſe abſque motu: Mollitiem vero atque duritiem
abſque vſo motu, facile præhendat. Gal. ergo ad hæc reſpiciens lib. de pulſ. ad Tyron. diffe-
rētiæ, ab ictu de promptas, inter proprias reſpoſuit, duritiem vero, ac mollitiem, minime:
Quam forte ob cauſam, Auerr. 4. collect. 17. pulſus duros & molles à primis pulſuum diffe-
rentiis ſuſtulit, ſicut: calidos ac frigidos, vacuos, ac plenos, de quibus nunc loquemur.

CAPVT VII.

De pulſu calido & frigido.

CVm intet tangēdum pulſum, neceſſario tactui caliditas vel frigiditas occurrat, hinc
Auiç. inter prima pulſuum genera, frigidi etiam, ac calidi, mentionem facit. De qui-
bus tamen Galen. ne verbum quidem: Et ſane, iure optimo; Caliditas enim, atque frigi-
ditas, neque ad motum, neque ad arteria: ſtatum, neque ad facultatem ſpectant. Nam, et-
ſi inter tangēdum pulſum, calor, aut frigus tactui occurrat, attamen cutis, atque carnis
potius, quam profunde arteria: qualitates edocet; idcirco in quacunque corporis parte,
in qua nulla etiam ſit arteria, eaſdem tactus inueniet. Calidus ergo atque frigidus pulſus,
à reliquis primis differentiis, non iniuria, venit expungendus.

CAPVT VIII.

De vacuo, & pleno pulſu ex Galeno.

QVem admodum calidum ac frigidum pulſum, ab Auiç. propoſitum, reieci-
mus, ita vacuum & plenum, ab eodem inter primos relatam (quicquid Fuchſius in oppoſi-
tum ſentiat) lubentiſſime admittemus. Primum autem, quid de eo Gal. cenſuerit, videa-
mus.

13

A mos. Galen. ergo lib. de puls. ad Tyron. & 1. de puls. diff. s. plenum, atque vacuum pulsum. Inter reliquas primas pulsuum diff. reponit, qui tamen 3. de dignor. 2. & 3. longa admodum oratione, demonstrare conatur, nullum esse pulsus vacuum, vel plenum à magno & paruo, à duro & molli diffinim. Itaque 1. de puls. diff. potius ex Archigenis, quam ex propria sententia loqui videtur, cum tam longo sermone eundem reprobare videatur. Sic vero totam producit orationem: Plenus, inquit, & vacuum pulsus quatuor principiis dici potest modis: primo quidem, ratione materiae consentis; Secundo, ratione arteriae continentis; tertio, ratione facultatis mouentis; quarto ratione spiritus, qui est facultatis instrumentum. Sed sic est, quod aliqui ex istis modis, ad priores differentias referuntur, alii vero, nil prorsus significant, quod ad pulsus conferas doctrinam: Igitur sunt omnes reiciendi. Quomodo autem Gal. antea dicens confirmet. videamus.

Priorem pleni, ac vacui significacionem in duas subdividi: Nam ratione materiz in aliqua cavitate contentæ, duobus modis plenum, ac vacuum accipimus, aliquando quidem plenum dicentes illud corpus, quod aliquam in se contineat materiam, ab ære distinctam, propterea, tactui, ac visui sensibilem, siue sit aqua, aut vinum, aut oleū, vel quid simile. Contra vero vacuum dicentes corpus, quod solo ære plenum sit, in qua significacione, inflatum follem vel vesicam, vacuum nuncupamus, quæ nihil, præter ærem contineat, plenam vero, quæ liquorem quæ mpiam. Altera pleni significatio, ratione materiz, est illa, in qua dicimus, corpus esse plenum, quod cum extensioni sit idoneum, nullam cavitatē partem, habeat vacuum, sed secundum omnes sit extensum: contra vero, illud esse vacuum, quod aliquas habeat partes inanes, idcirco laxas, ac minime tenfas. Sic dicebat Archig. plenum esse pulsam, qui arteriam ostendit pleniorē, & extensam, humide humidā, vacuum autem arteriam, facit bullosam, vt digitorum impressioni, egressus per vacuum occurrat.

Hacigitur stante duplici plenⁱ ac vacui significatione, à concreta materia desumpta, utramque Gal. improbare tentat, & primo, primâ, hoc modo: si quis esset pulsus plenus, aut vacuum; in prima significatione, sequeretur nos ex solo pulsu diuinare posse, continetur ne in arteria sanguis; aut spiritus, sed consequens est falsum, ergo & antecedeas, Falsum esse consequens, facile probat, Hydropsis exemplo: sicut enim inflatum ventrem, nemo ex simplici tactu nouisse potuit, continetur ne ibi aqua, an status, sed opus est experientis, aut ventris percussione, aut egrî in latera circumuolutione, aut alia id genus, operatio ne, ita neq; ex simplici pulsus contractu, certo quis asserere poterit, corpus contentum esse sanguinem, ut inde inferat, pulsum esse plenum, an esse spiritum, ex quo asserat, pulsus esse vacuum. Si enim hoc posset tactus consequi, facile esset dirimere litem illam tam celebrem, Inter Gal. & Erasistratum, continetur ne sanguis in arteriis, an spiritus tantum, sed his ista nunquam ex tactu dirimi potuit, sequitur ergo pulsus non posse hanc plenitudinis aut vacuitatis speciem demonstrare, Itaq; non debet in hac prima acceptione pulsus plenus aut vacuum dici:

Sed neq̃ in ſecunda, quandoquidem, cum in hac illud dicamus pleni, qui opponit ſemipleno, quia ratione amphoram, aut aliud vas plenum vocamus, quod nihil amplius capere poſſit, ad differentiam eius, quod pro media fui parte, liquorem continet, hanc ſignificationem, ait Gale. coincidere, cum pulſu magno, & paruo: magnus enim pulſus, habet arteriam dilatata, extenſamq̃ ad omnes partes, vacuus autẽ, & contra. Et hæc tenus de prima ſignificatione, quæ in duo membra diuiſa fuit.

Secunda autem significatio, ratione attrita; et illa, in qua rem dicimus plenam, id est solidam, denigam, ad illius differentiam, quæ est laevis, & rara, quæ ratione lanam plenam dicimus aliquando; quæ solida sit: Hanc vero significationem coincidere cum duro, atque molli pulsu, docet ipse Galen.

Tertia pleni, & vacui significatio, effratiōne facultatis mouentis, cum scilicet, pleni dicimus, quod resistit, & suo noscitu quoque ferit: Vacuum è contrà: Et hanc significationem coincidere cum vehementi, atque debili pulsû, nemo non nouit.

Quarta, & vltima significatio potest desumi, à spiritus qualitate, vt dicamus, plenum esse pulsus qui habet spiritum calidum, vacuum autem, qui non calidum, sed hæc non est pulsuum differentia adscribenda, vt neq; humiditas, neq; siccitas. Si ergo nulla ex his

Galimus nō
admiratur
perfectum pla-
num ac ubi-
quumque.
Quis enim
dicatur pla-
num ac ubi-
quumque.

Quid planti
corpus, et
virescentia
materiam.
Quid vegeta-
tionis corpus.
Qua altera
plant signifi-
cat.

Galathea
mar. non de-
reposita pla-
naria. non de-
posita.

2. *Significance*

*Tertis plan
de Gama
pauca.*

it
is

pleni, & vacui significationibus est accipienda, sequitur non dari plures genericas pulsum differentias, primas ac proprias, quam quinque, si Galen. credimus: cuius sententiam securus est Vallis, *3. contr. contram 4.* & ante illum Ioseph. Struthius, atque alii.

CAPVT IX.

De pleno, & vacuo Pulsu, propria sententia.

TAED ET sane, pudetq; à Galen. omnium Medicorum Antesignano, quandoq; discedere; sed cū plus cogat veritas ad dicendū, quam possit pudor ad retrahendū, libere philosophari oportet, sicuti in hac parte, qua de pleno ac vacuo pulsu instituta est disputatio. Mihi enim videtur Auicennæ potius, aliisq; omnibus adhaerendum, qui vacuum, & plenum pulsum, tanquam primas à reliquis distinctas differentias, proposuerūt, quā Galeno, qui has impugnare visus est. Vt autem rei veritatem consequamur, illam accipio pulsum pleni, ac vacui significationem, qua dicimus plenum esse pulsum, cuius membrana ob impleam cavitatem, sunt tensæ: Vacuum vero, cuius ob materię inopiam, laxæ, atque confidentes sunt. Hos Gal. cum magno, & paruo coincidere docuit: quantum autem distent, nunc expendemus. Magnus est pulsus, qui arteriam, *sive amplam, sive angustam,* multum distendit. At vero alius est corpus membranolum distendi, aliud autem extensum esse: Illud, significat motum, & rem fientem, hoc vero, quietem, & rem factam. Distert ergo magnus, à pleno, *sicuti res mota, ab immota:* Et sicut fient, à facta: Idcirco plenus fit pulsus à corpore infuso permanente, magnus vero à facultate mouente. Aliud igitur est plenam seu turgidam tensamque omni ex parte apparere arteriam, ob corpus infusum, aliud vero in omnes dimensiones, multum moueri, ob facultatem, à corde impertitam, & aliud est, esse vacuum, vel saltem semiplenam, propterea laxam, atq; flaccidam, aliud vero illam vix moueri, atq; dilatarı. Non ergo coincidunt magnus cum pleno, aut vacuum cum paruo: imo vero, potest esse magnus in vacuo, & paruus in pleno. Multo autem minus coincidit plenus ac vacuus pulsus, cum duro & molli: Quamuis, n. dure efficiantur arteriarum tunice, cum in propria substantia impleantur, longe tamen alia erit ratio, si illis minime impletis, cautas ipsa tātum repleatur. Tunc enim nemo nō poterit facile experiri, mollē esse membranam, cavitatem plenā existēte: & quandoq; durā, vacuā existente cavitatem, quod tunc membrana ipsa sit impleta. Hoc quidem Medie. confirmari potest exēplo, in hydropē enim leucophlegmācia, & Ascite, plenus & mollis erit pulsus, in tabidis vero vacuus, & durus. Alia itaq; est durities, alia plenitudo, alia mollietas, alia vacuitas. Nō est ergo pulsus plenus & vacuus, ad magnos, paruos, ad duos vel molles, vllaratione referendus, sed ad substantię quantitatem in cavitatem contentam. Nouisse autem vtrum substantia hæc sit sanguis, an spiritus, an vtrumque, nil ad vacuitatem, aut ad plenitudinem spectat. Hoc satis est consequi, corpus à natura cavitatem donatum, dum aliquo corpore impletur, quandoque omni ex parte impleri, aliquando aliqua tantum, hancque impletionem, vacuitatem, mediumne statum, esse factum, ac stabilem, idcirco multo aliter apparere, quam in magno aut in paruo, in duro aut molli pulsu. Hoc enim posito, pleni, vacui, ac moderati pulsus differentia exoritur, magni sane vsus, vt suo demonstrabimus loco. Hæc igitur de primis pulsum differentijs, simplicibus, sensibilibus, ad artem conferentibus dicta sufficiant.

CAPVT X.

De compositis Pulsuum differentijs.

AD compositas me iam consero pulsum differentias, quarum nonnullas inuenio sibi ipsis consistentes, siue compatibles, vno verbo, quæ simul stare possint & in tangendis pulsibus inueniantur, alias vero minime, ideoque assistentes nuncupatas.

Compatibiles ergo, & vsui medico conferentes differentię numero sunt quindecim, quales in subiecto proponemus schemate

Magnus,

A	Magnus,	Celer,	Vehemens,	Mollis,	Creber.
	Moderatus,	Moderatus,	Moderatus,	Moderatus,	Moderatus.
	Parvus,	Tardus,	Debilis,	Durus,	Rarus.
	Magnus,	Moderatus,	Moderatus,	Moderatus,	Moderatus.
	Magnus,	Celer,	Moderatus,	Moderatus,	Moderatus.
	Moderatus,	Moderatus,	Vehemens,	Moderatus,	Moderatus.
	Moderatus,	Celer,	Vehemens,	Mollis,	Creber.
	Moderatus,	Tardus,	Debilis,	Durus,	Rarus.
	Parvus,	Celer,	Vehemens,	Mollis,	Creber.
	Parvus,	Moderatus,	Moderatus,	Moderatus,	Moderatus.
B	Moderatus,	Celer,	Debilis,	Mollis,	Rarus.
	Moderatus,	Moderatus,	Vehemens,	Durus,	Creber.
	Moderatus,	Moderatus,	Debilis,	Mollis,	Rarus.
	Parvus,	Tardus,	Moderatus,	Moderatus,	Moderatus.
	Moderatus,	Moderatus,	Debilis,	Mollis,	Moderatus.

Reliquæ omnes, quæ ex horum connexu consurgere possunt, quanquam sane plurimæ, utpote incompatibiles sunt refellendæ, ut esset complexio Magni & Debilis, Magni ac Duri, & id genus. Has tamen apud Gal. atque alios, curiosus Lector procurare poterit, à quo labore nos consulo abstinemus.

CAPVT XI.

De pulsibus inæqualibus in genere.

Pulsuum differentias, quas secundos vocamus, ad tria redigimus capita, ad æquales, & inæquales, ad ordinatos & inordinatos, ad Eurythmos & Arythmos. Dicuntur hæc omnes differentię secundę, quia sine primis nihil sunt, sed omnes circa vehementiam, magnitudinem, celeritatem, frequentiam, duritiem, aut opposita contingūt. De æqualibus atque inæqualibus, primo loquemur tam in genere, quam in specie, mox & de aliis consequenter.

Æqualis igitur pulsus dicitur, qui in omnibus est par in æqualis vero, qui impar.

Hic vero, vel est simplex vel compositus: & uterque vel est simpliciter talis, vel secundum quid.

D

Simpliciter, qui secundum omnes simplices, atque compositas pulsuum differentias est impar: secundum quid vero, qui vnicā vel saltem nō omnibus. Rursus autem in æqualitas, aut est collectiua, aut vnus tantum ictus: & quæ vnus ictus, aut est sub vnicō digito, atque ideo in vnicā arteriæ parte, aut sub variis digitis, variisque arteriæ partibus. Et tam collectiua, quam hæc vnus ictus, est duplex, dispar, & interrupta.

Quæ vero dispar, vel facit pulsū in æqualem inæqualiter, vel æqualiter. Singulæ istarū differentię alias sub se habent, partim nominatas, partim nō nunciate, quæ nunc à nobis sunt considerandæ: ac primum quidem simplices, mox compositæ.

CAPVT XII.

De inæqualitate systematica in genere, & de inæqualibus æqualiter in specie.

Inter primas simplices in æqualis pulsus differentias, systematice, seu collectiue occurrit consideranda, quæ circa omnes quinque primas versatur, scilicet Vehementiam, Magnitudinem, Celeritatem, Frequentiam, atque Duritiem, cum suis oppositis. Cum vero duplex sit, Dispar atque Interrupta: Disparque adhuc duplex, æqualiter aut inæqualiter: prima differentia, est pulsuum, quos Myuros vel Deuratos appellant.

Sunt autem inæquales potissimum vehementia, & imbecillitate, magnitudine ac paruitate, in quibus secunda pulsatio est languidior ac minor prima; & tertia minor secunda, ita ut sensim, ac proportionaliter diminuatur, tantisque sit defectus secundi motus respectu primi, quantum terti respectu secundi, & sic deinceps. Hinc pulsus iste cauda muris vocatur, & inter inæquales æqualiter connumeratur. Habet autem hic sub se alias differentias, vel enim prorsus deficit, vel non: prior, Myurus deficiens; alter, non deficiens vocatur.

B 2

Rursum

Rursum deficiens vel recuperat motum, vel non: si recuperet, dicitur deficiens reuelari: si non recuperet, nomine caret.

Hactenus de Myuris cum Gal. Quibus tamen si Auic. augescens adiunxerit, qui scilicet æqualiter ad augmentum magnitudinis tendant: Hinc tamen aures nime porrigendas putamus, quod vel ad myuros receptocos reduci possint, vel saltem insensibile sit hoc illorum æquale incrementum. Et hactenus de myuris in pluribus idibus.

CAPVT XII.

De aliis quibusdam inæqualibus inæqualiter inæqualitate systematica.

Pulsuum inæqualiter inæqualium, inæqualitate collectiua, quidam sunt innominati, alii vero nominati.

Innominati pulsi.

Innominati quidem sunt disparēs illi, qui in celeritate, magnitudine, vehementia, crebritate, aut duritie, nullam seruant Arithmeticam proportionem, non enim paulatim, sensim, ac proportionabiliter, vt Myuri, sed improporcionabiliter admodum, & assatim transiunt ab vno in aliud extremum vel vehementi, vel magnitudinis, vel alterius differentie.

Nominati pulsi.

Nominati autem duo sunt, Intermittens, & Intereurrens, de quibus vtrisque tanquam de illis, qui longiorem caposunt orationem, sigillatim agendum.

CAPVT XIV.

De intermittentibus atque intercurrentibus pulsibus.

Quid pulsi intermittentes.

Intermittens pulsus, interceptus quoque, & interruptus vocatur: Est autem inæqualis inæqualiter, ratione raritatis, si Galeno credimus. Cum enim deficiat quandoque vna, quandoque vero duplex, & triplex pulsatio, hinc maximum intercedit interuallum inter duas diastoles, quale nunquam fit, quando nulla pulsatio intermittat. Cæterum nihil prohibet, quo minus paruitatis quoque, & imbecillitatis inæqualitatem huic tribuamus. Si enim motum prorsus admittit, igitur & contentionem & distentionem omnem. Placuit tamen Galeno, Myuris deficientibus paruitatis inæqualitatem tribuere, intermittentibus vero raritatis, quod illi sensum suam perdant magnitudinem, hi vero assatim & confertim: vt propterea iure optimo, hic inter inæquales inæqualiter sit connumeratus, quia absque vlla proportionē a vehementia atque magnitudine in abolitum transit. Non est tamen hic pulsus ex illis inæqualibus, qui omnium pulsationum perdat æqualitatem, imo vero, quandoque illam retinet vsque ad sex vel octo, modo plures, modo pauciores, postea vero eandem admittit, atque vicissim recuperat; quemadmodum & intercurrentes: qui sicut & interceptus, vnus est ex inæqualibus collectiuis inæqualiter, sed ratione crebritatis; nam inter duas æquales pulsationes in crebritate, quandoque vna, quasi superflua, interponitur, quæ frequentiores infert pulsus; Atque hæc, & tot sunt inæqualitatis collectiue species, vel differentie.

Quid intercurrentes pulsi.

CAPVT XV.

De inæqualibus disparibus in vno ictu, atque vnicæ arterie parte.

Disparis pulsi in vno ictu.

Inæqualium pulsuum, in vnicō ictu, atque sub vnicō digito, tres à Galeno constituntur differentie: quarum prima est Disparis; secunda Interrupti; tertia vero Differenti.

Disparēs pulsi in vnicō ictu, sunt vel ratione celeritatis, vel ratione vehementia, sed multo euidentius ratione celeritatis.

Inæqualitas vero secundum duritiem ac molliem, locum non habet: Neque enim potest arterie status in vnicō ictu ab vna in aliam transire conditionem.

Nil magis aut paruum dici potest, dum adhuc sit.

Sed neque magnitudinis inæqualitas, aut paruitatis, in vnicō ictu non interrupto, haberi potest. Cum enim nil quicquam dici possit magnum vel paruum, dum adhuc sit, & ad sui motus terminum non peruenierit; idcirco neque pulsus non interruptus, poterit dici maior in principio, aut fine, cum magnus aut paruum non dicatur, antequam discre-

A diffentionem suam compleat. Quod si motus interrumpatur, tunc poterit & magnitudinis & celeritatis adesse inæqualitas: sicuti in non Interrupto celeritatis atque vehementiæ, ut diximus. Est autem celeritatis ac tarditatis inæqualitas omnium maxime conspicua, eū scilicet motus principium à reliquis distat partibus: Dixi à reliquis partibus, Vult enim Gal. vnum & eundem motum, quandoque habere tria, quandoque quatuor tempora, de quare inferius differemus. Nunc autem diastole, in duas tantum partes diuisa, principium scilicet, ac finem, inæqualitatem hanc celeritatis ac tarditatis eum Gal. diuidemus in illam; quæ æqualiter, & aliam, quæ inæqualiter procedit. Et primum, quod ad inæqualem æqualiter spectat, sex oriuntur differentię, & ut ex subiecta constet tabella:

Dua diastoles partes.

B	In principio Tardus,	Moderatus in fine.	<i>Differentia inæqualis inæqualiter</i>
	In principio velox,	Moderatus in fine.	
	In principio Moderatus,	Celer in fine.	
	In principio moderatus,	Tardus in fine.	
	In principio paulo tardior, in fine aut moderatus, aut paulo celerior.		
	In principio paulo celerior, in fine vel moderatus, vel paulo tardior.		

Hæ omnes differentię dicuntur inæquales æqualiter, quia transitus ab vna in aliam conditionem, sensim, paulatim, atque cum quadam proportionē, idcirco in hac inæqualitate æqualiter facta, nunquam transit pulsus ab vno, in alium terminum absque medio. Quod si fuerit inæqualis inæqualiter, alie sex confluent differentię, à prioribus diuersæ, ut sunt:

C	In principio Celer,	Tardus in fine.
	In principio Moderatus,	Celer in fine.
	In principio Tardus,	Celer in fine.
	In principio Celer,	Moderatus in fine.
	In principio Moderatus,	Tardus in fine.
	In principio Tardus,	Moderatus in fine.

Notandum autem ex his differentiis, quatuor conuenire cum prioribus æqualiter factis: scilicet

D	Moderatum	Celerem.
	Celerem,	Moderatum.
	Moderatum,	Tardum.
	Tardum,	Moderatum.

Hoc autem distans, quod in pulsibus æqualiter factis, sensim, atque proportionē quadam Arithmetica, sit hic transitus ab extremo ad moderatum: in pulsibus inæqualibus, inæqualiter, sit affatim, ac sine ulla proportionē.

Secundo notandum, duas priores differentias, raro admodum posse contingere: Non enim quemlibet affectum tanta potest consequi mutatio, ut tardissime initio agitata arteria, ad extremam denique celeritatem perueniat, vel è contra.

Illud præterea animaduertendum, simul cum reliquis pulsibus inæqualibus inæ-

E qualiter in vnico ictu, tres à idis differentias posse, ut essent numero nouem, sunt autem illæ:

Celer,	Celer.
Tardus,	Tardus.
Moderatus	Moderatus.

Quas Galen. ab inæqualibus relicit, non iniuria, quia omnes sunt inæquales; idcirco confusione parent. Et hæcenus de inæqualibus, secundum duo tantum tempora: De aliis vero, propter tria vel quatuor tempora, inferius verba faciemus.

C A P V T X V I.

De pulsibus in vnico ictu interruptis.

Secunda inæqualium pulsuum differentia in vnico ictu, est eorum, quos Galen. interruptos vocat, eo quod vnica diastolen habeant, in duas partes diuisam. Hos manifeste patet inæquales esse inæqualiter, quod motus nulla seruata proportionē, à magnitudine,

B 3

dine, celeritate, atque vehementia effatu digna, in extremam deluet, ac desinat partitatem, tarditatem, atque imbecillitatem: vno verbo, in quietem atque intermissionem. Quia vero multo euidetior est hæc inæqualitas in celeritate ac tarditate, quam in magnitudine atque vehementia, idcirco fit nobis inæqualitas ista exempli loco. Etenim aliarum eadem erit ratio.

*Interrupti
pulsus diffi-
cultas.*

Novem ergo interrupti pulsus exsurgunt differentie à celeritate & tarditate depromptæ, vt sequens demonstrat pagella.

Celer.	Tardus.
Celer.	Moderatus.
Celer.	Celer.
Tardus.	Celer.
Tardus.	Moderatus.
Tardus.	Tardus.
Moderatus.	Celer.
Moderatus.	Tardus.
Moderatus.	Moderatus.

Habent ergo hæc omnes inæqualitatem, sed sex illarum duplicem, tres autem simplicem: sunt vero tres istæ, tertia, sexta, nona. Istæ enim præter motus interruptionem, nullâ obtinent inæqualitatem: reliquæ vero sex, præter interruptionem, habent etiam motus initium à fine aliqua ex parte diuersum. Tot ergo sunt inæqualitates in vnicuique istius, sub vnicuique d. gito, pulsu interrupto existente, ratione celeritatis ac tarditatis.

Quod si his magnitudinis inæqualitates addiderimus, erunt & ipsæ novem, sicut & priores, simul vero cum prioribus octodecim.

Denique si etiam alias novem vehementiae atque imbecillitatis inæqualitates proponere voluerimus, erunt ad summum viginti septem: sed frustra hæc adduntur, quia omnium tandem vnica est ratio.

C A P V T X V I I

De pulsu recurrente ex Galeno.

*Difficilis esse
dicrotorum
consideratio
nem.*

Quamquam nulla sit contemplationis pulsuum pars, quæ non plurimis sit implicata difficultatibus, & variis involuta tenebris, nulla tamen mihi aut magis intricata, aut difficilior obscuriorque visa est vnquam hæc, quæ de Dicrotis, seu recurrentibus pertrahatur. In qua, præter reliqua omnia, quæ difficultatem pariunt, visus est mihi Galenus vsque adeo sibi ipsi contrarius, vt quid tandem de his sentiat, nemo certo consequi possit.

Ne vero gratis hæc dixisse videar, sciendum est, difficile esse hanc dicrotorum speculationem, & ratione generis, & ratione differentiarum, & ratione modi, quo produciuntur, & denique ratione causarum, à quibus excitantur. Examinabo sigillatim omnia, partim hoc in loco, partim vero in alio, vbi de causis sermo erit. Hoc autem in loco de genere & differentiis, ex professo agendum, obiter vero de productionis modo ac causis.

*Intentio au-
dioris.*

Quod ergo ad genus spectat, quatuor faciemus: Primo quid alii sentiant, proponemus. Secundo Galeni refutationes adducemus. Tertio, vtrum refutationes illæ aliquid roboris habeant, exponemus. Quarto Galeni sententiam adducemus, cuius examen in alium transferemus locum, vbi & nostram proponemus opinionem.

*Opiniones
varia de di-
crotorum
genere.*

Ad primum ergo quod attinet, tres inuenio fuisse de genere Dicrotorum opiniones: quidam enim existimant, illos non esse diuersum quoddam genus ab interruptis, sed genere eosdem, specie vero diuersos, quatenus scilicet, secunda recurrentium pulsatio, sit priore minor, interruptorum vero maior. Idcirco priorem vocat dicrotorum, posteriorem & autem caprizantem, seu vt Auicennæ verbis utar Gazellantem.

Secunda sententia illorum fuit, qui existimant dicrotorum non esse quidem Interrupti speciem, sed potius Intercurrentis, vt sicuti Intercurrens est crebriore inæqualis, atque

A que in x qualitatē habet collectiuam, non vnus iſtus, ita & recurrens crebritate ſit inqualis, atq; in x qualitatē habeat collectiuam, non autem vnus iſtus.

Has duas antiquorum, atq; quorundam recentiorum ſententias, Gal. 1. de pulſ. diff. 16. euertere conatur, vt tandem propriam, quæ tercia eſt, proponat, atque confirmet. Vtramq; vero hoc poſſiſſimum fundamento euertere nititur. Interruptus in recurrensq; pulſus mediū habent ſyſtolen, recurrens vero ea caret, ergo recurrens non eſt interruptus, nec intercurrentes: Huius argumenti minorem, ſi probaſſet Gal. rem proſecto certam effeciſſet, Dictorū ſcilicet eundem non eſſe cū interrupto, ſed cum non probauerit, ſane nil hucūſque concludit hæc ratio. Quod enim dicat, id apertum illis eſſe, qui contractionem ſentiant, atque dignoſcant: dictorum ſcilicet, ſimul atque omnem effecit diſtentionem, ſe pauliſper ſubducere, ac mox iterum pulſare, vt interrupti quies ſit media, dictorum vero contractio, vel congeſſus, vel reditus: Nihil dicit, contractionem enim eſſe ignotam, infra demonſtrabimus, idcirco non eſt probatio, ſed rei dubiæ aſſertio:

At dicet quiſpiam, non ne probatur, cum dicat Gal. in dictoro non contrahi, ſed decedere arteriam. Itaq; hoc reſeſſus genere illius naturam declarare? Scio Galenum dixiſſe, hoc genus reſeſſus præ cæteris Dictorum naturam declarare, ſed vbi nam probatuſ eſt, Dictori reſeſſum eſſe decidentiam, non contractionem? Subiungit quiſpiam id confirmatum à Gale, exemplis, ſeu ſimilitudinibus. Videamus ergo, qualia ſint hæc exempla, & ſimilitudines, & vtrum Galeni intentum probent, necne.

Duplex eſt hæc ſimilitudo, quam vltur Galen. ad probandum, in dictoro fieri decidentiam, non contractionem. Idcirco nullam eſſe mediā quierē, inter duos iſtus. Prima, à malleo incudem percutiente accepta eſt: Altera à ramis vi tractis, & inflexis. Et mallei quidem exemplum ſic procedit: Sicuti malleus ad in eundem percuſſus, ge minos parit iſtus, quorum prior, ex longo intervallo incutitur, valideq; ſetit; ſecundus veto, cū quaſi reſulteret ab incude malleus, non ita multum, in eamq; recidit, non ita, vt antea, valenter, ſed languide, breuiq; admodum intervallo: Ita & Dictori duplex eſt iſtus, quorum prior eſt maior, ſecundus minor, nam arteria, quaſi in occurſu repellitur. Ram. rō quoq; exemplum huc tendit: ſicuti enim vi tracti rami indeq; diſmiſſi, dum ad priſtinum redire locum contendunt, non ſtati reſiſtunt, ſed eodem, vnde abierant, ſæpius reuerſi non æquum ſumunt intervallo; imo veto, ab initio maius, deinde paulatim minus, donec quieſcant: Ita quoque vibrata arteria, ab initio magnam facit diſtentionem, antequam vero quieſcat, quandoque aliam, ſed minorem; quandoq; etiam plures, cum de lapſum à primo diſtentionis terq;no, nulla dirimit manifeſta quies, vt anima diuertitur in contractione, ſed ſimul atq; attolli deſiſtit, recidit, atq; illa paulatim vibrata, mox iterum occurrat. Hæc Gal. 1. de pulſ. diff. 16. protulit, vt ſimilitudine aliqua probaret id, quod propoſuerat, Dictorum ſcilicet media catere quiete, idcirco ab interrupto & intercurrente diſferre. Quæ tamen nos vel nihil, vel parum concludere putamus, vt ſequenti capite explēbimus, in quo exempla hæc ſub examinis in eundem reuocanda eſſe cenſemus.

CAPVT XVIII.

E An pulſus Dictorum malleo, vel ramis riſe fueris comparatus.

Dictoros bis pulſare, cum Galeno lubentiſſime acepio: Fieri vero ad mallei vel virgarum ſimilitudinem, neq; intelligo, nec in Gal. doctrina ſtare poſſe, inuenio.

Primus quidem, Dictorum non fieri ad mallei ſimilitudinem, quæ ſequuntur, demonſtrant: Si fieret Dictorus, ad mallei ſimilitudinem, incudē percutiens, ſequeretur arteriā, dū mouetur, inuenire aliquod ſolidum corpus, à quo ipta iterum repercutiatur, nempe eutem, carnem, aut digitos tangentes: cum enim malleo compararetur, ſicuti non poteſt abſq; incude repercuti malleus, ita & in pulſu, non poterit tepercuti arteria, niſi corpus hoc durum inueniret: At nullum tale corpus inueniri, aut ne quidem excogitari poteſt, neq; enim caro, cutis, aut digiti tangentes in modum incudis duri ſunt: qui ſi eſſent, in hac percuſſione ſonum edere nt, quem minime edunt: ergo prima hæc ſimilitudo locum non habet. Quo factum eſt, vt Gal. ipte 2. de preſag. 2. hanc rei eeerit dictori pulſus cum malleo ſimilitudinem, & apertiffimis verbis palinodiam cecin erit, ab Archigene ſe deceptum fuiſſe aſſirmans.

B 4

Sed

*Hæc ramis,
quæ ad hunc
comparantur
pulsu.*

Sed neque altera à ramis, & virgultis desumpta probabili esse videtur, quandoquidem aliud est fistulosum corpus dilatari, aliud vero solidum flecti: Arteria fistulotum est corpus, non solidum, ideo non flectitur, sed potius dilatatur. Et quamvis dicat Gal. arteriam in dictoto, à sua sede dimoueri, quatenus est vibrata, nihilominus, nunquam permittent partes arteriam continentes, illam tantopere à sua sede dimoueri, vt ramorum fractorum, atque dimissorum motum æmuletur. Confirmatur, quia rami et arteriarum tunice duriores aliquantulum fuerint, nunquam tamen vsque adeo solidae erunt, vt concussæ, motum semel conceptum, secundo, atque iterum valeant repetere. Quinetiam, quæ semel mota, ad inum locum redeuntia, bis & pluries, in eodem spatio agitantur, ab externo & violento mouente concuriuntur. In pulso vero dictoto, præcipuum mouens est Internum.

Adde, quod si à facultate pulsifica hunc fieri motum dicas, cum hæc non minus de contractione, quam de distentione, sit sollicita, nunquam permittet, hanc repetitam distentionem, absque contractione fieri.

Quod si violentum hoc esse mouens asseras, non erit amplius pulsus, sed palpitatio, aut conuulsio.

*Dierotum
hæc
pulsu.*

Denique hæc quoque concessa similitudine, vibratis tantum d' crotis conueniunt, minime autem dierotis non vibratis, quos eum Galenus in duplici consiliu differentia, duos, & non duos, æquum erat, hos quoque aliqua explicare similitudine, cum prædictæ nulla ratione his conuenire videantur. Hæc cum ita sint, reliquum est v. deamus, nunquid alio exemplo dierotus explicari possit.

Non desunt autem ex recentioribus quidam, vt Struthius, Mercatus, Fuchsius & alii, qui similitudinibus nonnullis & Dierotum declarare, & eundem ab interrupto distinguere tentant. Sic enim aiunt. Simile quiddam esse in vulnere homine, cui duo aduersarii, duo in semur vulnera punctim infligant: sed alter sit, qui infixo ense in femur pungat primo, donec mero os femoris attingat, & modice retrahat ense, non expropterea, secundo pungat, eo vsque quo prius. Alter ense infligat femori, & pungat non adeo profunde, sed medius tantum femoris musculos mucrone attingat, ac paucula mora interposita, ense nihil retrahens, secundo pungat profundius, ad os vsque femoris. Vtrumque istorum bis feriendo percussisse aiunt, sed illum contrariis motibus esse vsu, pugebat enim bis ac retraheretur: hunc vero bis punxisse absque retractione, modicam in medio vulnere faciendo moram. Huic ergo interruptos, priori Dierotum comparant, quem triplicem esse dicunt: Primum quando nondum perfectam distentionem contractio excipit, mox sequitur distentio, & ictus secundus. Alterum, cum ad perfectam distentionem succedit contractio, deinde secunda distentio. Tertium, cum distentionem quam primum sientem, contractionis motus contrarius retrahit, atque impedit, & debilius cum sit ob impedimentum, permittitur reliquum implere secundæ distentioni.

Addunt præterea Dierotum explicari posse per similitudinem, quæ cum respiratione habet. Sicut enim desidiosi quidam, & voluptuarii, dum meditantur, vel cum amatis loquuntur, ac pueruli dum plorant, loco vnus duas faciunt in inspirando distentiones, ita & in pulsu quandoque contingit, vt in vnica d' astole duæ fiant pulsationes. Hæc apud varios inueni, quibus diroti naturam, distinctionem ab aliis, & differentias explicare conati sunt. Vtrum vero intentum sint consecuti, iam examinabimus.

Primum autem similitudinem illam vulneris duplici modo inspicit, haudquaquam Dieroti ab interrupto distinctionem proponere pro certo habeo. Etenim si interruptus illi comparatur vulneri, in quo ensis non retrahitur, Dierotus vero illi in quo retrahitur, sane ex eo statim constat, in interrupto contractionem non esse mediam, in Dieroto autem adesse. At vero huius oppositum Gale. ipse apertissime docet, interruptum se licet mediam habere contractionem: Dierotum & hac carere, & quiete, igitur falsa est comparatio.

Idem vero de duplici inspirationis motu censendum. Cum enim ille in medio sit interruptus, caprizantem potius, vel alium similem, quam Dierotum depingit. Mitto Dieroti tres illas d' fierentias ab his propositas, & à Galen. 2. de præse. ex pul. 8. desumptas non Dierotis, sed interruptis potius congnire. Quandoquidem Dierotus est duplex pulsus,

non.

A non autem vnicus, aut in duas partes sectus, aut postrema sui partem amittens: Interrupti hæc sunt propria, vt cuique intelligenti patet: propterea omnia hæc relinquenda, & ad Galenum iterum confugiendum, vt videamus, numquid ex eo aliqui dè xpikari possimus. Quod si ex voto res non successerit, saltem illius mentem apprimè obicuram interpretemur: quo deinceps facilius nos ipsi veritatem tandem si Deo placuerit, aperire possimus.

CAPVT XIX.

Quis sit Dicrotus pulsus, & quoruplex, ex Galeno.

HACTENVS, ni fallor, constat, Galenum, illos non satis refutasse, qui existimant, Dicrotum esse Interrupti aut Intercurrentis speciem, cum nec satis probauerit **B** Dicrotum media carere quiete. Reliquum est vt videamus, nūquid alia sint in Gale. quæ hoc probent: Posset enim quispiam opinari ex iis, quæ Galen. de horum pulsuum natura ex propria doctæ sententia, colligi non modo ipsius rei explicationem, sed & aliarum opinionum refutationem, idcirco paucis in præsentî capite proponam, quisnam sit Dicrotus pulsus, ex Gal. sententia, quoruplex, & quomodo quædã illius species gigni possit, vt deinde videat sponte sua vnusquisque, nunquid aliarum opinionum refutatio ex his colligatur.

Galenus itaque ad Dicrotum ex propria sententia explicandū, seipsum conuertens, *Galeni de dicroti sententia.* voluisse videtur, illum, nomine, forma, pulsationis modo, ac causis, omnino ab interrupto, & ab inæquali crebritate differre.

C Nomine, primum, nam Dicroti vocat bispulsantem, interruptum vero bisferientem.

Forma autē, etenim eum, qui bis ferit, vult esse, in media distentione, interruptum, mediāq; habere systolē cum vero, qui bis pulsat, inquit, non interrupti, sed duplicem conuertitur diastolē, abq; media tamen systole.

Quia vero is, qui duplicem habet diastolē vsque ad eā crebram, vt carere systole videatur, maximam habet cum Intercurrente affinitatem, vult Galenus Dicrotum ab Intercurrente, ex eadem systole distingui, vt scilicet Intercurrens mediā habeat systolē, Dicrotus minime: præterea, Intercurrentis pulsationes vehementia atq; magnitudine inter se non differre, tametsi vna, sit reliquis crebrior, forte etiam celerior: Dicroto vero **D** secundam pulsationem, priore manifeste, plerumque & minorem, & imbecilliorē existere. Hæc illa sunt, quæ pro Dicroti ab aliis cōsimilibus distinctione, ex Galeni mēte, haurire potui. Quæ tamen nil adhuc firmi, vel ad aliorum sententiam refutandam vel ad propriam fulciendam continent.

Galeni sententia examinatur.

Quod enim Dicrotum bispulsantem, bisferientem vero interruptum vocemus, ad placitum esse videtur, nisi diuersa essentia ratio constitutur. Cum autem ad essentiam nec conuertitur diastolē, in eundem incidimus scopulum, in quem & antea incurrimus.

Si enim dicamus ideo bispulsa re dicrotum, eo quod sit duplex diastole: bis ferire interruptum, quia sit vnica: Vnde: quæso, constat, duas esse illius diastoles, huius vero vnica? Hoc profecto, erat ratione comprobandum: Si enim dicamus Dicrotum binas habere pulsationes, quod sint eiusdē magnitudinis ambiq; hoc falsum esse, Gal. testimonia **E** comprobatur, qui dicrotum, inquit, esse vehementia, magnitudine, ac celeritate inæqualem: quatenus scilicet vna pulsatio altera minor, imbecillior, ac minus celer est: ergo ex hoc inferre non possumus, duas esse dicroti pulsationes, interrupti duos ictus, vnica vero diastolē.

Dicroti non habere binas pulsationes, sed vnam, eandem magnitudinis æquantem.

Accedit, quod statim in aliud incurremus obstaculum, dicrotum scilicet intercurrentis induere naturam, cum & ipse bis pulset, æqualesq; habeat distensiones. Vt iterum ergo transeamus, & ad dicroti differentias pergentes, videamus nunquid ex illarum explanatione hæc veteris ex tenebrarum antro erui possit.

Dicrotum Gal. triplicem constituit, duos scilicet duos, vnum vero minime **F** rum. Duos subdiuidit in Vibratum, & non Vibratum: Habet suas quisque causas, atq; productionis modos, quibus examinat, s; facile hæc veritas tandem elucisceret, sed non est præsentis loci hæc speculatio, ideo nunc maior ex parte silentio inuoluetur, & dumtaxat nonnulla, quæ ad vibratum spectant, hoc loco subnectentur, cum à Gal. etiam, *de puls.*

Dicrotus pulsus triplex.

pass. diff. 16. satis accurate pertinerentur. Galenus itaque, eo loci de vibrato Dictoto ex profecto verbatim, differentias primum his proponit verbis: *Qua forma, cum dicretorum pulsus sit, differentia in illis omnibus, quae resulimus, generibus, et in plenitudinis, duritiei, et tenuitatis, vehementiae, et celeritatis, et in ipso primo motu, quam in reditu, et discessu. Nemo in ignem potest, et non in ignem, et vehemens, et celer, et non celer, et aliarum quarumlibet specierum altera esse, etiam vel aequalis, vel inaequalis.* Productionis autem talē proponit modum. Et breuiter vibrari omnino motum oportet, pulsus dicreti, ut in ipso primo ictu, veluti euecti, atque ex loco uniuersae arteriae migrans, potius efferatur, quam distendatur: huiusmodi enim sunt vibrati. Quod illi ubi cum vi aliqua acciderit, partes arteriae aliter, atque aliter moueantur, ut verbi gratia prima, secundaria, et frequenter quarta, et quinta cuius parti attollatur, et delabatur. Itaque sit aliquando, ut uno eodemque tempore, haec partes attolli, decidere illa videantur. Haec verba ut dixi, modum describunt, quo fit dicretus vibratus, quae, nisi fallor, sic possunt interpretari.

Tantum Galenus exponit.

Quando cum vibratione mouetur arteria, tunc non fit proprie distentio sed motus quidam violentus, in quo arteria multum et confestim ex proprio eueritur loco, ad naturalis distentionis differentiam, in qua arteria proprium non mutat locum. Dum autem sic violentius impellitur, motus non potest esse vnus, sed multiplex: Etenim prior motus violentus factus ab aere externo, vel alio corpore, ut carne, vel cute, quae fit obice, repercutitur, hinc recidit arteria, et secundo, tertio, et quarto ad eundem reuertitur motum, sed priore semper minorem, ut exemplo tamorum exposuimus: Quod sane magis quadrat, atque rem melius exprimit, quam aliud exemplum mallei ad incudem percussus. Ex quo patet, cur Galen. existimauerit, dicretorum vibratum, plures habere distentiones, sed abque contractione. Plures enim habet, quia redeunt vna post aliam, caret contractione, quia omnes distentiones, quae ob vim causae impellentis edeunt, sunt tanquam vnica distentio, ratione vnus tantum facultas mouentis, et ratione vnus finis, quem tunc sibi facultas proponit, ut scilicet aerem ita hiat frigidum, minime vero fuliginem expellat. Non ergo, quod eadem distentio pluries nobis occurrat, existimandum est multiplex, per mediam contractionem diuisa, imo vero multiplex absque contractione censenda est, quia ob vnicae causae vibrantis vim, quam adhuc in se retinet arteria, motus tripliciter secundo ad tertio reuertitur. Ex quo colligitur ad Galen. mentem, hunc pulsus, magna ex parte fore inaequalem, cum prior ictus sit a secundo et tertio diuersus, aliquando tamen, sed raro aequalem futurum, de circo ipse quoque Galen. inquit dicretorum quosdam esse aequales, alios inaequales. Poterit autem quandoque aequalis euadere, ob insignem facultatis robur, vsumque immodice auctum. Sed de causis postea.

Constat quinetiam, multiplicem hanc fore inaequalitatem, quandoquidem, prior ictus vehementia, et imbecillitate, magnitudine, ac paruitate, celeritate, ac tarditate, duritie, ac mollitie a reliquis erit diuersus.

Colligitur denique, hanc inaequalitatem fore vnus tantum pulsus, quia est distentionum abque contractione. Hic est Gal. discursus, quem de dicreto habet *1. de pass. diff. 16.* Ex quo, certum est aliorum opiniones non esse refutatas, ut infra fusius examinabimus. Cum enim praecipuum totius huiusce disputationis fundamentum in hoc versetur, nunquid bina dicreti pulsatio media habeat quietem, nec ne, si enim habeat, dicretus minime ab intermissione, aut inaequali celeritate erit diuersus, quod si careat contractione, sine diuersus quidam pulsus ab his erit constituendus: Tantum abest, ut haecenus Gal. id probauit, ut plerique (nec iniuria) existiment, id neque villo modo probari posse, eo quod repugnet rationi. Aristoteli, solidisque philosophiae fundamentis, dari duos inter se contrarios motus, absque media quiete. Quia ramen hoc Gal. asserit, ego quid hac in parte pro illius defensione sentiam, libere dicam, et quomodo hoc Gal. placitum, saluis etiam philosophiae fundamentis intelligi possit, aperiam. Neque tamen id facio, quod existinem id probari, in quo huius disputationis cardo versatur, dicretum scilicet, media carere systole: Hoc enim certo nil probat, sed tantum Galenum tueri profiteor. Primum autem et illud pro Galen. defensione minime reiciam, quod a Valef. proponitur, *construere, medietatem, 8.* dum probare nititur, inter duos contrarios motus nullam quandoque fieri quietem: ego tamen aliam subiungam tutelae modum, et est ille: Cum Gal. asserit, in eadem distentione, quae dicreti consistat, nullam cadere mediam quietem, hoc

tantum

Distentum
non est
et non est
et non est
et non est

Distentum
non est
et non est
et non est
et non est

A tantum voluisse existimo, inter hos duos motus interitum non reperiri quietem, quæ contractionem sequitur: Etenim si non sit contractio, neque fiet quies interna. Contractionem vero non fieri, partim supponit Gal, partim probat, quamvis frigide admodum, ut ostendimus.

Quod si de externa quiete, quæ contractionem præcedit, sermo habeatur, hanc pro certo habeo, non ablegasse Gal: cum absque vlla contractione fieri possit.

Addo, quod si sermo sit de illa quiete, quam nulla molitur facultas pulsifica, neque vllum habet finem, sed naturaliter fit, inter duos contrarios motus naturales, nil, ut arbitror, prohibet, quominus hanc concedamus, licet sensui admodum conspicienda non sit. Quod si etiam dixerimus, in dietro hoc pulsu, per vibrationis modum facto, nullam cadere quietem, nil, ut reor, à veritate alienum dixerimus: Etenim Aristoteles auctoritatem 7. physicæ, explicatam, de motu tantum naturali, non de violento intelligendam esse censeo: Vibrationis autem motus isti sunt omnes violenti, non naturales. ideo quod Valesc. & alii, exemplis demonstrare conati sunt, quandoque duos fieri motus contrarios, absque media quiete, in violentis tantum habebit, non in naturalibus. Constat ergo ex Galieno, quid sit dirotus pulsus, quotuplex & quomodo vibratus plures habeat distentiones absque contractione & quiete. Quomodo autem non vibratus, tam durus, quam non durus fiant, & an illi quodque contractione atque quiete constituantur, suo sutiis explicabimus loco. Hæc pro Gal, mihi dici potuisse, vitia sunt: quod tamen de hoc dietro pulsu sententiam infra multo vberius determinabo:

C

C A P V T X X.

De inæqualitate diversarum arteriarum partium, in vna distensione.

Pulsus inæqualitas, ex diversitate partium arteriarum, quæ in vna tantum distensione tanguntur exorta, duplex est, vna, quæ attenditur, dum in duplici loco apprimere disiuncto tangitur arteria, de qua suo loco; Altera, quæ versatur circa tactum vnius tantum loci. Hæc veto tot habet differentias, quot etiam collectiva inæqualitas, atque illa, quæ est vnius istius, sub vno tamen digito, Etenim vel interruptus est motus, vel continuus.

Rursum autem continuus vel est æqualiter, vel inæqualiter inæqualis. Dicam de omnibus ab interrupto, tanquam faciliiori initium sumens.

D

Interrupti ergo pulsus sub variis digitis, quinque otiri possunt differentiæ, licet quatuor tantum proposuerit Galen: Nobis enim arteriam, quatuor digitis, tangentibus, his quinque subscriptis modis, poterit interrupti motus, quos subiectis numeris explicare. Etenim numerus, digitum significat, qui sentit, locus autem numero vacuus, exprimit digitos, qui motum non sentiunt:

E

1	3	
	2	4
1	3	4
1	2	4
1		4

Ex hac tabula patet, quandoque sentiri motus sub 1. ac 3. digito; quandoque sub secundo & 4. quandoque sub 1. 3. ac 4. nondumquam sub 1. 2. ac 4. quandoque deum sub 1. ac 4.

Quod si sub vno tantum, aut duobus sentiatur, absque hac interruptione, non amplius interruptus, sed brevis nuncupabitur, aut alio modo inæqualis, ut mox aperiam.

Quatenus ergo sub quibusdam digitis, alternatim tamen sentiuntur, necessario vel erit Vehemens, vel languidus, vel magnus, vel parvus, vel celer, vel tardus, vel durus, molli, vel deniq; moderatus. Quo fit, ut pro horum omnium diuersitate, variaz quoq; emergant differentię specifię, in quoeunque ex prædictis generibus quindecim, ut tandem omnes sint numero sexaginta. Proponā, exempli gratia, illas quodecim, quæ ex celeri, tardo, & modo:

& moderato confurgunt: aliarum enim ad vehementiam, magnitudinem, ac durticem ³⁴ A
 ſpectantium, eadem erit ratio. Supponamus ergo motum ſentiri ſub primo ac tertio digi-
 to, non ſub ſecundo & quarto, hz tres confurgunt differentiz.

1	2	3	
Celer,	Abolitus,	Celer,	Abolitus.
Tardus,	Abolitus,	Tardus,	Abolitus.
Moderatus,	Abolitus,	Moderatus,	Abolitus.

Quod ſi ſub primo, ac tertio non ſentitur motus, ſed ſub ſecundo ac quarto, hz tres
 oriuntur.

1	2	3	4	
Abolitus,	Celer,	Abolitus,	Celer.	B
Abolitus,	Tardus,	Abolitus,	Tardus.	
Abolitus,	Moderatus,	Abolitus,	Moderatus.	

At ſi ſentitur motus ſub primo, tertio ac quarto, non ſub ſecundo, hz tres emer-
 gunt.

1	2	3	4	
Celer,	Abolitus,	Celer,	Celer.	
Tardus,	Abolitus,	Tardus,	Tardus.	
Moderatus,	Abolitus,	Moderatus,	Moderatus.	

Eadem erit ratio venandi alias ſex, quz ſuperſunt differentias, quarum tres compa-
 rantur, dum motus ſentitur ſub primo, ſecundo, & quarto digito, non ſub tertio. Aliz de-
 mum tres, dum ſecundus, ac quartus digiti ſentit, non autem ſecundus & tertius. C

Inuentis ergo quindecim differentiis a celeri, tardo, & moderato deſumptis, quz in
 motu ſub variis digitis interrupto contingunt, nemo eſt, qui facillime non poſſit toti-
 dem quoque ſponte ſua inuenire, in magnitudine, paruitate, vehementia, & imbecillita-
 te, durtie, molliſſie, ac moderatis. Idcirco ab hoc inutili labore abſtinebo, & ad inxqua-
 litatem hanc ſub variis digitis non interruptam, inxqualiter tamen factam me conuer-
 tam.

Hzc igitur in quocunque genere tot habet ſpecificas differentias viles, quot diximus
 habere inxqualitatem vnius iſtus ſub vnico digito.

Etenim ſi ſub duobus tantum digitis inxqualitas reperiatur, ſex oriuntur differen-
 tiæ viles, tres vero inutiles: ſi autem tribus digitis inxqualitas ſentiat, erunt 24. differen-
 tiæ viles, tres pariter inutiles. Quod ſi quatuor digitis occurrat inxqualitas, erunt diffe-
 rentiæ 78. viles, tres vero inutiles. D

Hic vero differentiarum numerus perinde reperitur in celeri, tardo, ac moderato,
 atque in aliis omnibus differentiis, quz diſtentioni contingunt. Has potuiſſem gratia
 exempli in celeritate ſaltem explicare, ſed ne tempus, atque operam ludam, ab his deſi-
 ſtam, quia proſus conueniunt cum differentis vnius iſtus, ſub vnoque tantum digito.
 Hoc tãtum monere volo, in hac claſſe Eminulos, ac Prominulos pulſus reponi, quorum
 motus ſub medio digito ſentitur, vel maior eſt, quam ſub illis, qui ſunt virinque.

Tranſeamus ergo ad tertiam inxqualitatis ſpeciem, ſub variis digitis contingẽtem, E
 ſed æqualiter factam. De qua in ſequenti capite,

C A P V T X X I

De continua vniuſ pulſu inxqualitate ſub variis digitis, æqualiter facta.

C Ontinua æqualis inxqualitas ſub variis digitis conſiderata, vel attenditur in celeri-
 tate & tarditate, vel in magnitudine atque paruitate.

Si primo modo, variz oriuntur differentiz, quantum ego cenſeo, potius ratione
 contemplabiles, quam ſenſu perceptibiles, de quibus inferius verba faciemus.

Si vero ſecundo, differentiz emergunt apprimẽ viles, illorum ſcilicet pulſum, quos
 Decurtatos in vnico iſtu appellant: ſunt vero illi, in quibus diſtentionis motus, nobis, ar-
 teriã quatuor digitis tangentibus, paulatim, ſenſim ac proportionaliter languet, quan-
 doque cum defectu, aliquando autem ſine defectu. F

Hæc vero duobus contingunt modis, primo quidem à Gal. libenter accepto, cum
 digiti,

A digiti, ad cubitum vergentes, motum sentiunt clariorem, ad manum vero obfcuriorem: Secundo, cum digiti ad extremam manum situati, motum sentiunt melius, quam qui ad cubitum vergunt, cordique sunt proximiores. Hanc Galen. differentiam, non admodum libenter accepisse videtur; est tamen admittenda, docet enim experientia, tales quandoque reperiri pulsus,

CAPVT XXII.

De inaequalitate in Arteria sede.

VT huic parti, quæ de simplicibus inæqualitatibus pertrahat, finem ac quasi eotondem imponamus, quæ de inæqualitate simplici, propter arteriæ situationem, à Gal. dicta sunt, subiungamus. Itaque Gale. 1. de puls. diff. 24. de hac inæqualitate hæc habet. *Aliud genus est, vno in pulsu inaequalitatis, nec vltum dictorum pulsum amplectitur hoc, quod ab arteria sede proficiscitur, siquidem est, cum pars, vel dextrorsum, vel sinistrorsum deflelitur, alia enim pars sursum, alia deorsum, quod accidit, aut duobus in locis, aut in pluribus. Est autem hoc in specie, finitimum diffinitioni quantitatis, quæ, ut sint distinguenda, in libro de pulsibus dignoscendâ explicatur.*

CAPVT XXIII.

De Pulsu ordinato, atque inordinato.

CVLSTVS non modo æqualitas, atque inæqualitas contingit, sed & ordo atque ordinis carentia. Ordo quidem, tam in æquali quam in inæquali; ordinis carentia, in inæquali tantum.

Ordo in pulsu æquali est rectus ordinatus.

Omnis igitur pulsus equalis est etiam ordinatus, non omnis inæqualis, inordinatus.

Reperitur autem inordinatio hæc in collectiua tantum inæqualitate: quæ enim vnus est ictus, neque ordinem, neque ordinis carentiam continet.

Duplex inordinatio, in collectiua inæqualitate.

Est igitur duplex, vel absoluta, vel secundum quid. Absoluta est, quæ nullius circuitus seruat paritatem: secundum quid vero, quæ alicuius circuitus seruat paritatem, aliorum vero non.

D Quo autem res clarior euadat, illam exemplo illustremus, inæqualemque accipiamus pulsum, ratione magnitudinis. Fingamus autem hunc, post tres pulsationes, vnâ semper intermittere, tres vero illas pulsationes, sibi mutuo semper respondere. Constat pulsum hunc inæqualem esse, sed ordinatum. Quod si tres pulsationes, quæ primis succedunt, nulla ratione prioribus respondeant, & interruptio, quandoque post quatuor, modo post quinque, vel plures, vel pauciores pulsationes fiat, iam cuique constat, hunc pulsum absolute esse inordinatum. Quod si circuitus prioris atque secundi paritatem retineat, illam vero amittat, in quarto aut quinto tantum, tunc erit inordinatus secundum quid, Cuius etiam plures poterunt constitui differentię, prout paritatem amittat, vel in intermissione tantum, vel in distentionibus tantum, vel in pluribus: vel in paucioribus. Ex quo constat (quicquid in oppositum sentiat Galen. libr. de puls. ad Tyron.) inter ordinatum, & inordinatum pulsum medium quoddam reperiri, sicut & inter absolute æqualem, & simpliciter inæqualem.

Inter pulsum ordinatum & inordinatum, datur medium.

CAPVT XXIV.

De Naturalibus pulsuum Rythmis.

DIFFICILITATEM profecto sunt ea, quæ Gal. de pulsum Rythmis, tam ex aliena, quam ex propria conscripsit sententia: quæ tamen nos pro virili facillima æ plana reddere conabimur.

Rythmi significatio. Quod sit Rythmus. Tempus in quatuor reperitur pulsus partibus. Quod Rythmus in pulsu.

Rythmi nomen consonantiam significat, & nihil aliud est, quam duarum eiusdem generis quantitatum, vnus ad alteram, habitudo. Hæc vero quantitas, cuius habitudo petitur in pulsu, nulla alia est, quam tempus. Cum autem tempus in quatuor reperitur pulsus partibus, nempe in duplici motu, ac duplici quiete, hinc fit, ut Rythmus in pulsu sit proportio aut temporis motus diastoles, cum motu systoles, aut temporis quietis externæ cum quiete internæ, aut temporis, motus diastoles, & quietis externæ, ad motum

C tium

Nec contrahitur, nec quietis esse systoles.

tum systoles, & quietis internæ. Et hic quidem triplex proportionis modus apud illos tantum habet locum, qui tactu contractionem, ac quietes sentire posse affirmant: At nos, qui nec contractionem, nec quietes putamus esse sensibiles, proportionem aliter constitimus, videlicet, inter tempus distentionis, & totius intervalli, ita tamen, ut tactus tantum huius non sit iudex, sed magis ratio, ac iudicium, ut mox explicabo.

spatium in seipso quod sit.

Cognita ergo quantitate, cuius queritur proportio, nunc modo vterius querendum, quidnam sit in hac, quod cum alio conferatur. Cum enim in tempore sit spatium, quod est quantitas, & qualitas motus, nempe velocitas, vel tarditas, queritur, an rhythmus oriatur ex collatione quantitatis cum quantitate, id est spatii temporis cum alio, an potius, ex collatione qualitatis cum qualitate.

Quid rhythmus Herophilæ.

Antiquiores, quorum princeps fuit Herophilus, rhythmum accipiebant pro comparatione spatii temporis, cum alio spatio, quibus aliquando adhæsisse videtur Gal. cum tamen postmodum sententiam mutaverit, & hanc rhythmum proportionem inter qualitatem motus distentionis cum qualitate motus contractionis, constituendam esse censuerit. Ergo ad Herophilæ mentem, dum modo contractio fuerit sensibilis, dicemus, rhythmum esse proportionem spatii temporis motus systoles, ad proportionem spatii temporis motus diastoles: vel proportionem temporis motus diastoles, cum sua quiete externa, ad spatium temporis motus contractionis, cum sua quiete interna; vel tertio, proportionem spatii temporis, quietis externæ, cum spatio temporis, quietis internæ. Quorum quidem modorum, duos hosce postremos, etiam si tanquam artificiosissimos commendamus, ideo tamen prætereundos existimo, quod, ut antea dictum est, nec systole, nec quietes sentiri possint, ex consequenti, nec quietis ad quietem, nec motus vnus cum sua quiete ad alium motum & quietem comparatio fieri valeat.

Indicatio.

Sed video aliquem statim dicturum, nec priore modo, hanc inveniri posse proportionem, motus scilicet ad motum. Ratio ex dictis constat: Neque enim comparabimus vnquam motum cum motu, si contractionem ignorari consuecamur. Quibus respondeo, reuera modum hunc easdem habere difficultates, quas & reliqui, si quispiam profiteatur, se contractionis motum sensu percipere, & ex consequenti spatium temporis, in quo sit, consequi posse. Nos autem tantum nobis non tribuimus, imo vero e contractionem nos minime sentire confitemur, idcirco cum dicimus rhythmum fieri debere ex collatione distentionis ad contractionem, mente, ac ratione tantum comparari volumus: considerato videlicet spatio temporis totius intervalli in quod cadit systole, duæ quietes, principium distentionis ignotum, ac quandoque finis, ut suo ostendam loco. Hoc ergo modo in præsentia, rhythmum naturam inquirentes, si ad proportionem, spatii temporis, motus diastoles, cum spatio temporis motus systoles, ut antiquiores sentiebant, confugiamus ad illorum quoque mentem, rhythmos diuidemus in pares & impares. Etenim par erit, cuius spatium temporis motus diastoles sit par spatii temporis motus systoles, idque tripliciter: vel enim ambo tempora erunt longa, vel ambo brevia, vel ambo moderata.

Spatium.

Impar autem erit, cuius spatium vnus temporis sit longius altero, id quo multipliciter contingere potest: Etenim, vel spatium temporis motus diastole erit longius, systole vero breuius, aut moderatum, vel contra spatium temporis in systole erit longius, diastole vero breuius, vel moderatum.

Ex spatio distentionis intervalli, systoles erit longior.
Rhythmus, si ad idem accipiatur de se.

Quæ omnia rursus in alias possent diuidi differentias, quas tamen consulto prætermitto, quod cum libentius Gale. adhæream, quam vnique Medico, dum modo id salua rei veritate fieri possit, idcirco cum videam Galenum, rhythmos potius ex motus qualitate, quam ex temporis spatio esse venarum, accepta hac Galen. sententia, ad illius potius, quam ad antiquorum mentem, differentias quæ adhuc supersunt, recensebimus.

Gale. ergo tametsi primo de puls. diff. circa finem, nonnulla protulerit, quibus videtur huic antiquorum opinioni de Rhythmis adstipulari, dum scribit: *Horum ergo temporum, naturalem cuiusque magnitudinem, atque mutuam proportionem recordari oportet.* Mutauit tamen sententiam, & de puls. dignot. primo, rhythmum voluit esse proportionem qualitatis, id est celeritatis motus diastole, cum qualitate, id est, celeritate motus systole. Hos ergo sic diuidit, quod quidam sint naturales, alii vero præter naturam.

Quid sit rhythmus ex Gal. sententia.
Rhythmus à differentia scilicet Gal.

Quæ omnia rursus in alias possent diuidi differentias, quas tamen consulto prætermitto, quod cum libentius Gale. adhæream, quam vnique Medico, dum modo id salua rei veritate fieri possit, idcirco cum videam Galenum, rhythmos potius ex motus qualitate, quam ex temporis spatio esse venarum, accepta hac Galen. sententia, ad illius potius, quam ad antiquorum mentem, differentias quæ adhuc supersunt, recensebimus.

A Ex naturalibus porro inuenio quosdam esse pares, alios impares.

Pares enim sunt, quorum talis est celeritas in vno, qualis in alio motu; impares, *Pares, impares. Paria rythmorum di-*

quorum varia existit.

Rursum parium quidam sunt moderati in celeritate, quidam vero, aut celeriores, aut tardiores, in quibus est maxima latitudo: Etenim in celerium genere sunt celeres, celeriores, celerissimi: sic & in tardorum genere, tardi, tardiores, tardissimi.

Impares quoque suas habent specificas differentias: quidam enim habent celerem distentionem, contractionem tardam, vel moderatam: Alii vero opposito se habent modo. *In parium rythmorum differentia.*

Rursum quidam sunt incerti, alii vero certi excessus.

Incertain autem excessus, fit tripliciter, aut incerto tantum existente distentionis tempore, aut contractionis tantum, aut vtroque. Et rursum, dum incertum est tempus, vel paululum amplificatur, vel multum, vel plurimum. *Incertain est excessus tripliciter fit. Certus excessus fit de pluribus.*

Certus autem excessus, dupliciter fit, vel multiplici proportionem, vel ut numeri ad numerum. Hæc, quid sibi velint, mox explicabo, cum de his, quæ inutilia existimo, verba fecero: Plurima enim inutilia, ac sensui omnino imperceptibilia esse demonstrabo.

Quæ vero sub sensum cadere possunt, sunt ista: Rythmorum alios esse pares, alios impares. Rursum vero imparium quosdam celeriores habere distentionem, quam sit contractionis: alios contractionem, quam sit distentionis: quod porius in certis, quam certis excessibus. *Qui non rythmi sub sensum cadunt.*

Hos omnes quandoque esse præternaturales, quandoque tamen intra naturæ leges contineri, ætatum exemplo comprobari potest: Etenim in puerili ætate, rythmi sunt pares: cum enim multus sit calor innatus, multoque egeant, ut tanquam pueri alimento, fuliginis copia, caloris abundantiam adæquat, ut par quoque sit distentionis, atque contractionis celeritas. In iuuenibus vero, cum minor sit fuligo, quam calor, oportet distentionem contractionem paulo esse celeriores. Accedente vero ætate consistentiæ, atque senili, contractionis celeritatem magis, ac magis minui, necessum est, quod tunc non admodum sufficiat calor ad fuligines gignendas, quanquam ad pituitosos humores procreandos valde sit aptus. Constat ergo, ætatum exemplo, dari rythmos pares, & impares, naturales tamen: Ad quorum proportionem, rythmi habituum corporis, temperamentorum, ac sexuum inueniri possunt, qui pariter naturales sunt. Sed alii quidam, non naturales reperiuntur, causam scilicet non naturalium, his omnino similes. De quibus omnibus lib. de puls. ad *Puerorum rythmus, est parus, et reliquorum ætatum imparus.*

D Tyron. & 3. de puls. caus. Galenus vbertim verba facit.

Porro ex dictis colligi potest, tam parium, quam imparium rythmorum, alios fore moderatos, alios excedentes, vel in celeritate, vel intarditate. Temperamentorum enim varietas in pueris, faciet rythmos pares modo moderatos, modo immoderatos: Temperie rum pariter varietas, in iuuenibus eisdem faciet impares, similiter vel moderatos, vel immoderatos. *Alii rythmorum de sensu.*

Constat quinetiæ, hos immoderatos fore potius incerti, quam certi excessus, quis enim quæso est, qui se certum excessus gradum consequi, aut diuinare posse profiteatur? Nemo profecto, ut arbitror, erit ergo semper potius incertus, quam certus excessus.

E Colligitur item ex dictis, excessum hunc, siue certum, siue incertum, in sola distentione, senin deprehendi, cum sola quoque sensibilis sit, contractionis vero excessum mente quidem & iudicio concipi, tactu autem minime, ut suo ostendimus loco. De rythmis secundum naturam hætenus, nunc de rythmis præter naturam verba faciunda.

C A P V T X X V .

De pulsibus Arythmis.

A Rythmos pulsus, ut docebat Gal. 1. de puls. diff. 8. non ille est, qui omnem perdit rythmum, sed qui narium rythmum obtinet vitiosum.

Hic autem est triplex: quidam enim dicitur Pararythmos, quidam Heterorythmos, quidam denique Ecrythmos.

F Pararythmos dicitur pulsus, qui enim amittat propriæ ætatis pulsus, in alium mutatur, non admodum diuersum, vicinæ scilicet ætatis.

Heterorythmos autem dicitur qui enim propriæ ætatis rythmum amittat, non sufficit illi, qui sit proximæ sed valde contrariæ, ut si pueri pulsus rythmum suscepit senile.

C 2 Quod

Qui pulsus Arythmus, Pulsus arythmus triplex. Pararythmos. Heterorythmos.

Erythmos.

Quod si denique nullus sit in pulsu ætatis rythmus, tunc Erythmos nuncupatur. **A**

Hinc colligi potest, in vitiosis hisce rythmis aut contractionem, aut distentionem, aut utrumque motum recedere, à suo naturali rythmo.

Quomodo
prædicti a-
rhythmi, à
naturalis re-
cedant.

Recedunt autem multipliciter, vel enim diastole fiet celerior, systole vero, aut pariter celerior, aut tardior, aut moderata; vel fiet diastole tardior, systole vero; aut pariter tardior, aut celerior, aut moderata, vel diastole erit moderata, systole vero celerior, aut tardior, vel ambe erunt moderatæ in celeritate, & tamē vitiosus erit tythmus, habita ætatum, sexuum, temperamenorum, aeris, aliorumque id genus, ratione: Cum enim omnia hæc non minus, quam ætas (quæ pro exemplo à nobis accepta est) proprium habeant naturalem rythmum: habent consequenter & vitiosum. Nihil enim est usque adeo consonum, quod aliquando dissonum fieri non possit. Et hæc de rythmis, & arhythmis dicta sufficiant. Quæ enim à Galeno primo de pulsuum differentiis vltimo, de alia quadam rythmorum inæqualitate proponuntur, tanquam minus vitiosa inferius examinabuntur. Nunc autem de compositis pulsuum differentiis erit differendum.

CAPVT XXVI.

De compositis pulsibus inæqualibus, in genere.

Inæquales
pulsus com-
positi.

Inæquales pulsus compositi, à Galen. lib. de puls. ad Tyron. huiusmodi enumerantur, Vndulosus, Vermiculatus, Formicans, Hecticus, primo autem de puls. diff. recensentur præter hos Convulsivus, Vibratus, Caprizans, lib. de puls. ad Tyron. x. & xi. mentionem quoque facit Serratus, vel Serrini pulsus, quem nemo non novit, omnium maxime inæqualem, & compositum esse. Sed & Tremulum, & palpitantem, & strepenrem, omnes iure optimo inter inæquales compositos reponunt, etiam si Gal. palpitantis mentionem non fecerit. Quæ ergo est huius diversitatis ratio? cur Galen. lib. de pulsibus ad Tyron. quosdam proposuit, omisit alios, & s. de puls. diff. omnes non recenset? Quod spectat ad lib. de pulsibus ad Tyron. video, Galen eo loci, illos tantum inæquales compositos proponentem, qui ex quibusdam simplicibus inæqualitatibus constantur, quæ diuisa, & per se stare, minime possunt. s. autem de puls. diff. omnium compositarum inæqualitatum meminit, quæ sunt pulsficæ facultatis opera, non aliquando solius morbi, ut est pulsus palpirans, aut facultatis, & morbi, ut tremulus. Strepens autem pulsus, ut sonum quandam significat, neque inter pulsus est reponendus. **D**

Id quod ob-
stat utrum
positi pulsus.

Sed quicquid sit hæc de re, certum est, hos omnes esse compositos inæquales, hoc tamen d. scrimine, ut res priores, Vndulosus, Vermiculatus, & Formicans, ex inæqualibus componentur differentiis per se nunquam subsistentibus: Convulsivus autem, Vibratus Caprizans, atque Serratus, ex simplicibus, quæ etiam per se inveniuntur.

Hecticus
pulsus.

De Hectico vero, quid sentiendum sit, suo exponam loco: Nunc vero ad singulos inæquales compositos accedamus, & quæ illorum sit compositio, explicemus.

CAPVT XXVII.

De inæqualibus compositis in specie.

Caprizans
pulsus.

Inter compositos pulsus inæquales ante omnes sese offert Caprizans, qui ex duplici constat inæqualitate, interrupta vna, altera dispari. Est interrupta, quia diastole media quiete interruptitur: est dispar, quia finis motus diastole, dum reuertitur, est celerior ac validior principio.

Serratus
pulsus.

Serratus autem, triplicem habet inæqualitatem, interruptam vnam, disparem vero duas: Interrupta est, quia quatuor tangentes digitis, alternatim fitiæ. Dispare sunt duæ, vna duritiei ac mollitiæ, altera autem situs arteriæ: Duritiei quidem, ac mollitiæ, sub illis enim digitis, qui istum percipiunt, pulsus durior, sub aliis arteria mollior apparet: Serratus vero, quia cum tensa sit arteria, non tamen tensa est æqualiter, sed valde inæqualiter, ut pars sursum, alia vero deorsum tendat. Est ergo serratus ex triplici inæqualitate simpliciter conflatus, cuius quidem pulsus meminit Gal. lib. de puls. ad Tyron. xi.

Vibratus
Convulsivus.

Vibratus autem atque Convulsivus, ex duplici constantur inæqualitate, vna quidem in arteriæ sede, altera vero in distentionis arteriæ quantitate: In arteriæ sede quidem, nam in Convulsivo ad utrumque extremum latus, humilior est arteria, quam in medio.

A dīo, at si humilior, etiam minus distenta quam in medio; adeſt ergo inæqualitas in arterię ſede, & in diſtentionis quantitate, in pulſu conuulſiuo.

Multo autem euidentior vtraque in pulſu Vibrato apparet: cum enim iaculi emiſſionem imitetur hic pulſus, certum eſt, in vna parte altioreſſe arteriam, ac magis eleuari, in alia vero humilioreſſe ac minus extēdi. Hæc ſenſus ergo Caprizantis, ſerrini, Conuulſiuī, atque Vibrati pulſus compoſitæ patent differentię.

CAPVT XXVIII.

De pulſu Vndoso, Vermiculoso, atque Formicante.

Galenus lib. de pulſ. ad Tyron. in ſtituta compoſitorum pulſuum inæqualium ſpeculatione, Vndolum, Vermiculolum, Formicantem, atq; Hæclicum connumerat. Quid de Hæclico ſentiendum, mox aperiam. Nunc autem quod ad tres priores ſpectat, Vndolum dico, ac Vermiculolum, ex duplici conſideratione inæqualitate, vna quidem ex eo, quod maturus aut ſerius, arterię partes motum auſpicentur; alia vero ratione quantitatis diſtentionis. Rem declaro.

Omnes hi pulſus, ſicut & antea deſcripti, inæquales ſunt in vnico iſtu, atque ſub variis digitis. Itaque cum omnibus tangentibus digitis arterię pars, quæ ſub primo eſt digito, prius dilatatur, quam pars, quæ ſub ſecundo; & ſic, quæ ſub ſecundo prius, quam quæ ſub tertio, nemo non intelligit, inæqualitatem eſſe in tempore motus partium arterię. Sed præterea, cum motus, qui ſub primo digito apparuerat, tranſit ad ſecundum, & qui ſub ſecundo; tranſit ad tertium & quartum, non ita permeat, vt ſub prioribus digitis nullus ſit motus. Adeſt ergo etiam ſub illis, ſed priore infirmior, ac multo minor. Duplex itaq; erit inæqualitas, vna ratione temporis motus, qui primo ſit in vna, quam in altera arterię parte, altera ratione quantitatis diſtentionis, quia tranſacto motu, à prima arterię parte ad ſecundam, minus dilatatur prior illa, quam ſecunda. Hoc itaque in Vndoso ac Vermiculoso contingit, hoc tamen discrimine, quod Vndosus ſit magnus, Vermiculofus autem parvus.

Ex his, ni fallor, conſtat, cur pulſus iſti hæc fuerint nomina ſortiri, vterque enim à ſi-

militudine motus vndarum ac vermium, ſic nuncupatus eſt.

Sed & me tacente, conſtat, hæc duas inæqualitatis ſpecies, per ſe nunquam ſtare poſſe, imo vero, ſemper neceſſario ſecundam, cū priore copulari. Etenim Vndosum, Vermiculolumque non dicas pulſum, niſi plures ſint arterię partes motæ; At ſi plures mouentur, ſed vna poſt aliam, & inæqualiter, conſtat ergo vnam abſque alia, eſſe non poſſe. Itaq; ad formicantem accedamus, quem Gal. verba apertiffime declarant, ex hac eadem duplici propoſita inæqualitate conſtare, cum dicat, illum à Vermiculoso ſola quantitate diſtare, itaque ſicut Vermiculofus ab Vndoso inæqualitatis ſpecie non diſfert, ſed magnitudine tantum, ac paritate; ita & Formicans, qui nil aliud eſt, quam ſumme parvus, ex eadem inæqualitatis ſpecie concinnabitur, ſed ſere inſenſibili: ſi enim vix à Vermiculoso ſenſibilis eſt hæc inæqualitas, qui tamē formicante paulo maior exiſtit, certe in Formicante vix, ac ne vix quidem ſentiri poterit, qui Vermiculoso minor eſt. Sed iam quid de Hæclico ſentiendum ſit, paucis declarabo.

CAPVT XXIX.

De pulſu Hæclico.

Etiam ſi inter compoſitos inæquales, Gal. Hæclicum quoque recensuerit, lib. de pulſ. ad Tyron. nihilominus non magis inter inæquales, quam inter æquales eſt referendus. Idcirco hunc omiſit Gal. de pulſ. diſt. Hæclicus enim pulſus non eſt propria aliqua differentia, vel ſimplex, vel compoſita, ſed eſt conditio vel affectio quædam illorum pulſuum, qui ſemper eodem modo ſe habent, vel æqualitate, vel in inæqualitate.

Pulſus ergo æqualis vel inæqualis, ſimplex vel compoſitus, ſemper eodem modo ſe habens, conſtanſq; ac perpetuo ſibi ſimilis, hæclicus vocatur, non quidem, quod hæclicæ ætatis febre laborantibus accidat, ſed quod in quacunq; tandem affectione contingat, quæ ſibi perpetuo ſimilis, conſtanſq; & ſtibilis permaneat. Siue igitur ſit diſpar, ſiue ſit intetrus, aut dirotus, aut intecurrens, dum modo idem ſemper ſit, hæclicus vocabitur.

INter pulsus compositos est quoque strepens, cuius meminit Galen. *lib. de pulsib. ad Tyren. cap. xi.* ubi de conuulsorum pulsibus loquitur. Videtur sane hic pulsus omnium minime ad motum pertinere, cum strepitus, à quo strepens deducitur, soni, non autem motus sit species. Ideirco cum aurium magis, quam tactus obiectum sit constituendus, non possum non mirari Iosephum Struthium, qui strepitum sub digitis, in strepente sentiri ait. Et profecto, nec imaginatione quidem consequi possum, quomodo sonus (ut sonus) à digitis sentiatur. Concedo quidem istum validum tactum sentiri, ad quem deinde sonus sequitur, tanquam obiectum auditus, sed quod sonus tactu percipiatur, nec ratio docet, nec Galen. ut puto somniauit, qui dum huiusce pulsus pauis admodum verbis & quasi obiter meminit, hoc tantum cogitauit, quod sicuti nunquam deest strepitus in motu vehemente, nec motus sit vehemens absque facultate valida instrumentoque duro, ita in pulsibus quandoque strepitum fieri posse, dum adsit hæc causarum syndrome, nempe vehementia, durities, visusque, actus. Vtrum autem reuera detur hic pulsus, vel ne, ego plane dubito, qui ut ingenue dicam, talem me nunquam sensisse profiteor. Sed neque illum dari posse, nunc lucidarius ostendam cum de huius causis incidet sermo: nunc autem his paucis sumus contenti.

CAPVT XXXI.

De ignotis pulsuum differentiis.

EXpeditis pulsuum differentiis, à diastole desumptis, locus hic postulat, ut de differentiis à systole de promptis, verba ficerent.

Sed quia systole vel imperceptibilis est, vel egre admodum perceptibilis, propterea ab hoc labore prorsus abstinendum, & eo magis, quod si quisquam curiosus, hanc doctrinam sensui minime perceptibilem, sed mente tantum contemplabilem persequi velit memoria repetat, singulas pulsuum differentiis in diastole inuentas, sciatque illas ipsas in motu systoles euenire posse. Cum, in systole fiat ab eadem facultate, in eadem arte, propter vsum non minus necessarium, quam diastole, ideirco habebit differentias ab istis, à contractionis quantitate, à motus qualitate, à distentionis tempore, ab arteriæ statu desumptas, sicuti & diastole. His ergo prætermisissis, ad alia sermonem nostrum conuertamus.

CAPVT XXXII.

De Logicis pulsuum differentiis, quæ ex vfu Artis non sunt.

Possent Tyrones ut fallor, totam hanc partem, de pulsuum differentiis, ratione potius, quam contemplabilibus, quam sensu perceptibilibus, præmittere atque eam illis relinquere, qui Medico indignum existimant, quidpiam omisisse, aut neglexisse, quod aliquando à Galen. propositum fuerit. Nos ne crimen hoc incurramus, in his quidem pulsuum differentiis versabimur, quæ sane ad artem nil conferunt; non tamen quod sensu ipso hæc cognouisse profiteamur, sed ut Gal. mentem, alioquin obsecris verbis inuoluam, quoad fieri poterit, plenius aperiamus. Inuenio ergo Gal. in tripli inæqualitatis genere, quasdam posuisse differentias, apud me logicas, & minime ex vfu Artis: nempe in pulsu inæquali vnius ictus, ac sub vnico digito: in eadem inæqualitate vnius ictus, sed sub pluribus digitis; & tertio in rythmorum inæqualitate. Quid in singulis hisce inæqualitatibus posuerit, quod prætermitti possit, nunc explanemus. Primum quidem, quod spectat ad vnius ictus inæqualitatem, sub vnico digito, ipse pro certo affirmat, diastolen non modo duas, sed & tres, & quatuor habere sensibiles mutationes, ut propterea sicuti ipsa in duo tantum tempora diuisa, nouem oriebantur inæquales pulsus, inæqualiter differentes; ita eadem in tres secta partes, oriantur 27. in quatuor veto, 81. sunt vero priores

*Logici pul-
suum differ-
entias tripli-
gi inæquali-
tatis genera
constituerit,
Distentionem
secundum
Gal. arteri-
æ quantita-
tem, & altera sen-
sibiles muta-
tiones.*

27. illæ.

Celer.

A	Celer,	Celer,	Tardus.
	Celer,	Celer,	Celer.
	Celer,	Celer,	Moderatus.
	Celer,	Tardus,	Tardus.
	Celer,	Tardus,	Celer.
	Celer,	Tardus,	Moderatus.
	Celer,	Moderatus,	Tardus,
	Celer,	Moderatus.	Celer.
	Celer,	Moderatus.	Moderatus.
	Tardus,	Celer,	Tardus.
B	Tardus,	Celer,	Celer.
	Tardus,	Celer,	Moderatus.
	Tardus,	Tardus,	Tardus.
	Tardus,	Tardus,	Celer.
	Tardus,	Tardus,	Moderatus.
	Tardus,	Moderatus,	Tardus.
	Tardus,	Moderatus.	Celer.
	Tardus,	Moderatus.	Moderatus.
	Moderatus,	Celer,	Tardus.
	Moderatus,	Celer,	Celer.
C	Moderatus,	Celer,	Moderatus.
	Moderatus,	Tardus,	Moderatus.
	Moderatus,	Tardus,	Celer.
	Moderatus,	Tardus,	Tardus.
	Moderatus,	Moderatus,	Tardus.
	Moderatus,	Moderatus,	Celer.
	Moderatus,	Moderatus,	Moderatus.
	Moderatus,	Moderatus,	Moderatus.

Alias, qui ex diuisione diastoles, in quatuor tempora, ad numerum 81. ascendunt, consulto prætermittimus. Hæc Gal. i. de puls. diff. 15. Quæ, ni fallor, præteriri poterant, oppugnabo autem diuisionem tantum in tria tempora factam; ex hac enim prudens lector,

D sponere sua refutationem distinctionis in quatuor tempora facillime colliger,

Primum itaque facta diastoles diuisione in tria tempora, falsum est 27. oriri inæqualium differentias: cum tres existis sint omnino æquales, nempe

Celer,	Celer,	Celer.
Tardus,	Tardus,	Tardus.
Moderatus,	Moderatus,	Moderatus.

*Respondeo
Alii den-
tationes, super
ius falsas.*

Præterea, v. ex aliis 24. quæ relinquuntur, duodecim manifestissime cum reliquis prioribus coincidunt inæqualibus, quæ ex diastole in duas tantum partes, duosque tempora diuisa, consurgunt; illæ scilicet, quatuor duo priora, aut postrema tempora in celeritate aut tarditate, aut moderatione, sunt æqualia, nam exempli causa, pulsus

Celer,	Celer,	Tardus.
Tardus,	Tardus,	Celer.
Moderatus,	Moderatus,	Celer.

Et sic, alii similes, cum illis tandem coincidunt, qui duas tantum habent mutationes. Duo etenim æquales, atque omnino similes motus, successiue facti pro vnicò haberi debent.

Cur ergo Gal. hos, tanquam à prioribus diuersos recensuit? Adde mutationem hæc triplicem, multo autem minus quadruplicem esse sensibilem. Qui enim, quæso, fieri potest, vt diastole, cuius principium ac finis, magna ex parte sunt ignota, possit in tres vel quatuor sensibiles diuidi partes? Præterea cum istarum partium necessariò quædam debeant esse celeres, (alioquin inæqualitas non adesset) qui etiã fieri potest, vt tantopere protrahatur diastole, vt in quatuor tempora diuidi possit? quæ enim celeres habet partes, non videtur tantopere protrahi, vt ternas, quaternasue habeat mutationes. Sed

demus, tres quandoque fieri, exunt sane 12. differentiz, non autem 17. & ex his 12. duæ tantum sensû comprehenduntur, scilicet

Celer,	Tradus,	Celer.
Tardus,	Celer.	Tardus.

Reliquæ vero non item, quandoquidem in tam angusto temporis intervallo, nisi mutatio sit ab extremo ad extremum, nõ facile perspicitur. Est autem mutatio ab extremo ad extremum, in his tantum duabus propositis. Itaque mihi prætermittenda videbatur hæc speculatio; & eo potissimum, quia nihil plus significant pulsus isti, in tria vel quatuor diuisa tempora, quam interrupti in medio ictu, à quibus profecto non differunt, nisi secundum magis & minus.

CAPVT XXXIII.

De inutilibus differentiis, ex parte inæqualitatis vnius ictus, in vnicâ arte.

IN hac vnius ictus inæqualitate, quæ sub variis digitis attenditur, visus est mihi Gal. non minus in utiliter differentiarum numerum ad 81. perduxisse, quam in priori fecerit. Primum enim, si in solâ ictus qualitate, celeritate scilicet, 81. differentiz inveniuntur, totidem profecto erunt in distinctionis quantitate, in ictu, atque arteriæ statu, id est, in magnitudine, vehementia ac duritie cum suis oppositis, ac mediis. Itaque infinitus pene differentiarum numerus emerget, qui profecto non in iunioribus duntaxat, sed & perfectioribus, nauicam sit pariturus. Sed præterea cum inquit Gal. ex diuersitate motus duplici tantum, quæ in vna diastole sub variis appareat digitis, sex oritur inæqualium pulsuum differentias antea propositas, ex diuersitate autem motus triplici, ratione eorundem digitorum 27. emergere, denique ex quadruplici, vnam supra octoginta resultare; patitur discursus iste eadem obiectiones, quas & prior inæqualitas vnius ictus, & sub vnicò digito,

Nam siue 27. constituantur, siue 81. tres omnino æquales sunt excludendæ, deinde vero 12. ex 27. coincidunt cum sex prioribus, & ex 12. quæ relinquuntur, duæ tantum extremæ sunt sensibiles, vt antea ostendimus.

Accedit, quod istæ, secundum magis ac minus tantum distant ab interrupta inæqualitate, quæ sit sub variis digitis. Denique vt omnia ingenue proferam, videtur mihi, quod si villa sit sensibilis inæqualitas sub variis digitis, ea potius sit in duritie ac mollitie, quam in alia quacunque differentia: vt propterea quantum ego censeo, satius multo fuisset, hanc per inæqualem arteriæ duritiem & molliem explicare, quam per celeritatem aut tarditatem, quæ longe minus sensibilis est duritie ac mollitie. Prætermittantur ergo hæc omnes ab iis, qui magis vtilitati quam ostentationi student; & quid de rythmis sentiendum sit, videamus.

CAPVT XXXIV.

De pulsibus inutilibus ex parte rythmorum.

HActenus cum Gal. exposuimus, quid sit in pulsibus rythmos, quotque illius sint differentiz, à sensato Medico contemplabiles; quid præterea sit pulsus Arythmus, & quæ illius differentiz ad attem spectantes. Nunc vero, quæ de rythmis obscure ad modum Galen. scripserit, atque de eorum inæqualitate, tametsi vsique adeo necçssaria non sint, libenter in eruditorum gratiam subiungemus.

De pulsibus ergo, qui rythmum continent, verba faciens Gal. inquit. Horum quoddam pari proportionem, alios vero impari constare. Rursum vero impares, vel certos habere excessus vel incertos; quod si incertos habeant, inquit, hoc tripliciter contingere, vel incerto existente distinctionis tempore vel contractionis, vel vtriusque. Addit denique incertum huius excessum, vel paululum habere amplificata tempora, vel plus, vel plurimum. Quæ omnia consequi, & experimento comprobare, est quidem difficile, difficilius autem est intelligere, quæ ab eo de certis scribuntur excessibus: Inquit enim 1. de puls. diff. 2. pulsus, qui certum habent excessum, in duas subdiuidi classes, quarum prima illos continet, qui multiplicis sint proportionis; altera eos, qui excedūt, vt numeri ad numerum, sic enim scribit; *Item vero inter omnes rythmos, hi pari proportionem, illi impari constans: pari, ubi disten-*

Pulsus rythmici, qui certum habent excessum, in duas subdiuidi classes, quarum prima illos continet, qui multiplicis sunt proportionis; altera eos, qui excedūt, vt numeri ad numerum, sic enim scribit;

Ationis temporis aequae contractionis tempora: impari, si alterniter eorum excedat. Id, quod modo censeo, modo incerti fit excessibus: Certis bisariam: aut multiplici proportionem, aut numeri ad numerum, qui in triplicibus, quasi superpartialis appellatur, proportio quidem multiplex est, dupla vel tripla, vel quadrupla, vel aliqua infrequentium: Vt numeri ad numerum, cum quanta sunt duo distentionis tempora, tanta sint contractionis tempora 5. vel 7. vel 9. Hæc res cum valde sit difficilis, & ad Arithmeticos, & Musicos spectat, ab illorum principiis, erit petenda. Numeri proportio apud Arithmeticos, & Soni, apud Musicos, nil aliud est, quam duarum quantitatium eiusdem generis, dissimilium: amen, habitudinis, vel ratio: Hæc vero vel simplex est, vel composita: simplex est triplex, prima multiplex vocatur, secunda, Superpartialis: tertia, Superpartiens.

Quid pri-
or, Nū-
meri. O. Sō-
ni.

Quamplur-
bas sit pro-
p. rra.

Multiplex
pro. rra.

Superparti-
alis proportio

B duplex est proportio, id est, duorum, ad quatuor: vel est triplex, id est duorum ad sex, & sic de singulis.

Superpartialis vocata proportio fit, cum maior numerus continet minorem, & alterum numerum unum, supra alteram eius partem, ut sesquialtera, vel sesquitercia. Talis ergo est proportio trium, ad duo, sicut, & quatuor, ad tria, nam tria continent duo, & unum plus, sic & quatuor continent tria, & unum plus.

Superpartiens denique proportio fit, cum maior numerus, continet minorem, & præterea superexcedit illam, aut duplici numero, & dicitur Superbipartiens, sicut est proportio quinquæ ad tria, nam quinque in se ternarium continent, & duo plus. Aut superat triplici numero, & tunc dicitur Supratripartiens, ut est proportio septenariæ, ad quaternariam: sic de aliis. Hactenus de simplici proportionem.

Superparti-
alis pro. rra.

Superbipar-
tiens

Supratripar-
tiens

Composita vero aut fit ex prima cum tertia, aut ex prima cum secunda. Si componatur prima cum secunda, id est, multiplex, cum superpartiali, tunc maior numerus minorem continet bis, vel ter, & adhuc alteram partem.

Quod si componatur prima cum tertia, tunc proportio totum continet numerum bis, vel ter, & præterea duas, aut tres partes.

Hic sic explicatis, constat Gal. voluisse, eundem esse in celeritate pulsus eorum excessum, qui etiam est in sonis & numeris: Vult enim aliquando diastolen aut systolen ita celerissime moueri, ut hic motus sit duplo aut triplo celerior altero, propterea videatur excessus multiplex vnius proportionis: quandoque vero vult, unum ex his motibus alterum

Dexcedere, ut sit non modo duplo, aut triplo celerior, sed & alteram celeritatis partem plus contineat, diciturque excessus proportionis, in secunda specie, nempe Superpartialis: vel denique vult ita excedere, ut sit non modo duplo, aut triplo maior, vel celerior, sed duas quoque aut tres partes contineat plus, & dicitur excessus in pulsu Superbipartiens, aut Supratripartiens.

Hæc voluisse Galen. eius verba docent, quæ sic habent: *proportio quidem multiplex, est dupla vel tripla, vel quadrupla, vel aliqua infrequentium, ut numeri ad numerum, cum quanta sint distentionis tempora, tanta etiam sint contractionis 5. vel 7. vel 9. vel 11.* Si quis ergo certos hos excedendi modos se consequi possit dicat, eisdem studiosis proponat, ego enim illos cum Aulic. tanquam inuiles prætermittendos censeo.

E

C A P V T X X X V.

De crebritate, ac raritate, & rythmi in vni ictu, inæqualitate.

VT, quæ à Galen. de crebritatis inæqualitate, & rythmi, in vni ictu, conferuntur *s. de pulsib. diff. ultimo, cuius plana, & perspicua reddantur, cum apprime difficilia sint, decruimus, non verbis tantum, quantum & lincis quibusdam, huius rei aperire obscuritatem, ut sicuti demonstrationes mathematicæ, lincis redduntur faciliores, ita & hoc Gal. inuentus, tenebris innotuere, & difficultate implicatum, lincis manifestus reddatur.*

Ante omnia vero, monendum est lector, quod quāquam crebritatis, ac rythmi inæqualitas, de qua ibi loquitur Galen. in vni sit distentione, attamen deprehendi non potest, quin duplex saltem sentiat distentio. Ad faciliorem itaque captum duc nobis depingenda erunt diastoles, quarum prima, erit signata littera D. P. secunda veto, litteris D. S. quasi dicat, prima diastoles, secunda diastoles. Rursum vero cum hæc inæqualitas deprehendi

non

non possit, quin quatuor aut tribus saltem digitis tangatur arteria; ut propterea trium, vel A quatuor arterie partium motus dignoscatur, utramque diastolen quatuor lineis depingendam curauimus, quæ quatuor tangentibus digitis respondeant.

*Prædictum
rhythmi, &
crebritatis
inæqualita-
tem mon-
strat.
Figuram
explicat.*

Hæ vero quatuor lineæ, inueniuntur octo diuersis modis depictæ, prout octo sunt præcipuæ inæqualitates rythmi ac crebritatis in vno ictu.

Vt vero facilius quid sibi velint, consequatur lector, moneo, quod vbi viderit figuram, in qua lineæ longæ sint clausæ, ab vnica linea pertransuersum ducta, in quam omnes æqualiter desinant, illam figuram ostendere æqualitatem; vbi vero deficiat transuersa linea, figuram illam demonstrare inæqualitatem: Et si quidem in vnica parte ducta sit linea transuersa, in eadem tantum erit æqualitas; si in vtraque sit ducta, in vtraque etiam aderit æqualitas. Quatuor itaque primo delineabimus, atque explicabimus, mox ad alias transi- B bimus. Sunt autem priores quatuor istæ.

FIGVRA PRIMA.

D. P.

D. S.

A



Q

A.

C

FIGVRA SECVNDÆ.

D. P.

D. S.

B.



Q

B.

D

FIGVRA TERTIA.

D. P.

D. S.

C.



Q

C.

E

FIGVRA QVARTA.

D. P.

D. S.

D.



Q

D.

F

Quatuor isti modi, depingunt quatuor diuersas inæqualitates: & primus quidem, qui ambas habet diffentiones litera A, signatas, aperte docet priorem diffentionem, tam in prin-

A In principio, quam in fine, æqualem esse: Secundam vero, inæquale distentionis principium habere, finem vero æqualem. Iam enim diximus, perpetuam fore harum figurarum regulam, ut cuius quatuor illæ oblongæ lineæ, in vnam transuerfam æqualiter desinant, siue sit ea pars vnica, siue duplex, æquale esse distentionis principium, vel finem, vel vtrumque. cuius vero sint inæquales, inæquale quoque esse principium, aut finem, aut vtrumque.

Cum ergo prima diastoles primæ figuræ habeat lineas, tam in principio, quam in fine æquales, significat diastolen omnino æqualem: Secundam vero, quæ habet lineas, in principio inæquales, in fine æquales, denotat principium inæquale; cuius scilicet motus, prius sub vno, quam sub aliis digitis; proinde primo in vna, mox in alia arteriæ parte incipiat: finem vero æqualem, quod sub omnibus digitis arteria eodem moueatur tempore. His de prima figura sic explicatis, nemini iam erit arduum intelligere, quid sibi velint aliæ tres sequentes iam signatæ, imo vero & aliæ, quas mox depingemus, omnium enim vna & eadem est regula, & vsque adeo facilis, ut pudeat iam illam repetere. Ego interim illud tantum moneo inter duas illas figuras, quæ duas signent distentiones, reperiri litteram Q, quæ nil aliud indicat, quam quietem. Hi ergo sunt quatuor modi inæqualitatis præcipui, in quibus prior distensio semper habet æquale principium, reliquæ vero partes tum primæ, tum secundæ distentionis, ut plurimum variant. Quibus, nisi fallor, alios quoque subnectere possemus, ab his tamen libenter abstinemus, ne confusionem potius, quam doctrinam pariamus.

C Iam venio ad alios inæqualitatis modos, in quibus prior diastole semper habet principium inæquale, reliquas autem motus partes, tam prioris, quam posterioris distentionis vario modo constitutas, ut ex sequentibus figuris constat.

Secundæ modi FIGURA PRIMA.

D. P.

D. S.

D

A.

Q.

A.

FIGURA SECUNDA.

D. P.

D. S.

E

B.

Q.

B.

FIGURA TERTIA.

D. P.

D. S.

F

C.

Q.

C.


Figuræ

FIGURA. QVARTA.

D. P.

D. S.

D.




D.

Et hæc tandem sunt inæqualitates, quæ ex Galeno *r. de puls. diff. ult.* colliguntur, quas nunc sigillatim exponemus. Ex propositis itaque figuris octo, hæc quæ primum occupat locum, sic expressa:

D. P.

D. S.

A.



A.


C

Rythmi atque crebritatis in vno ictu, inæqualitatem demonstrat. Etenim prior dia-
stole, est vndique æqualis, secunda est inæqualis, quia diuerso in eam pit moveri tempore, in
variis sui partibus, eodem tamen absoluuntur omnes. Patet itaque interuallum, quod est
inter finem prioris distentionis, & principium secundæ, non esse secundum omnes lineas
æquale, sed inæquale: Hoc autem facit crebritatis inæqualitatem, quia vnus linearum inter-
uallum breuius crebritatem facit, interuallum alterius linea longius, raritatem: hæc in v-
no tantum ictu contingunt, ergo ex hac prima delineatione, inæqualitas crebritatis ap-
paret in vno ictu, A dicit quoque rythmi inæqualitas, cum enim æqualia sint prioris dis-
tentionis tempora, Secundæ veto inæqualia, prout ostendunt lineæ, quarum quedam sunt
longiores, quedam breuiores, necessum est quoque quietes esse inæquales, quasdam bre-
uiiores, quasdam longiores, at siue breuior sit quies motu, siue longior, rythmum concipit
inæqualem, ergo aderit rythmi inæqualitas in vno ictu. Hactenus de prima figura,
venio ad secundam, quæ sic delineatur.

D. P.

D. S.

B.




B.


E

In hac secunda delineatione, sensu apparet, quietem, quæ intercedit inter primam
ac secundam distentionem, esse inæqualem, quia pro vna parte longior, pro altera bre-
uior: Constat quinetiam, lineatum alias breuiiores, alias longiores esse, itaque & motus
esse inæquales, alios longiores, breuiiores alios. Adicit ergo in hac quoque figura v-
traque inæqualitas, tam rythmi, quam crebritatis. Veniamus nunc ad tertiam figu-
ram.


D. P.



Hæc delineatio statim ostendit quietum esse paria tempora inter se collata, tempora vero motus, ad quies inæqualia. Nam ramet si finis primæ distentionis, inæquali fiat tempore, attamen principium secundæ, in omnibus respondet fini prioris, ut quies seu interuallum, sit æquale, sed tempus motus, respectu quietis, erit inæquale, ut lineæ ostendunt, ita ut ad sit inæqualitas rythmi, non crebritatis, Transito ad quartam.




Ex hæc delineatione patet, finem prioris, ac principium secundæ, esse inæquale, sed alio modo, quam fuit præcedens: In præcedenti enim prima motus pars secundæ distentionis respondebat illi arteriæ parti, quæ in priori distentione primo aboluerat motum, & secunda secundæ, & sic alia; In hac vero non respondent, sed principium secundæ distentionis, quod primo moueri debuisset, ultimo incipit motum, & quæ ultimo debuisset moueri, prior est ad motum: Hinc fit crebritatis inæqualitas, quia diuersa sunt interualla, & rythmi, quia tempora motus sunt improporcionata temporibus quietis. Er hi sunt inæqualitatis modi, qui priori distentione, eodem tempore incipientes, fieri possunt. Alios iam subiungam, ex prima distentione emergentes, cuius principium sit inæquale: inspecto ramen & illius fine, & secundæ quoque distentionis motu. Erit autem hæc prior secundi modi figura.




Prior hæc figura statim demonstrat, nullam esse crebritatis inæqualitatem, quies enim secundum omnes lineas est æqualis, ideo tantum rythmi inæqualitas adest, quia motus sunt quieti valde impares. Secunda figura hæc est.

D D. P.



Secunda hæc figura illi respondet, quæ antea fuit proposita, in qua utraq; adeft inæqualitas, ob causas prædictas.



Ex huius figure delineatione constat, quietes esse æquales, ideo crebritatis inæqualitates non adeffe: motus autem tempora & secundum se, & ad quietem collata esse valde inæqualia, ideo diuersum esse rythmum, id quod & in quarta contingit figura, idcirco non iterum delineanda venit. Hæc sunt, quæ Galenus *loc citato* protulit, quibus non modo Tyronum mentes, sed & eruditissimorum virorum ingenia, absque vilo artis emolumento torfit: Sunt enim omnia imaginaria, ac tactu imperceptibilia, quæ vt Galenus astrueret, à seipso recedere coactus est, dum aliquando docet, rythmos non à temporum quantitate, sed à motus qualitate petendos esse; hoc autem in loco motus qualitate relictâ, ad spatia se contulit. Et hæcenus de pulsuum differentiis. Nunc vero

ad dignotionem calamm conuertamus.

De pulsibus Libri Primi finis.

D E



DE PULSIBVS LIBER SECVNDVS.

AVTHORE
HERCVLE SAXONIA
PATAVINO.

CAPVT I.

De necessitate & difficultate dignotionis pulsuum.



Vlsuum partibus ac differentiis expositis, succedit sermo de dignotione; & merito quidem, nullius enim frugi, ad futurorum praesagium praeterita suisset speculatio, nisi & dignotio accederet. Plurimum difficultatis haec pars obrinet, tum quia ex quatuor pulsus partibus, vnica tantum sensibilis esse videtur, Diastole scilicet; aliae vero tres omnino ignotae, systole nempe, & duae quietes: tum vero quod pene innumerae sint differentiae essentiam non habentes, sed generationem duntaxat, idcirco quam citissime praeterlabentes, vt vix tactu percipi possint.

*In quib. c. 4
systole diffi-
cilius dig-
noscitur pul-
sum.*

Accedit plurimarum inter se similitudo, quae vix patitur distinctionem: Quin etiam distentionis breuitas, cuius non omnes patent partes; Mutatio tam facilis à quacunque non naturali causa; Insignis pulsuum varietas, pro ætatis, sexus, temperamenti & habitus, atque consimilium diuersitate; Nostri tactus stupor, mētis abstractio, differentiarum obliuio, atque alia plurima, quae vique adeo difficultatem augent, vt Gal. impulerint ad dicendum, pro omnibus pulsuum differentiis dignoscendis, non sufficere vitam, pro paucis multos requiri annos; Quo factum est, vt multo tempore existimauit, magnitudinē tantum, atque vehementiam esse sensibilem, confessusq; sit, in systole dignoscenda, multos se consumpsisse annos. Haec quidem studiosos deterrere possent. Ceterum minime in dubium reuoco, iis, qui totam hanc partem breui quadam methodo pertraxerint, cū-
da debere reddi facillima. Itaque qualis haec nam sit methodus, nos ipsi proponamus.

*Quoniam tal
systole dig-
noscenda, mul-
tos consum-
psisse annos.*

CAPVT II.

Quo ordine tractanda sit pulsuum dignotio.

NE in pulsuum dignotione, confusio contingat, sic procedendum existimo: Primum quidem ea sunt proponenda, quorum dignotionem inuestigamus: secundo modi atque instrumenta, per quae in eorum dignotionem veniamus.

Quod ergo ad primum spectat, duo praecipua dignoscenda proponuntur, nempe pulsus partes, & ea, quae partibus insunt. Cum vero partes sint quatuor, dissentio, contractio, & duae quietes: Circa distentionem primo quaeremus, an dignoscatur, & quanta eius portio, & quomodo. Secundo de contractione disputabimus, siue sensibilis, an non: & cum insensibilem esse docuerimus atq; inutilem illius atque vtriusque quietis dignotionem.

*Qua in pul-
sibus sine di-
stentione, in-
trae an-
te in pul-
sibus dig-
noscenda.*

D s silen.

silentio inuoluemus: Conuersoque iterum sermone, ad distentionem, primum proponemus, quænam illi insint: secundo, modum dignoscendi omnia subiungemus. Ad id ergo, quod primo loco propositum est, iam accedamus.

CAPVT III.

De distensione, atque illius partibus dignoscendis.

*De illi modo
distensionem
dignoscit.*

Distentio duobus dignoscitur modis, Tactu scilicet, & Visu; multo tamen certius tactu, quam visu. Etenim visu, motum cognoscimus, non ictum; Tactu vero & ictum, & motum. Est enim motus vtriusque sensus obiectum, ictus autem, tactus dum taxat, non visus. Itaque si visui pater distentio, tactui magis erit conspicua: Quæ tanquam clara prætermitti posse videbantur, attamen pro illis dicta sunt, quos scribit Gal. asseruisse, distentionis ictum sentiri, motum autem nequaquam. Hoc ergo tanquam manifesto supposito, ad distentionis partes transeamus.

*Non sentiri
omnes distensionis
partes.*

Queritur, numquid omnes distentionis partes sensui pateant; an quædam sensum lateant, & quæ, & in quib. partibus, quoue tangendi modo? Non desuere, qui existimant omnes sentiri distentionis partes. Hos refutat Gal. his potissimum argumentis: Dum languet pulsus, Medici quidam dicunt, se nil sentire; alii asserunt; se aliquid sentire: Hæc diuersitas ex eo tantum contingit, quod vnus vno, alius alio vtatur tangendi modo: At si varius tangendi modus est in causa, cur illi sentiant, hi vero non: sicut laret totus pulsus, poterit quoque ob eandem causam eiusdem pars aliqua latere: Non itaque omnes sentiuntur.

*Cur tota non
percipiatur
distentio.*

Sed quia potuisset quis dicere, adhibito conuenienti tactu, totam sentiri distentionem, Gal. duas proponit causas, cur etiam conuenienti adhibito tactu, distentio tota percipi non possit: Prima est ipsa naturalis arteriæ situatio. Secunda, noster tangendi modus.

Ex naturali enim arteriæ situatione, prior distentionis pars nunquam sentiri potest: cum enim sit sub cute arteria, carne, atque pinguedine obducta, nec omnino his partibus contigua, sed quasi in loco quodam, spatioso vacuo locata, dum distentionem incipit, non potest statim digitis tangentibus occurrere: primo enim mouebitur in spatio inani, deinde mouebit carnem & cutem, mox vero digitos ipsos. Antequam ergo motus ceteriora petat, prius percurrit interiora, nobis ignota, ergo distentionis principium, ex propria arteriæ sede, nobis non innotescit.

*Quid ex quo
tota tangendi
modo con-
tingat.*

Quod si quis dicat, ex valida compressione, posse motus initium sentiri, nunc audiat, quid in quocunque tangendi modo occurrat, & cur ex eo, distentionis partes quædam non nunquam lateant. Ex vario ergo tangendi modo, quandoque principium, quandoque autem finis, non nunquam omnes distentionis partes occultantur, prout pulsus vel languidus, vel vehemens, aut moderatus fuerit: Si enim languidus sit, aut tangitur arteria premendo, aut leniter palpatando, aut medio modo: Si prematur, nunquam etiam modo tangatur, omnes motus partes statim pereunt. Nam grauiata à digitis arteria amplius moueri non potest, cum facultas langueat: si enim propter languorem, nec ipsam arteriæ tunica mouet, multo certe minus partes mouebit, quæ supra arteriam sunt, digitusue sustinebit. Itaque siue fortis, siue media sit tangendi forma, in languida facultate, omnes pereunt pulsus partes.

*Quomodo
premiendo
languidus
percipi pul-
sus.*

Quod si palpatando tantum languidus tangatur, media pars sentitur, extremeque fugiunt priores quidem, quia non statim ad eum peruenire potest motus, cum langueat facultas postrema vero, quia à digitis recedit arteria. Cum ergo pressum non sustineat hæc facultas, sequitur, nullum esse tactum, qui omnes languidi pulsus partes consequatur.

*In vehementi
pulsu digito
tangendo, pre-
miendo potius
esse arte-
riam.*

Quod si de vehementi sermo fiat, hic pariter aut leuiter, aut eum pressum, aut medio modo tangi potest: Si leniter, vltima motus pars omnino latet, quia à digito non premētib. fugit, prior vero magis quidem discerneretur, quam in languido aut moderato, quia vehemens, digitis sit obuius, non tamē secundum omnes sui partes, ob ante propositam causam. Quod si pressum tangatur, omnes partes melius, quam in tactu suspensio sentiri fateamur, non tamen integre, vel dato, quod integre, parū admodum hoc ad artem conferret, cum paucissimi in morbis sint pulsus vehementes, plurimi vero languidi aut moderati.

In mo-

- A** In moderato autem pulsu, ex suspenso, ac medio tactu, prima, ac postrema eius pars non innotescit, ex comprimente vero, totus obscuratur motus, ob antea dicta causas. *Moderatè pulsus mo- per se mo- de id*
 Hæc appposito satis declarauit exëplo Gal. 1. de puls. dignos. 3. qui sic scribit, *id ne liquet leuiter a stantem*
corpora, arterias facile, ubi distenduntur, una secum suscollere: graviora ægrum: prægrauia vero non mouere prorsus. Quod dico, multo manifestius animaduertes, si arteriis illius motu prædicto firius aliud corpus subtile ad eum imponas, ut folium, membranam, lentem, panniculum, aut aliud tale quid: scilicet una cum arteria distenta, moueri cernes: Si iterum priori tantundem apponas, tam multo amborum obscurior motus erit: Si vero tertium addas, adhuc longe obscurior: Itidem si quartum, & quintum, tandem impostorum motum, omnino abolitum putabis. Tam si vehementior sit pulsus, plurimum omni corporum feret: sin minus vehement, pauciorum: Quod si nequaquam sit vehemens,
B patet ut nullo onerari corpore possit. Constat ergo ex dictis, totam distentionis partem non sentiri, in vehementibus tamen, quos comprimendo tangimus, minimam amitti; in languidis, quos leuiter tangimus, plurimam; mediam inter vtramque, in mediis manius applicationibus: in hisque prout vehemens erit, vel non vehemens pulsus, impa-tem.

Ex quo modus tangendi arteriam, aliqua ex parte innotescit, vt hæc distentionis partes deprehendantur: In languidis enim palpare tantum: In vehementibus comprimere; In mediis, medio modo tangere oportet. Sed iam ad systolen accedamus.

CAPVT IV.

De systole dignoscenda ex Galeno.

IN hac disputatione de systoles dignotione, tot sunt consideranda, quot etiam in diastole: Vtrum sentiat; in tota, & quomodo? Sed ex prioris quæstioni resoluta, ne, quid de reliquis sit sentiendum, statim patebit.

De systoles dignotione, non modo indocti, sed & doctissimi, experientissimi que viri, ipso etiam Galeno teste, dubitarunt. Idcirco 1. de puls. dignos. diu multumque laborat Galenus, vt modum cognoscendi systolen inueniat, inuentamque doceat. Pro hac ergo re declaranda, tria facit: Primo ostendit in quibusnam pulsibus systole deprehendi possit: Secundo, quomodo ex affectu dignoscat: Tertio, quomodo per se dignosci

Galenus in sy- stole depre- hendit du- bus.

D possit.

Ad primum ergo quod spectat, inquit Galenus, systolen tantum in vehementibus, & magnis pulsibus deprehendit quandoque; in mollibus, multo tamen facilius in duris aut moderatis, illisque tardis, vel certe minime celeribus. Hoc igitur cõstituturo, addit hos pul- sus vehementes, magnos ac duros, non tantum in distentione, quantum in contractio- ne, affectum quendam nostro tactui, ac digitis inferre.

Est autem hic affectus in distentione compressio, & excavatio pulpæ digitorum, quam facit arteria, impetu quodam mota.

In contractione vero nil aliud erit, quam huius excavatæ pulpæ ad naturalem locum reditus. Ex hoc vero sensibili affectu, cognoscitur ipsum obiectum sensibile, diastoles sci- licet, quæ est causa imprimens in digitis, neque enim digitorum excavatio fiet absque ar- teriæ accessu, cognoscetur quoque systole, per pulpæ ad suum naturalem locum reditum; Neque enim redibit digitorum pulpæ ad suum locum, citra arteriæ recessum, qui sit in sy- stole. Ergo sicut accessus digitorum excavans nobis diastolen in sinuat, ita recessus, permittens digitorum pulpam ad suum redire locum, significat systolen.

In quib. pul- sibus systole deprehendi- tur.

quem affe- ctum in ta- ctu, & digi- tis sentiant, prædicti pul- sus.

Quomodo Galenus ex prædicto af- fectu systo- len depre- hendat.

Hæc tandem eorum omnium est summa, quæ Galen. habet 1. de puls. dignos. cap. 3. 4. 5. 6. tot verbis proposita, tot exemplis illustrata, & tam longo orationis filo contexta, vt sa- ne non citra aliquod tedium legi possint. Circa quæ vsuari, eaque omnia ad pensum, vel, vt aunt, ad Lydum lapidem referre, tantisper liceat, cum plurimum inter sit seculisse, sit- ne systole perceptibilis, nec ne: Si enim perceptibilis sit, in ea dignoscenda diu, multum- que laborandum; sin minus, frustra operam, atque tempus ludimus, & ab vtilioribus stu- diis, hominum ingenia tetardamus. Libere ergo philosophemur & rei ve-

ritatem in tenebrarum abyssolatantem, cruamus.

D 1

CA-

An systole ex Gal. doctrina sit percipibilis?

*Ausertur in
Celsi sen-
tentia ex-
cavatio, mo-
dellis.*

Cum multa simul conspirare voluerit Gal, ad hoc, vt systole percipiat, quæ tamen simul, vt existimo minime stare possunt: Cum præterea quædam supponat tanquam clara, quæ apud me, non solum dubitationis plurimum habent, sed & forsan falsa sunt, cogor meam aperte proferre sententiam, Galenum nostrum hæc in parte vsque adeo lyncum optimeque sensatum esse voluisse, vt nihil aut videret, aut senserit, Primum enim cum scribit, systolen dignosci non posse, nisi pulsus pariter sit maximus, vehementissimus, nulloque modo celer, sed potius durus; quis, quæso, non statim intelligat, ex Galen. placitis, maximum ac tardum pulsus, maximum ac durum, vix, ac ne vix quidem, si- mul stare posse? Maximus enim est, non tantum quod facultas valeat, sed quod vsus sit au- ctus; augetur autem vsus per febres. Hinc Gal. *de puls. dignosc.* hanc contractionem in Ephemera, Tertianaue simplici laborantibus, vult esse querendam: At vero si vsus est au- ctus ex febre, tardi nunquam pulsus esse poterunt, imo semper celerissimi. Adde nunquam vehementissimæ fore, nisi vsus augeatur, nam vt antea monuimus, vehementissimi fi- unt pulsus, impulsu facultate ab vsu aucto, non poterunt ergo non esse veloces, Maximus item tunc est pulsus, cum molles sunt arteriæ, quomodo igitur datur maximus simul, at- que durus pulsus?

*Quod maxi-
mus ac tar-
dus, maxi-
mus ac du-
rus pulsus,
simul stare
conueniant,*

*Arteriæ
esse digitis
pulpa duri-
orem.*

Sed de his hæc omnia, systolen posse in moderato etiam pulsus sentiri, idcirco mo- deratam sufficere duritiem, celeritatem, magnitudinem, atque vehementiam, quæ se- quuntur, quæso attentius paulo examinemus. Arteriam inquit Gal, dum à digitis tangi- tur, affectum facere, pulpæ excavationem scilicet; quia quod durum est, & vehementem habet ictum, penetrat id, quod mollius est, molliorem vero esse digitorum pulpam, ipsa arteriæ tunica. Hunc Galeni sensum non bene consequi possum, arteriam, scilicet, quæ membranosa est, intusque caua, durior em esse digitorum pulpa, quæ cute satis dura inue- nitur, carne pauca & densa obducitur, & ossibus admodum est vicina. Ratio vult utrunque potius excavari, quam digitos tantum. Sed demus & hoc, pulpam tantum excavari, arte- riam minime: idcirco hanc excavationem sentiri? Quid inde? hæc ad diastolen spectant, non ad systolen. Subiungit ille, reditum pulpæ, ad systolen spectare, idcirco ex hoc reditu, systolen sentiri. Falsa sunt, vt arbitror, hæc in parte omnia.

*Ex pulpa di-
gitorum, ad
suum locum
reditu syste-
len sit digiti
fieri.
In systole di-
stentione,
tam in dia-
stole, quam
ipse systole,
valida opus
esse digestio-
ne.
Digitorum
pulpa non
possit redire
ad suum lo-
cum.*

Primum quidem, reditus iste pulpæ digitorum ad suum locum, est potius visibilis, quam tactu sensibilis. Secundo, dato quod sentiri posset, at certe dum systolen queri- mus, non sentitur. Probo, Nam si debeat systole dignosci, opus est valida compressio- ne, tam in diastole, quam in systole: In diastole quidem, vt fiat in digitis excavatio (Superficialis enim duorum corporum contactus, non facit excavationem, neque sensibilem accessum, sed oportet vt profundè se tangant illa corpora quorum vnum aliud penetra- re valeat): In systole vero, vt ipsa deprehendi possit: Cum enim recedat in contractione arteria, nisi digiti illam sequantur, motum nunquam percipient, qui neque vltimam di- stentionis partem absque compressione sentiunt. At vero si permanet tam in distentione quam in contractione valida digitorum compressio, pulpa excavata nunquam ad su- um redibit statum. Et eo minus, quia nunquam vsque adeo tardus erit pulsus, vt primæ distentioni non succedat secunda, & tertia, & aliz deinceps, vt propterea nunquā digiti pul- pa arteriam tangens aut comprimens possit ad suum redire locum. At si non reuertitur hæc pulpa ad priorem statum, neque aderit affectio, neque ex consequenti, affectionis causa.

Quod si duo hæc deficiant, ex quibus tanquam præcipuis, atque solidis fundamentis colligebat Gal. systolen percipibilis, vnde nam, quæso, illam hauriemus? Hæc cum ani- mo & mente voluerem, in hæc veni sententiam, Gal. nostrum, hæc in parte nimium pro- priatæ tui tribuisse, & mente potius, quam tactu, systolen cognouisse. Ferant alii iudici- um de hac re, nos enim quod sentimus, libere in publicum proferre volumus: quibus duo tamen adhuc subnectemus, primum est, vt ostendamus systoles dignotionem quan- doque ictu percipibilem esse; alterum vero, hanc perceptionem, non esse vsque adeo magni vsus, vt tam anxie, & curiose sit in- vestiganda.

CAPVT VI.

De systoles dignotione ex propria sententia, & de utriusque quietis cognitione.

TAmetsi contractionis motum minime perceptibilem esse existimemus, id ipsum tamen de ictu non sentio: Cum enim systole, sicut & diastole, motum contineat, & ictum: Motus systole non patet, ictus quandoque patere potest.

Systoles ad motum motum quandoque deprehendit

Sed dicit quispiam, quomodo poterit percipi systoles ictus, cum fiat in opposita arteriæ parte, illi, quam nos tangimus, in profundo scilicet? Illos enim ictus sentiri, qui digitis occurrunt, non autem eos, qui fugiant, & recedant, sed facile cedit, cuiuscunque tandem hæc fuerit instantia: Ictus dupliciter sentiri potest, vel rectus, vel reflexus, seu percussus, vel quomodocunque appellare liceat: Rectum systoles ictum, propter iam adductas causas, minime sentiri posse assentitur: reflexum, vel repercutientem sentiri posse, & ratio, & sensus demonstrant. Ratio primum, nemo siquidem non nouit, omnia corpora circularia, membranosa, concava, in vna parte percussa, in omnes vsque partes ictum communiscare, præcipue vero, in oppositas, & quando ictus sit validus, corporisque tensum: Tunc enim aer percussus resilit, & quasi spilla ad terram, vel murum impulsam, in oppositam partem transit. Id quod contrasonus, aut contrasissure exemplo admodum cumulate confirmari potest, quæ de re apud Celsum, Ambrosium Paræum aliosque plura leguntur.

Quædam systoles ictus sentiantur.

Sic ergo, & dum in systole fiat ictus, tamen si fuerit in parte digitis nostris opposita, profunda scilicet, tamen communicatur arteriæ, præcipue vero opposita, superiori scilicet, quam ob causam ictus in systole non recta linea, sed reflexa percipitur.

Et si systoles reflexa sit, non percipitur: Quæ requiritur, ut systoles percipiantur: tunc autem systoles ictum cognoscitur.

Oportet vero ictum hunc, si sentiri debeat, vehementem esse, aut certe duriorem arteriam, alioquin non faciet reflexionem. Et quidem ratione vehementiæ, profiteor me non semel illum sensisse, præcipue in Vitriario quedam, cuius pulsus consulo multis nos sequentibus Auditoribus plerumque tangendum obtulimus, ut hunc systoles ictum deprehenderent: Ob arteriæ duriem vero, in nobilissimo quodam adolescente Polono, quem alii pariter nos sequentes facile senserunt. Cæterum siue sentiatur systole, siue non, quantæ utilitatis futura sit eius cognitio, ex sequenti discursu elucescet.

CAPVT VII.

Systoles dignotionem nullius fere esse utilitatis.

PRæter summam cognoscendæ systoles difficultatem, accedit etiam inutilitas: cur autem sic dicam, paucis explico: Ideo debet cognosci systole, ut rhythmorum paritas, aut imparitas innotesceret. Hæc haberi non potest, ergo frustra quaeritur systole.

Cur debet dignosci systole.

Quod autem haberi non possit, probo: Nam ut innitatur Galeni etiam fundamentis, licet systole sit perceptibilis, nunquam tamen tota, imo vero semper minor illius portio sensui est conspicua, maior autem ignota: contra quam in diastole contingat, cuius maior pars est cognita, minor vero ignota. Si ergo fiat comparatio motus noti diastoles, cum motu noto systoles, semper videbitur pulsus carere rhythmico, nam diastole maior, & celerior videbitur ipsa systole.

Minor est sensui systoles pars: nam, esse sensui obuiam.

Sed video quempiam dicturum non fieri computationem, inter systolen, & diastolen, ratione magnitudinis distinctionis, quia reuera semper hæc perceptam systolen superat, sed tantum debere conspici viriuse, motus qualitatē: Ut si diastole sit celer, & pars quoque systole percepta sit celer, de tota systole idem fiat iudicium oportet, quod de particula illa percepta, sicque hanc systoles celeritatem cum alia diastoles celeritate conferemus. Probabile sanè hoc videbitur, sicuti. n. de tota diastole sit iudicium, etiam si tota non percipiat, ita & de systole sentiendum.

Cæterum non valet hæc responsio, cum enim dentur pulsus in vnica diastole, & sub vnico digito dispartes in celeritate, potest hoc ipsum in systole contingere, ut pars motus percepta, sit celer, occulta vero sit tarda, atque ideo non valet iudicium de toto, habita vnica parte. Hæc ergo est vna causa, cur inutilem systoles inquisitionem esse existimemus.

Sed & secundam addamus, ex Galeni fundamentis deprorham: Ex Galeno aperte colligimus, in illis tantum morbis, posse systolen deprehendi, qui minoris sunt momenti, vt

D 4

Dia-

Diariis, & mitioribus febribus, in reliquis vero, quorum plus interest, nequaquam. Cum primum. n. pulsus vehementiam, vel magnitudinem amittit, quod sane fit in grauioribus morbis, systoles notitia statim euanesceat. At si in grauioribus morbis perit systole, quod est quod in sanis, & Ephemeris, aut leuioribus tantum Tertianis illam inquirere velimus? Omnia ergo systoles dignotione, omittimus quoque quietum inquisitionem, quas, ignota systole, nemo non intelligit, dignosci non posse. Ad differentiarum ergo diagnosis intransamus.

CAPVT VIII.

De iis qua circa pulsuum differentias sunt dignoscenda in genere, & primo de dignotione moderati, & immoderati.

Cognitis, utcumque licuit, pulsuum patribus, ad differentias dignoscendas, nostra iam dirigatur oratio. Sunt autem illarum omnes dignoscendae differentiae, quas haecenus exposuimus, ad dilationem spectantes, ut pote, quae maxime princeps pulsus pars, tactui conspicua, & maximam habeat cognitionis varietatem, plurimum etiam ad praesigendum ex se possit, & praestet usum.

*Rui pulsus
estis diffi-
cili.*

Insunt vero dilationi Vehemens, Languidus, Magnus, Paruus, Celer, Tardus, Durus, Mollis, Plenus, Vacuus; cum suis mediis, quos Moderatos vacamus, atque cum comparatiuis, vt maiore, ac minore, nec non superlatiuis, vt maximo & minimo, ac reliquis. Hanc omnes veniunt dignoscendi, quibus deinde succedent Frequentes ac Rari: Aequales & Inaequales: Ordinati, & Inordinati, Eurythmi, & Atythmi, tam in genere, quam in specie. In omnibus hisce differentis, est aliquid commune, cuius primo petenda est cognitio; est & aliquid proprium.

*Rui pulsus
sine com-
muni.*

Communia sunt quatuor 1. moderatio, & immoderatio; 2. Immoderatio comparatiua, & superlatiua; 3. Naturalis, & praeter naturam; 4. Gradus excessus praeter naturam. Proprium vero, erit cuiusque differentiae forma, & character.

*Rui pulsus
propria.*

Quod ergo quatuor priora concernit, moderati, & immoderatorum dignotio partim ex te, partim autem ex collatione vnus ad alterum, tactu, & mente nancisci potest. Nam vt ad moderato incipiamus, hic quidem per se mente dignoscitur, habita eius definitione: Tactu vero per frequentem exercitationem, in tangendis eorum pulsibus, quos temperatissimos esse nouerimus. Quod ergo ad definitionem spectat, Moderatum pulsus nemo non nouit illum esse, qui inter omnes magnitudinis paruitatis, celeritatis, tarditatis, aliarumque omnium differentiarum excessus, ad vniquemque medium existat, vt sit aliorum norma, & quasi Polyclesti statua. Reperitur autem in optimo corporis habitu, qui in moderata quadam temperie ac conformatione consistit: idcirco neque in duriore aut molliore, graciliore, aut pleniori corpore inuenitur vnquam. Potest autem optima haec corporis constitutio, a generationis primordiis sinepiens, ad vitam usque finem progredi (nisi homo intemperatissime vixerit) atque ideo suum quaeque aetatem habet moderatum pulsus ad quem tanquam ad proprium genus, reliqui omnes comparari, vel superare, vel superari dicuntur.

*Rui si pul-
sus moder-
atus.*

Huius dignotionem, vt tactu percipiamus certam, accipiendus est homo, in quo suum proprium motum pulsus, a nulla externa causa immutari, retineant. Hoc fiet, si non in longo otio sit versatus, nec recens exercitatus, nec tunc ideo iesuarius: ac praeterea sit temperatus oportet, isque ab omnibus animi affectibus liber, & tranquillissimus habeat mentem. His sic praemissis, si medio vram tangendi modo, brachio in latus, super patientis thorace cum situato, eiusdemque digitis mediocriter flexis, moderatum pulsus per se cognoscemus. In collatione vero ad extremos, si aliqua extremorum praesupponatur notitia, quae similiter duobus comparatur modis, vel in relatione, vel ex se:

*In quo ho-
mo moder-
atus pulsus
tactu per-
cipitur.*

In relatione quidem, ad moderatum, iam propositum: Habito enim moderato, pulsus omnes, quos hunc superare, aut ab eodem superari nouerimus, immoderatos esse censuimus. Per se vero sic dignoscuntur: Inuestigandae primae sunt vitiosae corporum constitutiones, atque omnium illarum pulsus veniunt explorandi, qui sane nobis magis in promptu erunt, quam optimae constitutionis, eum frequentissimi sint vitiosi corporis status, rarissimi vero optimi. Horum ergo pulsuum excessus, ac defectus, attente considerandi,

*Quomodo
immoderati
pulsus per se
dignoscuntur.*

hisque

A hisq; animò, atque mente reputatis, quantum possit moderatus esse inferior excedente, aut superior deficiente, facile inuenimus, siq; vno & eodem tempore, extremes, atque moderatum conueniemus: Deinde veto experientia, & tactu, utramq; explorabimus rationem, vix enim fieri potest, quin si non frequenter, saltem aliquando natura occurrat temperata. Quod si subinde fecerimus, & longo vsu, & ratione tactum excecuerimus, tunc demum patibimur certo, nos non tantum moderatum tenere, in omni pulsuum genere, sed & illis etiam, qui aliquo modo vitra, & citra hunc sunt.

Habemus ergo iuriam, qua moderatos pulsus, atque immoderatos, absolute acceptos inuenire, & nouisse, in genere saltem possimus. Nunc ergo de reliquis, quos comparatiuos ac superlatiuis esse diximus, breuiter agendum.

CAPVT IX

De comparativorum, atque superlativorum pulsuum dignatione.

Sleuti absoluti pulsus dicuntur, verbi gratia, magni, ac parui, celetes, ac tardi, ita compa-
rativè nuncupantur maiores, aut minores, celeries, ac tardiores. Horum cognitio
tota ex absolutorum iam propofitorum dignotione dependet : Quandoquidem maior,
aut celerior dicitur pulsus, in comparatione, ad quemcunque magnum, vel celere, fi-
militet & maior, & tardior in collatione, ad quemcunque parvum, ac tardum. Exploranda
ergo est horum natura, ex absoluti dignotione.

Superlativus autem pulvis, nempe maximus, & minimus, & sic reliqui, partim ex le, partim ex collaris, uno discernuntur.

Ex fequidem, si pulsus tangantur eorum, qui omnium maxime fuerint intempera-
ti, & alterari:

In collatione vero ad moderatos, non in natura temperata, sed in maxime in-
temperata: Ereni excedit magnum in natura omnium maxime in temperata: potius maxi-
mus, vel celestissimus, quam magnus, vel celer digni debet sciri qui est iustus, patrum, vel tar-
dum, in natura in temperata, minimus, vel tardissimus erit nuncupandus. Ita ergo digno-
fatur moderatus pulvis, omnium temperatissimus, ita extremi, tam absoluti, quam
comparativi, ac superlativi.

C A P V T X

De pulsus morboſi & non morboſi dignatione.

Propositorum pulsuum, siue absolutorum, siue comparatiuorum, quidam sunt in ra-
sanitatis limites, quidam vero extra: quorum omnium dignotio, tanquam ad artem
maxime conferens, nunc est proponenda.

4. Morbosus igitur pulsus, à non morbo dupliciter sciungi potest, vel tactu, vel mente:

Taſtu ſi Medicum ægro longa interceſſerit conſuetudo, ob quam ſanitatē tempo-
re illius arteriæ ſæpius tetigerit, & illarum pulſum, tam à cauſis non naturalibus alte-
rari, quam ab omni externa cauſa vacuum, & immunem habuerit exploratum. Ita

Ergo cum qualisnam sit huius hominis pulsus nouerit Medicus, tunc facile statum præternaturalem, cum primum occurrerit, consequetur. Quia uero pauci sunt ægri, quorum pulsus ante morbum, Medicis exploratus, & peripetosus habuerit, ideo in hoc casu, mente potius quam tactu opus erit, quia non tantum pulsus præter naturam, sed eo melior, quo fieri poterit modo excessum gradus teneamus.

Errare autem huius contemplandi onis initium à naturalium, atq; non naturalium pul-
sum dignotione sumendum: Neque enim statim præter naturam, lapsumque quantita-
tem consequi licet, quin prius pulsum tam naturalium, quam non naturalium, termi-
nos cognoscamus, quos cum ipsa experientia minime possideamus, reliquum est, vt pro-
prie ut consequendis ad tria conuegamus. ad Stridū scilicet, Memoriam, & Exercitatione.

Et tunc, quod ad naturales pulsus spectat, studio horum terminos inueniemus, tri-
facientes: primum, in temperatura (quæ intra sanitatis limites sunt) habitum, sexus
um, & ætatem discrimina tenentes: Secundo, effectus seu qualitates, quæ ab his ema-
nant, inquirentes: Tercio, easdem qualitates, pulsibus coaptantes. Sic autem tota hec stu-

dii ratio procedet: Intemperaturarum, sexuum, atq; ætatum quædam excedunt in calore, quædam in frigore, quædam in humiditate, aut siccitate, quædam in compositione qualitatibus. Caliditatis proprium est celeriter mouere, ac dilatare, frigoris de nsare tardeque mouere: Ergo hæc pulsibus aptando, in calida in temperie naturaliter se habente pulsus celeres, & magni; Contra vero in frigida, tardi ac parui reperiuntur.

Quod si de habitibus mærio fiat, habituum corporis alios inuenimus carnosos, obesos, alios graciles, exsuccos. De plenitudinis natura est, vt vel nihil, vel parum relinquatur spatii: De gracilitatis autem natura est, vt multum obtineat locum vacuum. Igitur ad pulsus hæc transferentes, dicemus in habitu pleno, a teras angustari, pulsusq; paruum reddi: In gracili, artcriam, quæ in amplo manet loco, pulsus efficere magnum musicque studio quodam, ex temperie, habitu, sexu, ac ætate, in cuiusq; naturalis pulsus notitiam deuenimus, generalesq; quosdam conceptus formabimus, omniū scilicet iuuenum, virorum, puerorum calidorum, tales esse naturales pulsus: Frigidorum veto, mulierum, senum, pinguium, alios.

Oblato ergo nobis ægre, percepta temperie, habitu, ætate, sexu, statim coniciemus, qualis nam illi esse possit naturalis pulsus. Ad quem cum conferemus, quem tunc inuenimus, & excessum, & excessus modum, facile consequemur: vel maiorem, ac celeriorē, vel minorem ac tardiorē, hoc vel illo gradu eum esse affirmantes. Quod si quæpiam huius studii pigear, idq; nimis laboriosum existimet, studio relicto, memoria tantum vtatur, Galenum adeat, qui libro de puls. ad Tyron. c. 3, de puls. caus. omnium temperamentorum, habituum, ætatum, sexuumque, ita accurate pulsus explicat, vt qui hæc memoriz mandauerit, non minus certum possit de morbo suo pulsus a quo excessus gradu ferre iudicium, quam is, qui ex tactu, atque ægi consuetudine, illum sibi comparauerit.

Cæterum neq; hic gradus sistendus, sed & pulsuum non naturalium mutationes cognoscendæ. Idcirco quod in naturalibus fecerit, id ipsum in non naturalibus exerceat Medicus, vt scilicet, aut studio, aut memoria, aut exercitatione, causarum non naturalium pulsus dignoscat.

Studio quidem tripliciter: primum, horum numerum memoria repciendo: secundo, earum vires expendendo: tertio, ad humanum corpus, imo vero ad pulsus referendo. Et sane, quod non naturalium causarum numerum concernit, non est quod in eo recensendo, diu laboremus, sex esse non naturales causas, iam & lippis, & ton soribus est notum, ac rem, cibum, potum, somnum, & vigiliam, inanitionem, & repletionem, animi affectus, atque venerea. Maior profecto, imo maxima est difficultas, in explicandis illarum facultatibus, cum multæ, atq; propemodum infinitæ sint, præcipue vero, cum non absolute considerentur, sed in relatione ad humanum corpus conferantur. Quanquam enim de balnei, aut ciborum, acrisus facultatib. absolute asserere possimus, vim illis esse, modo calefaciendi, quandoq; refrigerandi, siccandi, aut humectandi. Alia tamen longe diuersa est eorum ratio, si considerentur, vt actu operantur in corpus. Tunc enim quod semel refrigerat, alias calefacit, vel e contra. Id quod magis etiam præstant causæ illæ, quæ nunquam citra corpus inueniuntur, vt animi, & corporis motus, somnus, & vigilia, ac reliquæ similes: Et enim tam varios produunt effectus, pro ratione ætatis, habitus, temperiei, sexus, constitutionis, temporis anni, loci, modi, ac quantitatis, in quibus, secundum quos, & vsque quo adhibentur, vt quandoq; calfacere, quandoque refrigerare, siccare, & humectare, idem causæ genus possit. Datur tamen modus quidam, quo cuiusq; propriam tribuamus facultatem, quæ & omni, & semper insir, etiam si non soli. Erir autem, cum moderatam illam, omni ex parte acceperimus, ratione qualitatis, quantitatis, temporis, modi, loci, ac corporis, cui adhibetur. Hac lege constituta, concedemus, gratia exempli, exercitationi moderatæ, vim calefaciendi: Similiter & cibo, & potui, & animi affectibus, contra vero otio, somno, atque inanitioni, vim refrigerandi.

His sic præcognitis, conferentes deinde causas istas, cum pulsus, affirmare poterimus, pulsus ex motu, cibo, ac potu, vt pote causis caloricis, maiorem, atq; e leniorem reddi: Ex otio, somno, inedia, vt pote causis refrigerantibus, tardum, atq; rarum effici, sicq; eodē modo, quo causarum naturalium, ita & non naturalium, communia formabimus præcepta

*Naturalis
pulsus aut
memoria
sequi possit.*

*Reueratio
non fides, ad
naturalis
pulsus cau-
sa dignoscitur.
Quæ sunt ad
naturalis
pulsus cau-
sa.
Difficilis est
si explorare,
ad natura-
lium causarum facultates.*

cepta; harum videlleet non nullas hoc genus pulsuum efficere, alias vero, aliud. Et hæc, vt dixi, studio comparantur.

Memoria vero (vt antea de naturalibus dicebam) ad Galenum confugiendo, qui *libro de pulsib. ad Tyron. & 3. de puls. caus.* omnium non naturalium pulsuum causas exponit. Sed vtrobique exercitatio accedat oportet, in qua tria facienda. primo quidem corpus propositum ad experientiam designandum, cum sanum sit, ac nullæ externe alterationi obnoxium, secundo causam non naturalem, exempligratia, exercitationem, qua ad id vttemur, moderata quantitate seruabimus, tertio in pulsus mutatione hoc attendemus; & quid casu inciderit, non ex ipsa causa non naturalis natura: plerumque enim vsu venit, vt dum corpus exerceatur, aliquid aliud incidat, quo moueantur humores, ad os ventriculi, aut eor, fiatque Cardialgia, Nausea, Palpitatio, vel quid consimile, quæ extraneas pariant pulsuum mutationes, non tamen exercitationi per se, sed ex accidenti tantum tribuendas. Sic ergo ratione duce, accedente quoque exercitatione, pulsus naturalis, & non naturalis limitis dignosci possunt: Quibus cognitis, tuto deinceps in agrorum diagnosis verfabimur, & quantum à naturali statu deflectant, optime nouerimus. Nam oblato nobis ægrotante calidioris temperamentis, statim coniciemus, naturalem huius pulsuum esse magnum, atque celerem, & si nuper sit passus, aut ab aliquo motu agitat; adhuc paulo maiorem, & celeritatem pronuntiabimus. Itaq; data vtrique huius causæ propria magnitudinis, atque celeritatis parte, quodcunque plus fuerit, morbose tribuemus: quandoq; maiorem, celeritatem, vehementiorem, quandoq; vero & maximum, celerissimum, vehementissimum pronuntiantes. De oppositis eadem est ratio. Etenim aliquando minorem, tardiorē, languidiorem, aut minimum, tardissimum, languidissimum in genere præternaturalium affirmabimus esse illum, qui sit inferior paruo, tardo, ac languido, ex naturali, vel non naturali causa genito. Hæc de pulsuum dignotione in communi præfari voluimus. Nunc autem ad specialia descendamus.

CAPVT XL

De differentiis dignotionis in specie, & primum Magni parui, & specierum.

A Tractatu genetico, ad specificum transeuntes, nobis statim magnus, parvus, & moderatus sese offert pulsus: cum aliis nouem specificis differentiis, alias propositis, Longi, Breuis, Angusti, Lati, Alti, Humilis, atque moderatiorum, qui sui ipsorum dignotionem exposcunt. Horum autem definitio, ante omnia erit proponenda, atque accuratius, quam antea explicanda, quo facilius pateat ad dignotionem aditus.

A magno itaq; & paruo sumptis initio, non disputabo in præsentia, vt alii plerique fecerunt, virum detur magnum & paruum absolute acceptum, vt voluit Iamblicus, referente Simplicio: neq; longior ero in inquirendo utrum magni, ac parui sint termini quidam, quanquam non omnino definiti. Sed neque diutius insistam probationi Gal. voluisse, magnum ac paruum quantitates esse quandoq; absolutas, vt alii fecerunt. Sunt hæc omnia, vel logica, vel extranea.

Hoc vnum scio, quicquid in primo capite secundi de dignos. sentiat Gal. tandem secundo capite in eamdem sententiam, nullum esse magnum, aut paruum, vsque adeo absolutum, vt cuiusque comparationis sit expertus, idcirco illum et pulsuum, quem 2. de puls. dignos. s. voluerat magnum, & paruum, absolute proferri, cap. 2. comparatiuum esse dicit, distinguendo vero ab alijs, qui maiores, vel minores dicuntur, quod ille ad sui generis moderatum comparet, ut, hic vero ad alium quemcumque.

Hoc ergo primum sic supposito, omnem scilicet magnum, paruumq; pulsuum, quodammodo comparatiuum esse, vt illius dignotionem habeamus certam, definitione ante omnia est opus, non ex sensu, sed ex ratione desumpta. Etenim si secundum iensen de magno ac paruo pulsu ferendum sit iudicium, magnus videbitur ille, qui magnam occupat spatium, paruus autem, qui angustum. At res secus habet, Magnus enim, verius dicitur, qui arteria tunicas dispendit, vltra quam ferre possint: paruus autem, qui infra. Moderatus, in quod tantum dilatatur, quantum expedit. Itaq; exposita hæc magni, parui, atq; moderati definitio, magnum posse fieri pulsuum, in arteria parua, & paruum

Species magni parui pulsus definitio.

Gal. de dignos. sententia.

Omne magnum ac paruum pulsuum quoddammodo esse comparatiuum. Quod magnum & paruum pulsuum sit definitio. Magnus pulsus, qui in parua, & paruum in magna viciis.

viciſſim in magna, & moderatum in vtraque, prout tunicarum diſtentionis fuerit magna, parua ac moderata conſequenter patet, perinde poſſe fieri magnos pulſus in ætate puerili, in tempeſte frigidiore, in habitu pingui ac carnoſo, arque in iueneſcentia, temperie calida, & habitu gracili: ſemper enim attendenda eſt diſtentionis quantitas, non corporis amplitudo vel anguſtia.

Quod ſi quiſpiam dicat, neceſſario in amplo vale maiorem eſſe pulſum, in paruo minorem: Lubens, volens, id concedam: At verò, aliud eſt dicere maiorem reddi pulſum, aliud autem ſimpliciter fieri magnum. Fit magnos pulſus in magna ac parua arteria: Etenim diſtentionis forma illa eſt, quæ magnum, paruum, ac moderatum conſtituit: Vaſis amplitudo, vel anguſtia non facit, ſed auget magnitudinem, vel paruitatem. Ea verò plus ſatis diſtendantur, quam par ſit, in paruo autem minus, in moderato denique quantum ferre poſſunt. Hoc voluit Gal. 2. de pulſ. dignis. 4. dum ſcribit: *Ergo ſi qui videatur arteria maiores habere homo, qui comparatur, hoc maiorem etiam habet diſtentionem, moderatum dicimus eſſe pulſum. Quod ſi arteria magnitudo, videatur ſuperare diſtentionis magnitudinem, euiſi minor magnam tunc, vel paruum vocabimur: Si arteria corpus appareat maius eſſe, quam pulſus, paruum ſim arteria minus, & pulſus maior, magnum.* Ex his ergo patet qualis ſit magni ac parui definitio, non ex ſenſu, ſed ex ratione deſumpta: quam proſecto nemo vnoquam recte ad vſum actum modabit, vt ſcilicet dignoſcar in hoc vel illo, magnum eſſe paruumque pulſum, qui naturalem arteriæ amplitudinem, vel anguſtiam ignoret. Idcirco ante omnia in hoc exerceri debet, vt omnium temperierum, habituum, ſexuum, ætatumque naturalem arteriæ ſtatum conſequatur. S e enim facile diſtinguet magnitudinem ex vaſe factam à quantitate diſtentionis, paruitatem ſimilitur: Quamvis ſit quoque aliter modus, ex tangendi ratione prodians, de quo mox dicam.

Vera igitur tangendi ratio triplici eſt donata conditione: 1. vt qui tangit, naturaliter ſit exquisitus ſenſus, 2. vt ſæpius exercitationis lima acutatur, 3. vt congrua rangendi ratione digiti applicentur. Hoc fieri, ſi in carpo tangatur arteria potius quatuor, quam tribus digitis modo ſuſpenſus, modo eomprimentibus, nonnunquam medio modo: Nec quidem extrema illorum parte vnguibus propinqua, ſed pulſa illa media omnium molliore, & exquisiti ad modum ſenſus, quæ quo mollior fuerit, copraſtantiore erit. In latus autem vt plurimum collocando eſt parientis manus, quandoque prona, quandoque ſupina. Sic enim longitudinem, altitudinem, laritudinem, breuitatem, humilitatem, atque anguſtiam, tam abſolutam, quam comparatiuam, præterea vero paruitatem, ex forma motus præductam, à paruitate, ob vaſis anguſtiam facta, dignoſcere, ac diſtinguere poterimus.

Et vt ab hoc vltimo incipiamus, paruum ex propria forma, ab eo, quem naturalis facit arteriæ anguſtia, tangendi modus diſtinguit, quia ſi hunc aliquantulum comprimas, magnum, vel moderatum inuenies: illum vero, quo magis compreſſeris, ſemper minorem reperias. vt tandem in intermitte ntem tranſeat, quod ſi digitos aliquantulum ſuſpendas, motum denud redire videbis. Magnum vero, maiorem, atque maximum, idem pariter tangendi modus modo comprimens, modo ſuſpenſus, nonnunquam medius, facile docet. Dum enim quatuor digitis tangitur arteria, brachium vero non prouum, non ſupinũ, ſed poſtus in latus collocatur, arteria plurimis occurrit ſui partibus, idcirco omnes quantitatatis diſtentiones vno, & eodem tactu explorari, & inter ſe diſtingui poſſunt. Quia vero cognitiſtiſtine ad modum ſingulis partibus, totum quoque facilius deprehendetur, idcirco ſequentibus capitulis in ſpecierum magni ac parui dignotione verſabimur. Quamque referat hoc vel illo modo tangere, enunciamus.

CAPVT XII.

De longitudine, latitudine, & altitudine pulſus, ſerſim dignoſci poſſint: & de longitudine, ac breuitate dignoſcenda.

ANtequam modum proponiamus, quo in ſpecierum magni atque parui pulſus cognitionem deuenire poſſimus, opere pretium eſſe duximus, enuſſa in dubio occuſum præpedire, quod ab ipſo etiam Gal. fuit propoſitũ: Vtrum ſcilicet vlla magnitudinis vel paruitatis ſpecies dignoſci poſſit? Etenim ſi ratione duce huius rei negotium pertra-

care

Actare animus sit, videtur profecto nulla latitudinis, aut longitudinis, vel altitudinis pulsuum notitia separata esse.

Primum enim, si de longitudine sermo fiat, quam, quæso, ratione longum aut breuem vocabimus pulsum, si ad summum quatuor tantum digitis arteriam tangimus? Cum enim sæpe tres cubitos longa sit arteria, qui fieri potest, ut quatuor digitis longitudo tota tangatur? Quod si tota non tangitur, quomodo de longitudine, aut breuitate iudicium fieri?

*Dubio, quæ
est a longi-
tudine ac
latitudine
arguatur
non possit.*

Sed de latitudine, ac profunditate, maior adhuc est difficultas, non enim videntur duæ istæ dimensiones, in arteria vilo modo distingui posse, cum enim circularis sit arteria, sicut in circulo, ac globo confusa sunt omnia, vnaque est vel linea, vel superficiei circumferentia, sic esse in arteria putes, cuius cernitur in dissectionibus figura, multis locis cylindrum, multis etiam conum referre: Non est ergo, quod duas distinctas numeremus dimensiones, altitudinem, atque latitudinem, sicut in quadrangularibus corporibus, in quibus separatim videas latitudinem, à profunditate distinctam. Quomodo ergo Medicis in mentem venit, seorsim de latitudine, & seorsim de profunditate differere? cum debeant, ut est, & conspiciuntur, ex partitionibus, vnam eius longitudinem appellare, alteram circum, ut multi frequenter vocantur.

His ergo sic præmissis dubiis, docebimus primo modum dignoscendi longitudinem: Mox veto, quæ ratione latitudo à profunditate distinguatur explicabimus, & utriusque dignotionis modum, ac quantitatem subiungemus. *Tota pul-
sus longi-
tudinem nota
potest, quæ
talis com-
parari.*

Cpotius, quam tactu comparati potest: Nobis enim arteriam quatuor digitis tangentibus, pulsus vel pluribus occurrit partibus, vel paucis, vel mediomodo; si pluribus, tunc statim sic ratiocinamur, multis occurrit partibus, ergo & reliquis occurreret, secundum longitudinem, si omnes tangi possent; at non possunt, ergo: De reliquis non tactis, idem sit iudicium, atque de tactis, sicque longum constituemus pulsus. Quod si paucis occurrat partibus, factò de reliquis iudicio, dicemus hunc esse breuem. Ex quibus etiam moderatus patet. Non ergo quod quatuor occurrat digitis, longus dicitur, nec quod duobus brevis: neque quod tribus, moderatus, sed sunt tantum signa isthæc, quibus longitudo, breuitas, ac moderatio dignosci possunt.

*Tota pul-
sus longi-
tudinem nota
potest, quæ
talis com-
parari.*

*Quæ sit lo-
gitudinis,
ac breuita-
tis pulsus
signa.
Qualis du-
bus efficien-
da esse
dum, in lon-
gitudine, ac
breuitate di-
gnoſcenda.*

Debeat autem accomodatus esse tangendi modus, atque is, qui à Gal. explicatur, omnino non premat, imo sæpe leniter palpet, & veluti manu suspendat: Nam si nimium premat in languidis, perit motus, vel ex toto, vel pro maiori parte, si non premat, & hos sentiet, & vehementes quoque. Quod si pressus aliquando fiat, saltem cauendum, ne in superiores arteriæ partes, quæ versus eor sunt, contingat. Nam inferiorum partium motus obſcuratur: quod si inferiores premantur, non propterea superiorum motus delabitur.

CAPVT XIII.

De latitudine, & altitudine dignoscenda.

Tametsi in præcedenti capite dictum sit in arteria latitudinem ab altitudine distingui non posse, eo quod circularis sit, in circulo autem consula esse omnia: nihilominus,

Equia non ab omnibus corporibus, nudatas tangimus arterias, sed in alio corpore positas, hinc ponere in illis licet sursum, atque deorsum, dextrorsum, & sinistrorsum: Etenim deorsum dicemus, vbi sustentatur arteria: sursum, quod est regione: Et quod inter hæc, ex imo sursum, altitudinem vocabimus: contra vero desuper deorsum, profunditatem. Porro vbi altitudo, atque profunditas, ibi quoque latitudo, & angustia datur: ergo etiam in circulo duplex hæc dimensio, eo quem diximus modo, concedi potest.

*Quid desuper
sum in arte-
riis, item
quid sursum,
quid altitu-
do.
Vbi latitu-
do, ac pro-
funditas, ibi
longitudo.*

Ceterum altitudine, & latitudine admissis, adhuc tamen illud idè occurrit dubium, quod in longitudinis dignotione contigisse diximus, scilicet, non posse tactu duas istas dimensiones integras haberi, imò vero magnam occultari arteriæ partem, quia maior est arteriæ pars secundum latitudinem, ac profunditatem, quam non tangimus. Cum nulla

Fenim arteriarum, quas tangimus, sit nuda, sed omnes vestiantur multis locis, à paucioribus, & subtilioribus corporibus, aliis vero pluribus, & crassioribus, plane est in confesso, non perinde omnes arteriarum motus sentiri posse, sed illarum magis, quas pauciora, & subtiliora, harum minus, quas plura, & crassiora circumſeſtunt corpora. Quomodo ergo latum vel angustum, altum vel humile dicemus pulsus, cuius totam latitudinem, vel altitudinem non sentimus? Hæc est dubitatio, cui eodè occurrimus modo, quæ

*Quarima-
teriarum
tunc magis,
aut minus
sentiantur.*

E antea

antea de longi pulsus dignotione loquentes, cum Gal. proposuimus. Cuius synopsis hæc A
est: pulsus istos ratione potius quam tactu dignosci. Qui enim multis occurrit arteriarum par-
tibus, etiam si totus non sentiatur, attamen latus vel alius dicitur; qui vero paucis, angu-
stus vel humilis: Etenim de toto motu faciendum est iudicium, vna illius parte percepta,
quæ, ut superius diximus, vel per plures, vel per paucissimas, vel per moderatas occurrit
partes. Hæc itaque est ratio cur longum, breuem, & moderatum; latum, angustum & mo-
deratum: altum, profundum, & moderatum, tactu nos percipere possit affirmemus. Pro
quibus tamen sigillatim consequendis, necessarius est conueniens tangendi modus. Pri-
mum enim necessaria est brachii patientis congrua situatio. Supina enim, sicuti longitu-
dini atque latitudini minime conuenit, ita altitudini est aptissima: prona vero è contra:
prona siquidem statu, partes supra arteriam constitutæ, illam aggrauant, atque ad in ferio-
ta depe lunt, sicque minuitur altitudo, hac vero imminuta, latitudinem augeri oportet, B
sicuti è conuerso, dum supina situatur arteria, cutis ab ea recedit, minime grauat, ideoque
in altum eleuari permittit, imminuta interim latitudine. Secundo, modus tangendi va-
rius pariter est adhibendus: pro longitudine quidem, ut antea quoque dicebam, potius sus-
pensa applicatione: pro altitudine vero, ac latitudine comprimente, vel media.

His si quispiam figuræ ipsius arteriæ observationem addat, facile altitudinem à lati-
tudine distinguet. Alta enim arteria habet vetricæ trianguli figuram, lata de pressam.
Itaque altus erit pulsus, cuius arteria in superficie sit cuspidi pyramidis assimilis: latus vero
qui depressum in medio globum æmuletur. De magni, parui, ac specierum illius digno-
tione hæcenus, Nunc vero ad celerem ac tardum transeamus, C

CAPVT XIV.

De celeris, tardi ac moderati, celerioris atq. tardioris pulsus dignotione.

Celeris ac tardi pulsus dignotionem aggredior, quæ cum ex se apprimè sit difficilis, à
Gal. tamen, ni fallor, multo fuit reddita obscuro. Et quidem ex se, diu ob causas
est difficilis: tum quod non apud omnes eadem proponatur dignoscend ratio: tum quia
non tantum æqualis celeritatis, sed & inæqualis, quæ ægre admodum comparari potest,
dignotio quærat. Obscurior autem a Gal. reddita est præsens disputatio, tum quia non
in vnicò libro, de hac re verba fecerit, tum vero, quod varia, atque inter se admodum cõ-
traria, variis hæc protulerit locis, & quæ sentulerant cõspicua, quæstionibus philosophi- D
cis ita inuoluerit, vt quid ipse sentiat, lector facile consequi non possit. Enitatur tamen pro
piorilli, hæc vtriusque celeritatis, tam æqualis, quam in æqualis inuenire dignotionem, Gal.
nostrum conciliare, interpretari, omnibusque reddere conspicuum.

Ad primum quod attinet, quatuor esse, & fuisse rationes inuenio, quibus & nunc, &
olim celeberrimi Medici, celeritatis atque tarditatis dignotionem sibi comparare possent
exstimarunt. Prima quidem ex quantitate temporis diastoles desumitur; Secunda ex quan-
titate temporis interualli: Tertia ex proportionem temporis motus ad spatium: Quarta ex
motus qualitate.

Duas priores quod attinet, ambæ protus sunt expungende: Etenim si dignotionis
ratio: ex temporis diastoles accipiat quantitate, celerem dicemus, qui breui tempore
transit, tardum, qui longo. At res non sic habet, breui enim tempore etiam paruus transit,
quamquam sit tardus, vt formicantis exemplo probauit Gal. contra Archigenem, qui ce-
lerem dicebat esse formicantem, omnium tamen tardissimum. Celerem quoq; aliquando
perabimus tardum, qui propter spatii longitudinem, breui transire nō possit, cum in am-
pla exerceatur arteria. Ergo ex temporis diastoles quantitate, dignoscendæ celeritatis,
aut tarditatis ratio locum habere non potest. Neque vero ex interuallorum temporibus,
celer aut tardus est accipiendus: Etenim ex breui creber, ex longo tardus exoritur: qui quā-
tum à celeri, tantoque distent, mox exponam.

Ad proportionem quod spectat, Gal. 2. de puls. dignos. longo orationis tractu demon-
strat, celerem, tardum, atque moderatum pulsuum, ex proportionem temporis motus cum
spatio accipiendum esse: Ad tertium vero librum de descendens, statim in 1. cap. hæc omnia,
quæ antea tanquam rara acceperat, refutare non est veritus, qui scribit, temporis, & inter-
ualli proportionem, minime esse accipiendas, quod hæc laboriosa, longa, difficilisque iudi-
cii & æstimationis sint, ideo tamen 2. de puls. dignos. proposita fuisse, quo his errorum præ-
cideret, qui ex solius temporis quantitate, de his æstimabant: Idcirco concludit, impetum
motus

quis de cau-
sa ex se cele-
ritas ac tardi-
tudo digno-
scitur, diffi-
cillima
est. Celeris ac
tardi pulsus
dignotio
à Gal. esse
difficillimam
redditam.
Quatuor ra-
tiones, quibus
antiqui cele-
ritas, ac tardi-
tudo pulsus
dignos-
cuntur, sibi
comparare
possent
exstimarunt.
Prima quidem
ex quantitate
temporis
diastoles
desumitur.
Secunda ex
quantitate
temporis
interualli.
Tertia ex
proportionem
temporis
motus ad
spatium.
Quarta ex
motus
qualitate.

A motus tantum esse æstimandum, celeremque dici pulsum, qui sit incitatus: tardum, qui remissus. Hæc vtro ex solo tactu, abque vlllo labore: aut ratione nio, vnumquæque nouisse posse. Effic enim motus qualitates, quæ dum sit motus, innotescunt cessante motu, statim desinunt. Hæc cum legissent Galeni hæc posteriores nonnulli, illum libentissime amplectentes, existimarunt se celeris, ac tardi pulsum dignotionem breui ac facili labore cõlecuros esse. Inquinunt enim temperatissimo homine proposito motus qualitate tactu inuestigandam, hancq; tanquam moderatam, aliarum omnium mensuram esse constitutendam, ad cuius collationem reliquas omnes nimis incitatas aut remissas, celeres vel tardas esse, dignoscamus. Hæc profecto vera esse minime reuocato, & à Gal. 3. de puls. dignot. 1. proponi cõcedo, integre vero celeris ac tardi pulsum notitiam præbere, aut facile, ab eodem Gal.

B loco citat. desumi posse, haudquaquam permitto. Primum enim, cum certum sit, celerem pulsum ac tardum esse multiplicem, prout in celeri vario quodam modo motus sit incitatus: & in tardo vario modo remissus. vt hinc quidam celer tantum, quidam celerior, ac celeritimus, Alius pariter tardus, tardior, ac tardissimus dicatur; Putamusne tactum reperiri vsque adeo exquisitum, qui ex se possit hæc varias celeritatis ac tarditatis differentias distinguere? Non equidem: ergo opus est tactu & mente.

Quo modo autem mente? Eo sane, quem philosophi proponunt, quem acceperat Galen. 2. de puls. dignot. tametsi 3. reprobasse visus sit ex collatione videlicet temporis cum spatio, cuius inferius mentionem faciam. Ad hunc autem modum esse confugiendum, alia quoque suadet ratio: Etenim cum non minus necessaria sit celeritatis dignotio in systole, quam in diastole, nunquam profecto dignoscetur celeritas in systole, si ad incitationem respiciamus. Etenim cum systoles motus minime sit sensibilis, multo equidem minus sentietur hæc qualitas, in ritario, scilicet aut remissio: At vero necessariam esse celeritatis ac tarditatis notitiam in systole, si nihil aliud, certe ipsi rythmi declarant. Quæ cum ex motu incitato haberi non potest, reliquum est, vt alia quadam methodo inueniatur: nempe ex collatione temporis cum spatio: vt cum breue sit tempus ac spatium magnum, celerem dicamus contractionem: tardam vero, è contra. At si hoc modo inueniatur celeritas & tarditas in contractione, quid prohibet, quominus in distentione eodem quoque modo cõsiderari debeat? Nil profecto: itaque celeritatem ac tarditatem in pulsu, ex temporis collatione cum spatio metiri debemus.

D Quo fit, vt ad solam motus qualitem, minime propter celeritatis ac tarditatis notitia confugere debeamus. Quam etsi non inficior ad indagandum celerem ac tardum pulsum, omnium breuissimam, ac facillimam esse, attamen quod antea me facturum dixi, nunc breuiter ostendam, à Galeno vsque adeo obscuram ac difficilem esse redditam, vt quid ipse velit, aut quid in quæstione, quam proponit, statuendum sit, non facile constet.

Concedant, quæso, nobis lectores, vt totum Galen. textum huc transferamus. vcrba illius deinde attente legant, considerent, interpretentur si possint: videbunt omnia renebras ac difficultatem olere. Sic enim scribit: Omnia enim corpora, quæ mouentur ex locis, vbi

E tum prædicamus: vbi facile disciunt, celerem. His scio futurum, vt quæstio se physica offerat, an corpus, dum mouetur, etiam maneat aliquo modo; at qui in commentariis de motu, illud ita, vt quod maxime probatur, verum esse. At à tantis in præsentis quæstionibus declinemus, ne nos implicemus. Quod informat tantum sensus ad dignoscendos celeres, & tardos pulsus, hoc satis est, si dicamus nimirum vnum motum cedere videri loci facile, in quibus semper fit, alium duntaxat inibi moueri, itaque hunc tardum, illum celerem vocari. Nam ex locorum transitu sensus dignoscit, non ex totius motus tempore, nec separatim, & solo, nec quatenus cum quantitate cooperatur. Itaque celeritatis & tarditatis facile notitiam consequimur, non perinde consecuturi, si quantitate temporis, & intervallo rum aucupati, eorum suuineremus proportionem obseruare. Enumera non sustinemus: nam vt primum aciem intendamus, momento temporis, meram nos corporis, quod mouetur, depræhendimus, ex qua transitum

F conuenimus. Quo fit, vt qua cernimus, hæc nobis interim dentius consistere videantur, licet vellecissime agitentur: Vnde liquet ratione nos motum colligere, non sensu depræhendere. Si quidem cum prima quæque sensibili corporis parti, quod mouetur in primo sensibili loco subsistat, primo sensibili tempore, tum immobile, quod cernimus, esse videtur. At vero vbi prima sensibili parti, in primo sensibili loco, quam primo sensibili tempore, subsistat breuiore tempore, tum videtur moueri. Singula enim qua diximus, discicari, quod ad naturam spectat, in infinitum possunt: sensu vero si afflmet primas

De iis sit or-
tur pulsum ad
locum.
Sensu tactu
aut mouere
celeri & ac tar-
di pulsum
dignoscitur
dignoscitur
dignoscitur

Ex prædico
distinguitur, ad
suscipiuntur
celeri & ac tar-
di pulsum
dignoscitur
dignoscitur

Celer & tar-
di pulsum
nunc quæ-
ritur, ut
ne coar pul-
sum sit mou-
te mouetur
gendum.
Sensu tactu
aut mouere
celeri & ac tar-
di pulsum
dignoscitur
dignoscitur

Sensu tactu
aut mouere
celeri & ac tar-
di pulsum
dignoscitur
dignoscitur

habere partes & initio coniuncta est, & velocissimus est motus transcurfus sept non ratione, sed sensu. **A**
si de preterito videtur. Nam quorum primo sensibili tempore prima sensibili pari, in primo sensibili loco motus horum tam non motus, aperte scilicet, non sensibus, sed ratione animaduertere. Multa profecto in his verbis recondita, ac controuersa continentur, quæ ego pluribus declarare aut disputare nolo. Hoc tantum dicam, Gal. hoc in loco physicam mouere quæstionem, an corpus dum mouetur, maneat etiam aliquo modo, & breuiter concludere, id esse comperitissimum, atque ab eodem commentariis de motu (quibus caremus) comprobatum, omne scilicet quod mouetur etiam quiescere. Quod experientia quoque docet. Etenim quædam quæ mouentur, quandoque putamus minime moueri, vt cælestia corpora, & alia quæcunque à nobis valde distant, vel insensibiliter mouentur, vt manus, seu radius in horologiis, & umbra in Gnomone. Hæc enim omnia, sensu moueri non cernimus, quia moram in locis non faciunt, vt hinc colligatur, celerem esse motum, qui locis facile cedit, tardum, qui diutius in locis moratur. Præterea, ex quiete motum, non ex motu quietem percipi, motum enim non sentiri, sed ratione deprehendi. Hæc pluribus à Galen. proposita, atque exemplis illustrata, nemo non intelligit esse perquam difficillima, philosophicæque principiis omnino contraria. Quid enim quæso est morari in spatiis? quæ est hæc mora? quale est hoc spatium? Vallesius qui 3. controuers. 2. libentissime hanc Gal. accepit sententiam, vt probabilem redderet, eiuſdem sensum pluribus aperuit verbis, quorum hæc est summa: Galenum in hoc loco, Xenonis, ac Stoicorum, de laetione accepisse opinionem, quibus ipse tribuit, vt voluerint, omne quod mouetur, dum mouetur, duo in se continere, transgressionem, ac mansiueculas, seu morulas in locis. Motus autem transgressionem esse continuas, sed propter temporis breuitatem, imperceptibiles: moras vero esse illas, quæ pereipiuntur, & per quas transgressio dignoscatur, hinc vere à Gal. dictum esse, motum id est transgressionem, ratione, non sensu comparari, sensu vero moram percipi, ex hac autem, & transgressionem. Ideo enim nos arbitrari motum videre, quod in locis maneat: eum autem in locis non fuisse, nunquam sensibilem futurum: totam ergo rationem, cur videatur, ex mora in locis dependere, Hinc iure Gal. dixisse celerem esse pulsum, qui moram non facit in locis: Tardum, qui est contra. Hanc Gal. sententiam, quibusnam rationibus, contra communem tueatur Valles. apud illum legantur curiosis lectores: Neque enim nostrum est consilium, hanc agitare quæstionem, aut cuiusnam parti ad hæc adhaeremus, determinare. His ergo prætermisiss (satis enim ab eo, quod à principio posuimus, deuiasse videmur, dum hæc parum vtilibus quæstionibus, tyronum animos confundimus) ad rem nostram redeunt, quid de dignotionis ratione, celeris, tardis, atque moderati pulsus sentiendum sit, facile aperiemus. partim per conclusiones quasdam, quæ hæcenus dicta sunt, repetentes, partim nonnulla in præsentia superaddentes.

B
Omne quod mouetur, eis non quiescit Galen.
Quis color, & cardus motus. Ex quate signis motus, non de motu.

C
Motus esse continuus transgressionem Valles.

D
Quis color, & cardus motus. Ex quate signis motus, non de motu.

E
Quis color, & cardus motus. Ex quate signis motus, non de motu.

F
Quis color, & cardus motus. Ex quate signis motus, non de motu.

G
Quis color, & cardus motus. Ex quate signis motus, non de motu.

H
Quis color, & cardus motus. Ex quate signis motus, non de motu.

I
Quis color, & cardus motus. Ex quate signis motus, non de motu.

Atractionis celeritate, ac tarditate inferius abunde loquemur. His ergo sic explicatis, ad æqualis celeritatis dignotionem spectantibus, nunc modo succedit, vt de inæquali dicamus, quæ mente, tactu, atque tangendi modo comparatur.

Mente quidem, ex tempore ad spatium, & morulas, collatione. Cum enim nullus sit inæqualis pulsus celeritate, qui etiam magnus non sit, idcirco per magnum fiat spatium oportet, At si in magno hoc spatio cito se expediat, celerem esse nemo inficiabit.

Adde quod in æqualis celeritate, quædam habet morulas, multo eundem magis conspicuas quam æqualis. Cum enim duo, vel tria habeat tempora inæqualia, oportet sane inter vnum, & aliud aliquam fieri morulam, siue sit vera quies, siue non.

B Quod si non obstantibus morulis, cito se pulsus expediat, clarum est celeritatis argumentum, sin è conuerso, tarditatis. Ex quo constat, hanc de morula in spatis sententiam, in dispari, atque interrupto pulsu, multo clarius locum habere, quam in pari, æquali, atque continuo. Et hæc tunc de modo dignoscendi celerem, tardum, moderatumque pulsus, mente ac ratione,

Tactu vero inæqualis celeritas, ac tarditas perinde cognoscitur, atque æqualis antea descripta. Cum enim incitatus sit motus, celer erit, cum remissus fuerit tardus.

Quod vero tangendi modum concernit, his opus est conditionibus: primum quidem pulsus magnitudine, ac vehementia, sine qua nec diuidi motus in plura tempora, nec si diuisus fuerit, sentiri potest, parvus enim languidus, fortiter compressus, omnem amittit motum, moderatus vero extremam sui partem, finem scilicet: Qui si palpando tangatur, principium habebit ignotum. At si in vno pulsu amittatur principium, in alio finis,

C qui fieri poterit, vt in eo motus in tria diuisus tempora, dignoscatur? Si enim priores illius partes, ac postremæ latent, latebit profecto & illarum motus. Opus ergo est magno, ac vehementi pulsu, vt inæqualis celeritas dignoscatur. Sed quid? ergone inæqualis celeritas, in maximis tantum, atque vehementissimis pulsibus percipitur? Non equidem: nullus etenim fere esset vsus, in Artis operibus hæc inæqualis celeritas, vel tarditas, si in his tantum comparari posset. At vero illam multi vsus esse declarabimus, & omnium febrium, quæ inæquales sunt in tempestates, comitem esse ostendemus. Quid ergo agendum vt percipiatur? Breuiter cum Gal. dico in pulsibus etiam, qui à maximis, & vehementissimis paululum defleuant, vel saltem parui, & languidi non sint, omnes motus partes, consequenter duorum saltem temporum disparitatem sentiri posse: Si videlicet quandoque palpando, quandoque autem comprimendo, illos exploremus. Si enim palpando, extremam motus partem sentimus, comprimendo autem priorem, sequitur, nos vtramque motus partem dupliciter nancisci posse, aut in principio distentionis palpando, & in fine comprimendo, vel opposito modo agendo, aut etiam in vno pulsu palpando, in alio autem comprimendo: vtro modo comparetur, nihil vel patum refert, dum modo principii, atque finis diuersitate percepta, in causatum, affectionumque notitiam deueniamus.

D Hæc de celeris, tardi atque moderati pulsus dignotione dicta sufficiant. Itaque ad frequentis, rari, vehementis, languidi, cæterorumque dignotionem proponendam transeamus.

E

CAPVT XV.

De frequentia, rari, moderatique pulsus dignotione.

Frequentia, atque raritatis dignotionem duplici proponam modo, vno quidem pro illis, qui vtramque quietem se tactu percipere profitentur, ex quorum numero, me vnum esse, minime profiteor: Altero pro iis, quibus nec systole, nec quietis exterioris, ab interiori, distinctio est cognita, atque perspecta, in quorum classem, & me ipsum repono. Itaque si exterior & interior quies alicui innotescat, frequens erit pulsus, secundum exteriorem quietem, cum breui moratur ante systolen, frequens vero secundum interiorem quietem, cum breui moratur ante diastolen. Rarus autem vel secundum hanc, vel secundum illam, cum in hac vel illa, longam duxerit moram. Ad exterioris autem quietis di-

Fgnotionem, suspensa manu; interioris vero, comprimente opus est. Etenim exterior quies distentionis fini, interior, principio responderet: vt sicuti ex suspensa, postrema distentionis pars magis innotescit, & cum ea quies exterior sita ex comprimente, prior distentionis pars, cum interiori quiete promptus manifestatur. Hæc sunt ingeniosa quidem, sed cum sensu non conueniunt: Quietem, prout est sensibile commune, sensu percipi non recusos eodem vero sensu, vnam ab alia quiete distingui posse, minime concedo. Si enim motus

*Quæ modis
inæqualis
celeritas, ac
tarditas, co-
paratur.
Quæ si pa-
ris celeritas
inæqualis
est magis.*

*Ad magis &
vehementis
pulsus opus
est ad ma-
gnam celer-
itatem digno-
scendam.*

*Quid agendu
sit ut pulsus
qui à manu
est & ve-
hementissimis
parui de
sistunt, co-
gnoscantur.*

*Quæ si pa-
ris pulsus,
sistunt eo-
de sensu, co-
gnoscantur.*

*Quæ si
sensu non per-
cipi.*

E 3 systo-

ystole est imperceptibilis, qui fiet, ut tactus exteriorem ab interiore quiete distinguere valeat? Accedit quod dissentionis principium, in omnibus fere pulsibus lateat, ergo multo magis quies interna. Quid ergo est, quod ab his, quæ tactum fugiunt, tanquam tactui conspicuis, dignotionem petamus? frustra sane id facimus, atque inutiles lectorum animos confundimus. Frequens ergo est pulsus, qui breui moratur in interuallo; Rarus, qui diu. Raritas ergo ac frequentia à longitudine, vel breuitate temporis interualli est petenda, quæ tanquam sensibus apprimè conspicua, pro sui notionè, aliam non requirit exercitationem: itaque ad alios pulsus calamus conuertamus.

CAPVT XVI.

De vehemētis ac languidi pulsus dignatione.

*Vehemens
pulsus.
Languidus
moderatus.*

Vehemens pulsus, qui contentus vocatur, is est, qui pulsando tactum impellit, atque euer-
tit. Languidus est huic oppositus. Moderatus autem ille dicitur, qui nostrum quidem oc-
currit digitum, non tamen admodum impellat, aut euer-
tat.

*Quomodo
vehemens
pulsus à re-
liquis distin-
guatur.*

Maximam habet pulsus iste cum duro, conuulsuo, vibrato, magno, ac celeri simi-
litudinem, ut propterea, & dignotione, & distinctione indigeat. Ad quæ duo præstanda,
confert summopere comprimens tactus: Etenim in comprimendo tactu, istus vehemen-
tia illum facile à magno, ac celeri distinguit: resistentia vero à quocunque alio simili, ut
duro, conuulsuo, ac vibrato. Etenim hi omnes, quo magis comprimuntur, eo minus re-
sistunt, nisi simul vehementes sint. Vehemens autem, quo magis comprimitur, eo magis
reluctatur. Ad hæc vehemens digitos impellit, & euer-
tit, durus euer-
tit quidem ac premit,
non necessario impellit. Sic enim videmus impetuosos aquarum vortices, quæcunque
sunt obice, impellere, atque euertere, non autem cauum in illis facere: Contra vero du-
ta, si careant istu, non impellunt, sed compressa, cauum reddunt partem, à qua tangun-
tur, si mollior fuerit. Sic ergo vehemens pulsus digitos impellit, & euer-
tit: durus autem,
in eorum pulpa, cauum facit, quod nil aliud est, quam premere, & euertere. Hoc ergo mo-
do distinguitur vehemens pulsus, à duro.

*Vehemens
pulsus à con-
uulsuo &
vibrato dis-
tinguitur.*

A conuulsuo autem, ac vibrato, quod vrante dicebam, hi compressi cedant, nisi si-
mul sunt vehementes, solus autem vehemens, nunquam cedit. Ad hæc, in conuulsuo
adeo tensio, in vibrato eleuatio arteriæ ultra naturalem locum, quorum neutrum vehemē-
tiam contingit.

*Languidus
pulsus.*

Cæterum cum vehementem dixerimus esse duplicem, moderata, atque optima
corporis temperies, & habitus, vehementem moderatum ab alio vehemēti immodera-
to, distinguet, simul cum istus vehementia: Etenim moderatus nec tactum euer-
tit, nec ab eo euer-
titur: Vehemens aut immoderatus, præterquam quod tactum valide euer-
tit, habet præterea corporis temperiem calidiorem, causas calorificas, tam non naturales,
quam præter naturam, quæ tamen cordis vim non labefaciunt. Hactenus de vehemen-
tis dignotione. Ex quibus facile à contrariis sensu, languidus pulsus dignoscetur. Ete-
nim languidus est, qui à tactu facillime euer-
titur, idcirco suspensio tantum tactu deprehendetur,
comprimente autem vel medio statim euascescit. Sed de horum dignotione plura
dicentur infra. Nunc, quæ de duro, ac molli dicenda supersunt, explicemus.

CAPVT XVII.

De duri, ac molli pulsus dignatione.

*Duplici-
modo à pro-
prio arietat
molli pul-
sus.*

Durus, molliisque pulsus, & absque motu, & cum motu dignosci possunt. Absque mo-
tu quidem, ex carnis humiditate, aut siccitate: Etenim caro humidior mollem, sic-
cior durum offendit. Cum motu vero, ex proprio pathemate. Durus enim pulsus, quasi
lapis, aut metallum digitos premit, ut pulpam excæuet: Molli vero compressus tactum
subterfugit, ut vix sentiat. In quo à vehemēti differunt: durus quidem, ut dixi, quo pre-
mat, non impellat: molli, quod tactum fugiat. Ad hæc durus pulsus nunquam est ma-
gnus: vehemens nunquam est paruus: Molli vero, quancumque tactum fugiat, magnus
esse poterit. Ad horum dignotionem, opus est medio tactu, atque etiam comprimente.
Nam medio statim durities, aut mollities deprehenditur, comprimente vero à vehemē-
tiam distinguitur. Et hæc de vehemēti, ac languido, duro, ac molli dicta sufficiant. Quod
enim quidam existimant, eelerem quoque, & alium, ac magnum, cum vehemēti, in tactus
euer-
tione conuenire falsissimum Gale. ostendit, & de puls. dignos. i. ubi docet, nec eelerem
absque

*Durus pul-
sus nunquam
est magnus.*

*Molli ta-
cto durum
molli pul-
sus deprehen-
ditur.*

A absque magno, nec magnam vel altum absq; vehementi, tactum nostrum enertere possit. Satis itaque est vehementem à duro, vibrato, ac consensu suo distinguere.

CAPVT XVIII.

De vacui ac pleni pulsus dignotione.

M Vltis profecto verbis contendit Gal. 4. de puls. dignot. contra Archigenem, & Agathinum, nullum esse plenum, vel vacuum pulsum, à magno, vehemente, vel duro differentem, idcirco nullam illius esse à iam propositis, separatam dignotionem. Nos vero, qui plenum ac vacuum pulsum dari posse docuimus, ab hisce tribus differentiis seuuntum, dignotionis modos proponere tētabimur. Mitto autem hæc in parte Paul. & Auic, qui seuunt atque inepte hunc dignotionis modum explicasse mihi visi sunt; sed quid ego ipse sentiam, libenter aperiam.

Est ergo plenus pulsus, cuius tensa sunt arteria tunica, ob caritatis plenitudinem. Vacuus, cuius laxa. Huius ergo tensionis ac laxitatis tantum, dignotionem quaerimus, non corporis contenti, siue sanguis, an quid tale, vt existimant illi, qui plenum ac vacuum reilectunt pulsum. Differt hæc à magno & paruo, sicuti res facta à siere, & res, quæ est in termino motus, ab ea, quæ mouetur. Plenus enim pulsus habet tensionem factam, magnus habet fientem. Similiter vacuus pulsus habet laxitatem factam, paruus autem fientem. Idcirco poterit esse pulsus plenus, & paruus, & vacuus, ac magnus. Cum enim plenus sit ex materia arteriæ infusa, & paruus, ex vsu imminuto, facultate debili, & dura arteriarum tunica; nihil prohibet, vas posse esse plenum, & tamen facultatem, non validam, vel saltem visum non autum, aut arteriam esse duriores; vt pulsus proinde sit paruus, & tamen plenus. Hoc sæpe in plenitudine quo ad vasa contingit, in qua, vt notauit Hipp. & Gal. 4. acut. quædoque fiunt arteriarum interceptiones. At si arteriarum interceptiones, ergo & quandoque asphixiæ, ne dicam pulsus paruus tantum erit ergo arteria plena, pulsus tamen, aut paruus, aut nullus.

Contra vero cum vacuum sit, ex materia defectu, poterit quandoque in hac vacuitate vsus augeri, facultate non inualida existente, arteriaque molli, vt in exhausto animæ spiritu contingit, in quo nemo est qui nesciat Galen, voluisse pulsum fieri magnum, eum tamen fieri non posse, vt spiritus exhausto plene sint arteriæ. Quod si sunt vacui, & tamē magnus euadit pulsus, constat apertissime, alium esse vacuum pulsum à paruo. Cum ergo aliud sit, tunica ob corpus multum infusum, esse tensas, aliud vero extendi, & aliud esse laxas, aliud laxari. (Illud enim rem factam, hoc fientem arguit: illud quietem, hoc motum: illud corpus sua mole extendens, hoc facultatem sua vi distendentē) ideo aliud quodque erit plenum & vacuum, aliud magnam & paruam. Ex his constat, quomodo etiam plenus à vehemente & duro, vacuus à languido & molli differant. Nam plenus idum non habet, quia neque motum, ergo vehemens dici non potest; habet quidem duritiæ speciem, sed ab ea longe diuersam, quæ ad arteriæ membranam spectat. Durities enim ex arteriæ tunica, à digitis pressa, minime cedit; imo in digitos imprimit, & euertit. Hæc vero durities ex plenitudine à digitis premitur & euertitur.

E Ex dictis ergo constat, ad pleni & vacui pulsus dignotionem, & mente & tactu opus esse.

Mente quidem, vt primo totius corporis habitum intueamur, consideremusque ex tumore, rubore, calore, venarum inflatione, plenas esse posse arterias. In habitu autem omnino contrario, vacuas.

His sic præcognitis, manum arteriæ applicantes, considerabimus primum, sit ne à cæto ac cutis solida, ac densa, an rugosa & flaccida: tum eomprimentes cogitabimus, an nobis occurrat arteria, secundum orbem totamque circumferentiam, conspicua, ac tensa, quæ tamen hæc manum euertat, neque digitos nostros eleuet, neque in contradictione multum decidere faciat, imo vero potius, in eodem magnitudinis statu, etiam contradictionis tempore persistat: Hanc ergo sic se habentem, quæ eompressa aliqua nitulum cedat, non autem omnino resistat, plenam vocabimus, plenumque pariter eius pulsum.

Quod si prorsus opposito se habeat modo, vacuum dicemus; si denique medio modo, medietatum,

Gal. ut ad
magnitudinem
vel vacuum
possum.
Cap. 1. lib. 4.

Quid plenum
ac vacuum
pulsus.

vide n. 2. lib. 1.

Plenus pul-
sus caros li-
ber.

Ad pleni, &
vacui pul-
sus dignotionem
non & 1. a.
lib. 4. notat
opus est.

Quæ obfer-
uandum ad
plenum & va-
cium pul-
sum.

*Rythmus ta-
lis non di-
gnoscitur.*

Rythmorum dignotio, quanquam ad præfagium maxime conducatur, omnium minime tactu comparari posse videtur. Siue proportionem requiras, inter quantitatem temporis & distentionis, cum tempore contractionis, vt Herophilus placuit, siue inter quantitatem motus diafoles, cum motu systoles, vt Galeno.

*Cur talium
sygula ryth-
mi.*

Etenim cum nec tota distentio innotescat, nec vlla contractionis pars, profecto ignota parte, & temporis quantitate, & motus qualitatem ignorari oportet. Quomodo igitur poterit collatio fieri temporis distentionis, cum tempore contractionis, vel distentionis, & quietis externæ, cum contractione, & quiete interna, aut quietis vnus cum altera? Scio quid hac in parte alii ad Galen. mentem in medium adducant: Non sentiri quidem omnes contractionis partes, nec tamē omnes esse ignoras: imo vero in pulsibus vehementibus, priorem tactui satis esse conspicuam, præcipue si tactus comprimens adhibeatur. Contractionis vero parte manifesta existente, celeritatem quoque ac tarditatem in ea fore conspicuam, cetero sibi persuadent. Habita vero celeritatis aut tarditatis notitia in vnica systoles parte afferunt, haberi quoque posse intora, non quidem sensu, sed ratione: quia scilicet talis sit celeritas, vel tarditas in toto motu, qualis est in parte percepta.

*Quædā
pate de
motuum di-
gnotione.*

Hoc igitur sicstante rythmum facile comparari posse asserunt, dum comparemus celeritatem vel tarditatem totius diafoles, cum celeritate vel tarditate totius systoles, quæ qualisnam sit, partim sensu, partim ratione colligitur. Hæc sunt, quæ pro rythmorum dignotione ex Gal. proferuntur: quæ tamen mea sententia non sunt recipiendæ. Primum enim dato, non tamen concessio, systoles partem sentiri, cum in folis vehementibus conspicua sit, in vehementibus tantum patebunt rythmi. At vero si hoc concesserimus, nullius fere vitæ erit dignotio rythmotum: Maxima autem est, ergo falsum, quod in folis vehementibus haberi possit.

Secundo, addo neque in vehementibus rythmos comparari posse: Nunquam enim systoles celeritatis perinde erit sensui euidentis, atque in diafole: ergo non potest vnus cum altera fieri certa comparatio.

Tertio hæc regula locum habet tantum in æquali systoles celeritate, non autem in inæquali. Etenim quando inæqualis sit celeritas, potest principium esse celeris, finis tardus, vel e contra. Quid ergo dicendum? Profecto cum systole lateat, proportio fieri debet celeritatis distentionis, ad totius interualli longitudinem vel breuitatem.

*Latente sy-
stole debet
fieri disten-
sionis adio-
temen ad
proportionem.
Quia si sit
proportio dis-
tensionis ad
interuallū.*

Sed neque hoc difficultate caret: nam petet quispiam à nobis, qualisnam futura sit hæc nostra proportio distentionis ad interuallum, vtrum celeritatis ad celeritatem, vt voluit Galen. an spatii ad spatium, vt Herophilus? Neutra enim locum habere posse videtur. Non celeritatis ad celeritatem, quia si non patet contractionis motus, ergo neque celeritas: Neque spatii ad spatium: quia distentionis tempus semper erit multo breuius, quam tempus interualli. Etenim interuallum constat ex contractione, ex duplici quiete, & ex parte distentionis ignota, ergo multo longius erit, ex consequenti tardiorcm semper demonstrabit contractionem, tempore, quo arteria distenditur, cum tamen non ratio contingat, vt quandoq; sit celerior diafole. Quomodo ergo potest inueniri ac dignosci rythmus, ex collatione distentionis cum interuallo.

Hæc sunt hæc in re dubia, quibus tamen non obstantibus, censemus nullam esse meliorum rythmorum dignoscendorum rationem, quam hanc, quæ ex collatione distentionis cum in cruallo desumitur.

Ad quæ situm vero, vtrum conferamus celeritatem cum celeritate, an spatium cum spatio? Dico nos cum Gal. comparare celeritatem cum celeritate. Ad instantiam cum dicunt, systole non esse cognitam, ergo nec celeritatem. Fateor, systolen ac celeritatem tactui esse ignotas; sed mente saltem celeritatem innotescere puto, ex hac vero quam mens præbuit notitia, satis superque rythmorum dignosci proportionem.

*Celeritatem
ac systolen
posse mente
deprehendi.*

Mente autem celeritas ac tarditas contractionis duobus comparatur modis, vno ex frequentia & raritate: altero ex causis, quæ contractionis celeritatem vel tarditatem efficere consueverunt.

Frequentia quidem ac raritate: Etenim frequens pulsus habet celerem contractionem: rarus autem tardam. Cum enim in celeri contractione fiat velox transitus ab vna in a-

A In aliam superficiem ex consequenti, breuissimo interposito temporis spatio, noua reuertitur diastole. Hoc sane fieri non potest, quin etiam accedat frequentia: sicuti, dum ægre se expedit contractio, diuque moratur, tarditatem accedere oportet. Ergo frequentia celeritatis, raritas tarditatis systoles sunt argumentum.

Quia vero frequentia ob duplicem sit causam, vel ex protensa diastole, vel ex celeritate systoles, vt frequentia sit certum celeritatis systoles signum, vnam ab altera distinguere oportet, id ipsum vero in ratione faciendum, quæ aliquando ex abbreviata diastole, quandoque ex tarditate systoles contingere potest. Frequentia ergo ex protracta diastole in vehementibus, quos comprimendo tangimus, erit cognitu facillima. Cum enim vehementium diastole fere tota sentiat in tactu comprimentes, nemo est, qui vniuersam illam sentiens, non cognoscat, vtrum sit longa vel brevis: Cum autem illam longam esse videris, non propterea frequentiam statim ad vnicam hanc protractionem referre debet: sed attente meditari, qualis quantæ sit hæc frequentia: si enim fuerit insignis, non erit abs re suspicari, duplicem esse frequentia causam, systoles scilicet celeritatem, & diastoles longitudinem: si vero non fuerit insignis, tunc soli longitudini frequentiam concedet.

*Duplici sy-
stole: aut
ja.*

At vero in non vehementibus, tactuque suspensio vel medio, res euadit difficilior, quod scilicet dum aliquæ distentionis partes latent, tota eiusdem longitudo haberi non possit: Qua tamen ratione (in pulsibus talem non languidis) tam priores, quam postremas motus partes, pro vario tangendi modo ac tempore nobis comparare possimus, hæcenus docuimus, ad quem locum remitto lectorem, ne idem sæpius repetam. Cum ergo

C hæc ratione diastoles longitudo, ex consequenti, frequentia ex ea oriunda comparari possit, nemo est, qui statim modum non consequatur, quo raritatem ex abbreviata distentione ab ea, quæ sit propter systoles tarditatem distinguere possit. Etenim cum brevis fuerit distentio vehemens, in modo tangendi comprimente, nec rari, ac sit effatu digna, raritatem breuitati diastoles tribuimus. Quod si diastoles sit longa, aut raritas insignis, causam vel tarditati systoles tantum, vel vtrique motui dabimus. Hic ergo est vnus modus, quo tarditas vel celeritas systoles mente dignoscitur, ex frequentia videlicet, ac ratione desumptus: Hæc ratio, quæ frequentiam, ac raritatem ex ipsa met systole factâ, ab ea distinguamus, quam parit diastole. Nunc itaque ad alium transcamus modum dignoscendi celeritatem, ac tarditatem systoles, quem diximus ex causis ac morbis illis comparari posse, in quibus

*Alia mor-
do, quo ce-
leritas, ac
tarditas sy-
stole depen-
dent.*

D cum fuligo mirifice augeatur aut minuat, contractio consequenter, vel celer, vel tarda esse consuevit.

Celeritas itaque primum dignoscetur ex calida humida temperie, habitu pingui, accarnoso, otio, erapula, excrementorum retentione, febre putrida, vel continente, vel periodica circa accessionum initia, & incrementa. Tarditas vero ex causis & affectionibus oppositis. Hæc igitur sic perspecta, rhythmum notitiam nobis comparabimus, & hoc & priore modo.

Hoc quidem, si pariter consideremus causas, propter quas celer aut tarda sit distentio, de quibus suo loco.

Tunc enim si cognouerimus causas, quæ fuliginem augent, superate causas calidificas, celeriores dicemus esse systolen diastole. Si vero superet calor fuliginem, diastolen affirmabimus celeriores systole. Priore vero à frequentia & raritate desumpto, hac ratione: Etenim si frequentissimus sit pulsus & diastole tarda, aut non velox, contractionem diastole celeriores esse coniectabimur: si vero fuerit rarus, & diastole velox, vel certe non tarda, diastolen systole celeriores affirmabimus. Cum vero nec diastole sit admodum celer, nec frequentia, aut raritas excedens, æqualem putabimus esse vtriusque motus celeritatem. Et hæc de illarum differentiarum cognitione dicta sufficiant, quas simplices atque præcipuas non computamus. De reliquis enim mihi institutum est verba facere in sequenti parte, quæ de causis acque de præsignio pertractat, postea quam Galenum id ipsum fecisse videam. Ad causas ergo transcamus.

CAPVT II.

De Facultatis Pulsibus.

Pulsifica facultas, siue sit naturalis calor, siue contentio, siue temperamenti proprietates, siue vniuersa cordis structura, siue spiritus tantum, siue etiam sit qualitas de secunda specie, quæ his, vel pluribus, vel omnibus vtatur instrumentis, ad functionem relata, quandoq; optime, quandoq; autem deterius agit. Atq; si bene quidem operatur, valida; si perperam imbecillis, vel languida dicitur: Quatenus ergo bene vel male operatur, quosdam facit pulsus proprios, alios communes, quos & familiares vocant. Nunc de propriis, ac familiaribus validæ facultatis peragemus, mox ad reliquos, qui ad languidam facultatem spectant descendentes.

Proprii ergo validæ facultatis sunt duo illi vehementes, *in parte de puls. diff. descripti*: Moderatus videlicet, & immoderatus. Vtriusque causas tunc obiter perstrinximus, atque etiam nunc repetemus. Moderati causæ sunt optima cordis temperies, in habitu, ac statu corporis moderato, à nullisq; non naturalibus, vel præternaturalibus causis agitato, aut impulsu, Vere positissimum medio, in quo, si veteres aliquando vehementissimos pulsus fieri dixerunt, illos tunc, non ad alias causas vehementiam augentes, sed ad illa anni tempora compararunt. Sunt autem aliz causæ, calidior viscera in temperies, in habitu gracili ætate admodum iuuenili, quandoq; cibis, porus, medicamenta, moderatus somnus, ira, vel alius vehemens corporis, aut animi morus, mitior, & salubrior febris Ephemera, vel tertiana intermittens, atq; benigna. Ex his ergo causis, pulsus primo ac per se fiet vehemens qui proprius dicitur, secundo autem magnus, ac celer, qui familiares sunt. Etenim cum valeat facultas, à non modo validum facit ictum, sed & maturum, & celeriter arteriam distendit. Et de pulsibus validæ facultatis, atq; causarum omnium mediarum hæc tenus, Nunc de eis agendum, qui ad languidam spectant facultatem.

CAPVT III.

De languidorum pulsuum causis, in Genere.

Languida facultas, vt & robusta, quosdam habet pulsus proprios, reliquos autem familiares: Et proprii quidem sunt omnes languidi, qui sane in specie sunt plurimi: Familiares vero sunt parui, ac tardi: crebritas autem tunc tantum accedit, cum vltus quoq; fuerit audius, sicuti raritas, cum fuerit imminutus.

Inter languidos ergo facultatis proprios, Innominati primum sunt reponendi: Aboliti scilicet, simpliciter languidi, mox autem Nominati, nempe Myuri, tam in vno, quam in pluribus ictibus, Vermiculosi, ac Formicantes, Eminuli præterea vel prominuli, Interrmittentes, deniq; & Interrupti in vnico ictu.

Non vereor plerosque futuros, qui dicent, Myuros ad vsum potius imminutum, quam ad facultatem spectare, quod in æquales sint paruitate: Interruptos autem atque interceptos ad instrumenta pertinere, reliquos vero, ad compositos potius, quam ad simplices causas, ideoq; non in vnicam facultatem referendos esse.

Quibus omnibus respondeo, Myros duplicem in se continere differentiam, languoris vnam, paruitatis alteram. Languoris differentia solius imbecillæ facultatis est propria, paruitas vero familiaris quidem est, sed adhuc dupliciter consideratur, vel vt prouenit ex debili facultate, vel vt ex Vsu imminuto: primo modo spectat ad solam facultatem, secundo modo ad vsum, vel solum, vel eum facultate debili conuersum.

Quando ergo dicimus Myros ad solam languidam pertinere facultatem, tunc illos consideramus, vt languidos, vel si illos quoque contemplerur ut paruos, tunc paruitatem consideramus ex imbecillitate emergentem, non autem ex imminuto vsum.

Non inferior quidem, ex vsum quoque imminuto vel solo, vel cum languida facultate pulsuum hunc fieri, sed de hoc suo loco. Idem vero de interruptis, atq; interceptis dictum volo, in quibus cum adsit languor ac paruitas: languor est effectus solius facultatis imbecillæ; paruitas, & huius, & Instrumenti compressi. Nunc consideratur paruitas, quatenus ex imbecillia provenit facultate. Suo loco, & tempore considerabitur in relatione ad instrumenta.

Addo, instrumentorum vitia, vt suo demonstrabimus loco, non esse languoris, aut paruitatis pulsuum immediatas, seu vt dicunt, contentiuas causas, imo vero mediatas, seu

*Facultatis
hæc quæ
causæ pul-
sum.*

*Proprii
hæc
facultatis
pulsus.
Causa pul-
sum moder-
ti.*

*Familiares
videlicet
facultatis pul-
sum.*

*Proprii lan-
guidi sunt
parui pulsus,
Formicantes,
Eminuli
pulsus præterea
languidi fac-
ultatis spec-
tantes.*

Obiectum.

*Solutio.
Myros sunt
dupliciter dif-
ferentia.
Paruitas ex
Myros de-
bilitate
facultatis.*

*Instrumenta
etiam vicia
sunt, sunt pro-
pria imbecil-
litatis, aut
paruitatis cau-
sæ.*

remo-

*De facul-
tate est lan-
guoris causa
proxima.
Cuius languor
est facul-
tas.*

remotaque: Etenim hæc primo, ac per se facultatem grauât, ipsa vero grauata, pulsus hoc^A vel illo modo languidos efficit atque languoris causa iure tribuitur facultati tantum, nõ instrumento, quia nunc non est sermo, de mediatis, sed de immediatis tantum causis.

His ergo sic præmonitis, videamus quomodo singuli isti pulsus, sane ad modum varii, ad languidam refertantur facultatem. Languet ergo facultas, vel exoluta, vel oppressa, ac quasi suffocata, vel vtroque modo affecta.

Primo modo facit pulsus innominatos, omnium languidissimos atque abolitos, deinde veto & ex nominatis Decurtatos, Vermiculosos, formicantes, eminulos, prominulos, ac quandoque intermittentes in acervo.

*Quæ exi-
ta suffocata
facul-
tas.*

Suffocata vero eisdem parit intermittentes in acervo, præterea Disparis, Inter-^Bptos, atque alios quosdam decurtatos: de quibus omnibus singulatim agendum, & primo de iis, qui languidam, mox & de iis, qui suffocata, vel vtroque modo lafam sequuntur facultatem.

CAPVT IV.

De languida facultate pulsibus ob exolutionem.

Pulsus abolitos, atque summe languidos innominatos ad exolutam spectare facultatē, vsque adeo manifestum est, vt nulla egeat probatione. De vermiculosis, formicantibus, myoribus quibusdam, eminulis ac prominulis, atque nonnullis interceptis, res magis est dubia: Confirmabitur tamen ex variis Galen. locis. Et primum quidem ad Vermiculosos, & Formicantes quod attinet, libro de puls. ad Tyron. hæc scribit cap. 11. Ergo cum dissoluta à penuria facultatis sit, sunt pulsus primo languidi, parui, celeres, atque crebri: in medio languidi, parui, tardi, rarique, tandem extreme parui, languidi, & crebri, præbentque falsam celeritatis speciem. Hic ille est, qui vocatur Formicans. Vermiculans autem fit ille quidem satisfecisse etiamnum facultate, sed nonnihil tamen renitente adibus; disceditque hæc à formicante, quod non ita in extremam contractus est remissionem & paruitatem, & quod aperte in vno istu in aquali est, partibus vel citius, vel tardius moueri incipientibus, quamobrem minus tardus est, quam parui, nonnunquam nequaquam tardus, quo circa minime parui est. De Myuris vero in acervo 2. de puls. caus. 3. hæc habet: Quæ vero est hæc tanto maior, ut iam facultati sint oneri applicati digiti, hæc pulsuum Decurtatorum est auctor. Dixerat primo de Myuris, qui ex facultate sunt tam grauata, quam exoluta, mox de illis, qui ad exolutam tantum spectant, ea subiunxit, quæ iam adduximus verba. Quod autem secundo^D de puls. caus. 3. docuerat de Myuro in acervo, idipsum de eodem in vnico istu docet, 2. de praesag. ex puls. 10. sic dicens: Quod si eleuato in primo digito, postea matum percipias, quam ante, & alidorem atque maiorem, declarat ille quidem etiamnum facultatis arteria debilitatem, sed minorem certe, quam ille, quem prius diximus, quod ille facultas exolueretur, discedens à principio: hoc maneat, quantum in ipsa est, par, sed grauata ab inuicelū digiti imbecillius moueatur arteria. Constat itaque, ex his Myuros illos, qui nec digiti quidem pressum sustinent, sed sub eorum onere statim graciles sunt ac desinunt, solam insequi exolutam, non autem grauatam facultatem. Idcirco quamuis Galen. 2. de praesag. ex puls. 10. dixerit, hosce Myuros pulsus, non modo imbecillitatem, sed & gracilitatem consequi, non propterea censendum est, illum duas continuas proposuisse causas; Gracilitas enim non inter continentes refertur, sed vna est ex mediatis, quas plures esse concedimus; immediatam vero vnicam esse affirmamus, Facultatis scilicet imbecillitatem. Quod adhuc magis confirmat Galen. loco citato, cum inquit, ideo fieri Decurtatos in vnico istu ex languida facultate, quod tanto efficiatur pulsus imbecillior, quantum à corde arteria fuerit remotior; facultatem enim, dum influit, paulatim remittit, neque ad extremum vsque arteriæ peruenire posse, vt 2. de puls. caus. 9. his verbis confirmat: Sed quia satis est dictum de his, de decurtatis iam agamus, quæ facultatis consequuntur imbecillitatem, à qua pulsus creantur: cum enim à corde perueniens in singulas arterias, contentio magis ac magis in partibus remotioribus dissoluitur, minores tum languidioresque necessario earum sunt motus.

*Myuris sit
insequi ut
exoluta fa-
cultatem,
Gracilitas
non est imme-
diata My-
uris causa.*

De Eminulis porro atque prominulis idem erit iudicium. Cum enim prominuli, vel eminuli sint illi, qui vnico sentiuntur digito, sub aliis autem minime, hos plane constat quandoque ex eorum Decurtatorum genere esse posse, quos propter breuitatem & imbecillitatem vnicus percipit digitus, vt ex illo 2. de puls. caus. 10. aperte colligitur: Etenim cum Galen. eo loci docuisset, decurtatorum causam esse facultatis imbecillitatem: de eminulis, ac prominulis, hæc statim subnequit: Igitur naturam inuentum pulsuum simili ratione

commen-

A commentabimur, possint forſitan pari modo, ac ſimili aliquando fieri, &c.

Ad Intermittentes ergo pergamus, quos Gal. ex diſſoluta facultate prodire aperte docet, ſecundo de pulſ. cauſ. 3. his verbis: Porro non ſolum facultatis infirmitas intermittentem inducit pulſum, &c. Quod autem in hoc loco ſine aliqua probatione protulit, 2. de praſag. ex pulſ. 4. iterum repetit, firmamque munivit ratione: Ibi enim oſtendit rariffimos pulſus frigidiſſimam aliquando ſequi cordis intemperiem, eſſeque admodum lethales, propterea quosdam eum his pulſibus inter dormiendum interire: Addit deinceps intermittentem fieri, ex producta raritate, conſequenter ex aucta refrigeratione, vno verbo, ex emoriēte facultate ob frigidam intemperiem. Sic enim ſcribit: Ac raritas quidem pulſuum, tantam habet perniciem: at intermittens multo maiorem, ſiquidem hi generantur, producta raritate: ac, cum

Intermittit-
tes pulſus em-
mendaſe
runt.

B procurantur, reuertuntur per raritatem, ad priſtinam mediocritatem. Et haecenus de languidis pulſibus, ob facultatem exolitam.

CAPVT V.

De pulſibus facultatis aggrauata.

Grauaſa facultas quosdam habet pulſus proprios, quemadmodum & exolita. Sunt vero Diſpares vehementia & imbecillitate, tam in vno, quam in pluribus iſtibus: Interrumpi pariter, atque Intercepti nonnulli, quandoque emnuli, & prominuli. Hos omnes ad grauatam ſpectare facultatem, nunt ex Galen. verbis confirmabimus.

Proprii gra-
uataſa
facultatis
pulſus.

C Primum autem, quod ad Diſpares ſpectat, atque interruptos, in vno iſtu, enim in his vehementiae, atque imbecillitatis diſparitas attenditur, in aliam non poteſt referri cauſam, quam in grauatam facultatem, ſed quia ad imbecillitatem ſequitur tarditas, ſicuti ad robur celeritas, idcirco Gal. de his verba faciens, celeritatem ac tarditatem accipit, tanquam validae aut debilis facultatis ſignum, & ex his grauatae facultatis argumenta deſumit. Hoc autem facit Gal. 2. de pulſ. cauſ. 4. ac 3. ubi inquit, diſparitatis cauſam in vno iſtu eſſe grauatam facultatem, propter quam diſtentionem non poteſt eandem habere in principio ac ſine celeritatem, ſed aliam atque aliam pro facultatis robore, & cauſae grauantis magnitudine: imo vero, neque motum retinere integrum, ſed quandoque interruptum in medio. Si enim valeat facultas, pondusque non ſit admodum graue, diſparem tantum fieri pulſum, eum non admodum valet facultas, & pondus maximum ſit, interrupti in medio diſtentionem.

Quidam
pulſus diſ-
par.

Hae cum ita ſint, nedum celeritatis ac tarditatis, ſed vehementiae atque imbecillitatis apertiſſimam docent inaequalitatem.

Etenim ſi in medio interruptum motus, non tantum ſit tardus ſed & languens: ſicuti qui minus eſt celer, eſt quoque minus vehemens, alia tamen, atque alia ratione: quae expoſita, cuiuſcunque diſparis, & interrupti cauſae erunt conſpicuae.

Cum ergo varia admodum ſit haec vnius iſtus diſparitas, atque interruptio, dum aliquando diſtaſtoles principium eſt ſine celeritate, modo ſinis principio, idque pluribus modis, quos alias expoſuimus, id ſane non ob aliam contingit cauſam, quam quod validae facultatis, vel debilis, ac cauſae ipſam grauantis, maxima ſit latitudo, vari ſint gradus.

E Cum enim valida ſit facultas, ſed valde onerata, pulſum edit Caprizantem vocat, cuius poſtrema motus pars, prior eſt validior: vt verba Galen. ſonant 2. de pulſ. cauſ. 7. quae ſic habent: Verum ubi retineat facultas, quantum illa quidem praestare poſſet conſeſſionem naturam, arceatur autem a motu, vel ob immodicam humorum copiam, vel ob oppilationem, vel compressionem instrumentorum, quies tunc diſtentionem interpellat, tunc itaque altera eius pars, ſc. eundem quietem robuſtior illa, quae eam antecedit, videtur. Siquidem ubi ſeſſe facultas, quae prius fuit valida, colligit, vbi ita dicam, & confirmans, viresque reparant, immineſt grauius, & ut ſuperet, reſiſtatque, quae moleſta ſunt, conſentis, ad quod frequenter facit.

Quidam
pulſus cap-
rizans.

Quod autem de Caprizante dictum eſt, idem de omni alio diſpari intelligendum, cuius vehementior ac celerior fuerit ſinis diſtentionis principio: hic enim robuſtorem

F oſtendit facultatem, quae ille, cuius ſinis fuerit imbecillior, aut tardior principio. Omnes tamen oneratam declarare, quae aduerſus noxiam cauſam eertet, Galen. monet 2. de praſag. ex pulſ. 6. his verbis: Hi enim pulſus generantur, cum ſimul & certas naturae, & inſpeditur ab inſalubribus cauſis. At vero ſi diſpares interruptique in vno iſtu, ad oneratam ſpectant facultatem: multo equidem magis ad eandem pertinebunt intercepti in aeterno, de quibus Gal. 2. de pulſ. cauſ. 3. ſic ſcribit: Quinimo hi addatur, Intermittentiū, qui praecedit deſicientium ſta-

Diſpares in
ecepti &
interrupti
pulſum ad
grauatam
facultatem
ſpectant ſa-

tum: quod enim in viue aut al. ero erat, aut certe in pulsum numero certo. *Id est uti dicitur in a. A*
 omnibus efficitur. *Id est uti dicitur in a. A*
 manifestum est etiam ipsorum intermittentium differentia sunt. graui enim facultas
 e. q. offensa, ubi plures, leuius, ubi pauciores deficiunt motus. Et a. de prasag. expulsi. 4. hanc habet
 legiur de inaequalibus pulsi. ubi in communis omnibus sciendum est, quod in 2. lib. de pulsi. caus. ostendimus
 ex oppilationibus eor. aut ex compressionibus instrumentorum, aut humorum abundantia, ad
 facultatem quidem collata. Et vt tandem hanc parrem finiam, ex 4. de prasag. cap. vli. apert. si-
 me patet, n. illum esse inaequalem pulsum, languore, atq; debilitate, qui non ex graua-
 tus, nunc vehemens facultas quidem per se imbecilla non est, sed humorum abundantia degrauiatur.
 Saltem autem nec in toto corpore hanc inaequalitatem, nec vna in parte inueniuntur, sed alia si-
 mul tria genera immutari. ferique inaequalia, tria genera inquam magnitudinis, & paruitatis, cele-
 ritatis & tarditatis, crebritatis & raritatis. Etenim magni, parui, medi, celeres, tardi, medi: cre-
 britari, medi: non aliter, ac languidi, vehementes, medi facultatibus accidunt, quia ab humorum co-
 pia grauantur. Ac si pulsi vehementes, & magni, numeri contrarios vincant, minimi facultas offi-
 diuntur a copia: si parui, & languidi, magis. Et inaequales item in vno actu, sum quos interpellato quie-
 te, motu, tum quos perpetuo manente, & vicinus fieri. bi omnes si fines motuum validiores, & celeriores
 efficiant, nunciant facultatem esse robustiorem amnibus, qui languidiorem & tardiorem efficiant.
 Hoc ipsum paucis vel bis expressit Gal. libro de pulsi. ad Tyron. 11. his verbis: Depressa, ac quasi
 degramata veritas in inaequalitatem pulsi. & in ordinem perturbatum, cum amnem alium sum vero
 vehementia & magnitudine. Ha. siquidem in primis inaequalitates propria sunt facultati pressa, ac
 gramata insigniter, in pluribus differentiis: parum, in paucis. Etiam pulsi plures parui magni sunt,
 & languidi vehementes, cum pusilla sit offensa, contra si magna.

CAPVT VI.

De quodam dubio & eius solutione.

Postulat hic locus, vt longiore oratione illud dissoluamus dubium, cuius antea facta
 est mentio.

Erat dubitatio, quomodo pulsi ex grauante causa prodeuntes, facultati tribuan-
 tur, cum grauantis causae, aut obstruant aut comprimant, aut constringant, vno verbo,
 instrumentorum affectiones efficiant, vt pulsi isti, aut ad instrumenta tantum, aut ad fa-
 cultatem, & instrumenta simul sine referendi.

Primo solu-
tio.

Dictum est haecenus pro solutione id, quod nunc quoque repetimus, grauantem
 hanc causam non esse immediatam, sed mediatam, tam languidorum aequalium, quam
 inaequalium: Etenim si esset immediata, sequeretur pulsum proprium euadere commu-
 nem vel familiarem: Cum enim vehemens & languidus pulsi, siue aequalis, siue inaequa-
 lis, proprius sit facultatis, profecto si ex instrumentis laesa primo, ac per se fieret, non am-
 plius proprius, sed familiaris esset. Fit ergo ex instrumento, tanquam ex causa remota, ac
 mediata: Ex facultate autem, tanquam ex proxima, contentiua & immediata.

Confirmatur, quia pulsi instrumenti proprii, sunt duri ac molles, non validi, aut
 vehementes.

Secunda so-
lutio.
Corde sub-
iacente non
est pulsi in-
strumentum

Addo, tunc proprie grauari facultatem, cum cordis substantia fuerit afficta. At ve-
 ro cordis substantia non est instrumentum pulsi, sed facultatis subiectum, vt docuit Gal.

Præterea dico, arterias quoque posse dupliciter considerari, vel vt habent in se prin-
 cipium, seu facultatem mouentem, vel vt habent ea, quæ consequuntur temperiem, &
 quæ necessario accidunt.

Primo modo causæ grauantis dicuntur ad facultatem spectare: Secundo ad instru-
 menta duriora, vel molliora reddita, vel quouis alio modo perperam constituta. In præ-
 sentia grauitatem consideramus, prout mouentem premit facultatem, siue in corde tan-
 tum, siue in arteriis tantum, siue vtrobique: non autem versamur in causis duritiei, vel mol-
 litiei, aut prae conformationis, quæ omnes ad instrumenta pertinent.

Cum ergo inaequalitas, de qua loquimur, sit facultatis propria, & causæ grauans con-
 sideretur ad facultatem relata, non ad instrumenta: Cum præterea grauitas hæc ad facul-
 tatem relata, non sit causa immediata, sed mediata; sequitur omnes pulsi inaequales, læ-
 giore atque vehementia, ad vnicam spectare facultatem, tanquam causam proximam,
 & immediatam.

C A.

CAPVT VII.

De pulsibus facultati utroque modo affecta.

Cum facultas simul & grauata, & exoluta fuerit, quosdam pulsus parit, reipsa à propriis distinctos, nomine tamen eosdem. Sunt autem hi decurtati, tam in unico, quam in pluribus: Quorum enim triplex sit differentia: prima eorum, quos deficientes vocant, non reciprocis: Secunda, eorum, quos dicunt reciprocis: Tertia, eorum, quos deficientes simpliciter.

*Decurtati
nam paulli
magis as-
serimus.*

Primi ad exolutam spectant facultatem: Secundi & tertii, ad suffocata, non tamen eodem modo ac gradu, sed secundum magis ac minus. Etenim Myuri reciproci, minus o-

neratam ostendunt virtutem, quam non reciproci, ut loco citato docuit Gal.

Et quod dico de Myuris in accretio, idem de Decurtatis in vno ostendit intelligi volo. Horum quippe triplex quoque existit differentia, deficientium scilicet non reciprocorum, quos iam diximus ad exolutam spectare facultatem: Et reciprocorum tam deficientium, quam non deficientium, qui exolutas atque grauatas consequuntur vires. Hæc vero ex Galeno apertissime colliguntur. Nam 2. de puls. caus. 3. de Myuris in accretio, verba faciens, quos dicimus nos grauata simul, atque exolutam consequi facultatem, ita loquitur: Sed quia duplex est in his ipsis differentia (quidam enim illorum ad pristinum metum reuertuntur, quos decurtatos vocant reciprocis: aliqui illi alicubi permanent) priores scito minorem annuntiare imbecillitatem: adhuc enim resistit quodammodo facultas, & velut ipsam colligens, & sepe conuulsas,

Cita augeat pulsuum magnitudinem, augeat item contentionem. At qui permanent in extrema paruitate, nec omnino sese recipiunt. Languidiores, quam in his, ostendunt esse facultatem: Sic si prius deficient significabunt ultimam quandam imbecillitatem. Et 2. de praesag. ex puls. 10. de his decurtatis in vno ictu loquens, hæc scribit: Quod si in eleuato primo digito, postea motum percipias, quam antea, validiorem atque maiorem, declaras ille quidem etiam in vno facultatu arteria debilitatem, sed minorem certe, quam illi, quem prius discimus, quod illi facultas exolueretur, descendens à principio, hic maneat, quantum in ipsa est, par. sed grauata ab micellu digiti, gravior mouetur arteria, quod quidem minus habet periculi. Dantur ergo Myuri ex facultate valde exoluta: dantur alii ex eadem partim exoluta, partim oppressa, quorum omnium nunc est petenda dignotio, postea vero, & aliorum omnium, quos proposuimus: addita in super causarum, quas habentis enumerauimus distinctione.

*Myuri ex fa-
cultate exo-
luta, quod
eandem par-
tem exoluta
partim op-
pressa.*

CAPVT VIII.

De Abolitione atque omnium Myurorum pulsuum dignotione.

Languidotum pulsuum dignotionem, quam in hunc vsque distulimus locum, nunc perficimus.

*Quod de
abolitione pul-
suum digno-
scatur.*

Abolitus ergo pulsus facile dignoscitur, si neque ad motus digiti, neque ad motus, postea de integro applicatis, sentiat, neque in supino, neque in prono manus habitu: neque in vno, neque in alio brachio, neque in superna, id est, cubitum versus, neque in inferna, id est, manum versus, parte.

Et Myutorum vero dignoscendi modus, ex Gal. verbis, quæ paulo ante adduximus, magna ex parte colligitur. Etenim si de collectiuis metio fiat, modo digitos ad mouere, modo amouere, atque iterum appellare oportet, brachium potius pronum, quam supinum situando, ut digiti tangentes potius subter, quam supra artetiam sint. Hoc enim modo aetia minime à digitis grauata, si quem tetinet motum, facile digitis communicat.

*Modus di-
gnoscendi
Myuras.*

Ut vero tres illæ myutorum differentie innotescant, palando primum, mox leuiter comprimendo, atque iterum suspendendo, debet tactus iste fieri. Quando enim pulsus, quem palando sentimus, mox compressum, paulatim minui percipiamus, non tamen desinere, hunc simpliciter Myutum vocabimus.

F Quod si ex moderata et am compressione, motum protinus amittat, suspensus vero digitis recuperet, tunc Myurum esse dignoscemus deficientem reciprocum. Quando autem neque comprimendis, neque suspensis digitis ad priorem statum reueriatur, deficientis non reciprocus dicitur. Qui in hoc ab intermittede distinguitur, quod Myurus sensus ac paulatim, & eum quadam Arithmetica proportionem deficiat, idcirco in æqualis æqualiter vocatur: Intermitteus vero absque vlla Arithmetica proportionem transiit à magno in abolitum, ut iure in æqualis in æqualiter dicatur.

*Myurus de-
ficientis, ut
dignoscatur.*

In Myu.

In Myuris porro vnus istus dignoscendis ante omnia distinguere oportet, sitne ve-
re pulsus decurratur in vno actu, an talis potius videatur ex valida prioris digiti compres-
sione.

*Myurus
interueniens
aut si pul-
sus decur-
ritur.*

Vt ergo hæc habeatur distinctio, sic incedendum; Cum nobis arteriam quatuor di-
gitis tangentibus, imbecillior pulsus, sub postremis arteriæ partibus, quæ scilicet ad carpum
vergant, videatur, tunc eleuandus est prior digitus, & si sub secundo idem morus appa-
reat, qui antea, hic exolutam ostendit facultatem, estque Myurus simpliciter. Si vero ma-
ior, quam antea sit, tunc iudicato, eundem esse à digitis oppressum, proinde ad decurra-
tos non pertinere.

Myurum vero deficientem non reciprocum facile cognoscemus, & à reciproco dis-
tinguemus, si sub postremis digitis arteriam leuiter comprimentibus, statim euascat, B
suspensis vero non redeat: Deficientem denique reciprocum, suspensis digitis reuerti ob-
seruabimus.

CAPVT IX.

De aliorum omnium languidorum dignotione.

Minuli seu prominuli pulsus dignotio, ex ipsa pulsus descriptione facile constat: Cum
enim tribus à motis digitis, sub vnico percipitur pulsus, sub propinquis autem mi-
nime, eminulus erit. Hic quoque sicuti & reliqui omnes languidi, tangendi modum re-
quirunt, modo suspensum, modo aliquantulum compressum. Cum enim neque
suspensis, neque comprimentibus digitis sentiat pulsus sub extremis digitis, qui sunt v-
trinque, statim eminulus dici debet.

*Minuli di-
gnoscendi
modus.*

Idem de Vermiculoso dictum volo: cum enim à flexuoso vermium gressu, nomen
sumpserit, facile dignoscetur, si compressus euascat, non compressus autem, inæquali-
ter paruus, ac languidus fuerit, & vermium gressui similis.

In dignoscendo formicante maior subest difficultas, eo quod cum tardus appri-
me sit, celeritimum Archigenes existimauerit, ita enim scribit, referente Gal. 2. de puls. dignos. 1.
Conflare mihi ex paruitate, imbecillitate, crebritate, & vero necessario celeritate videtur.

*Celeris.
Quoniam
languidi
sunt idem
di.*

Ceterum cauendum est, ne pro crebritate & breuitate, celeritatem accipiamus; Nā,
quia minimus est, etiam breui transit, non tamen valet consequentia, breui transit, ergo
est celer. Hic itaque pulsus, vt & reliqui omnes languidi, prona ægrotantis manu est tan-
gendus, nostrique digiti subesse debent arteriæ, ne vas ipsum grauetur, vt antea monuimus.
Sic enim omnium languidorum differentie melius explorantur, præcæue vero, si quan-
doque digiti submoueantur, mox iterum applicentur.

*Intermit-
tentis.*

Hoc ergo prærito, si minimum, languidissimum, tardissimum, ac rarissimum sen-
tiamus, in nominatum relinqueamus.

Formicans.

Cum vero languidissimum ac frequentissimum inuenerimus, formicantem existi-
mabimus. Et hæc de eorum pulsum dignotione, quos facultatis magis proptios esse pu-
tamus. De interruptis autem, & disparibus, & intermittentibus, iterum in pulsibus Vfus,
aliqua nobis erunt dicenda, Nunc vero ad causarum distinctionem transibimus.

CAPVT X.

*De causa grauantis distinctione, ab ea qua facultatis exsolutionem
sequitur.*

Propositus est brevis quidam modus dignoscendi languidorum pulsum differenti-
as; proposita quinetiam fuit distinctio Myurorum ex languida facultate, ab illis, quos
suffocata & exoluta simul excitat. Nunc qua ratione relique pulsus differentie, quæ tam
ex dissoluta, quam ex suffocata oriuntur facultate inter se discernantur, atque quomodo
languens facultas ab oppressa distinguatur, differendum.

Dictum est itaque, tam ad exolutam, quam ad grauata facultatem intermittentes
in a tertio spectare, eminulos præterea, ac prominulos.

*Inter-
mittentes
ergo
languide
facultatis
hoc proprium
habent,
quod in om-
nibus
pulsibus
tardissimi
ac rarissimi
sint: qui
vero propter
suffocantes
causas inter-
mittunt,
celeres atque
frequentes
esse consue-
uerunt, aut
certe minime
rari, ac tardi.*

Intermittentes ergo languide facultatis, hoc proprium habent, quod in omnibus
pulsibus tardissimi ac rarissimi sint: qui vero propter suffocantes causas inter-
mittunt, celeres atque frequentes esse consueuerunt, aut certe minime rari, ac tardi. Quan-
quam enim, vt intermittunt, rari sint, attamen in reliquis pulsationibus, quæ non inter-
mittunt, celeritas, atque frequentia spectatur.

INVS.

A Inuuentes vero, atq; circumuuentes, ex imbecilli cognoscuntur facultate, si per omne morbi tempus ita fiant, si gracilis admodum, atq; ex carnis, siue marcida sit arteria, & motus ille, qui sentitur, compressus statim cedit.

Quod si in principiis tantum accessionum appareant, in attenua minime marcescent, & compressi non cedant, suffocantem consequuntur causam. Ceterum ex aliis quoque pulsibus iam propo- is, oppressa facultas à languida cognoscitur admodum distincta. Languens enim facultas non oppressa, nunquam pulsus profert inæquales, in vno ictu sub vnaque digito, siue dispares, siue interruptos, imo vtro omnes hi ad suffocitam spectant facultatem: Ratio autem est in promptu pulsus enim isti necessario magni sunt, quandoquidem si magni non sint, neque in duas secari partes, vt intercepti; neque in duo partiti possunt tempora, vt dispares; Magnum autem pulsum languida facultas prestare non potest, ergo nec disparem, nec interruptum.

Accedit quod dispares vnius ictus, non careat robore. Etenim si pugnat facultas contra morbosam causam, & post interceptionem atque in fine distentionis, plerumque validior est motus, ac celerior, quam in principio, igitur facultas hac morbo, vel morbosam causa fit superior. Quo fit, vt pulsus omnes in vno ictu, sub vnoque digito dispares, vel interrupti, inter quos sunt Caprizantes, quatenus vehementia, & imbecillitas inæquales, secundo autem magnitudine, ac celeritate, grauata ostendat facultatem, exortam vero minime. Sed de hac causatum distinctione, plura etiam infra dicemus, cum omnes mediatas causas tam exolutas, quam suffocatas facultatis proposuerimus.

C A P V T X I.

De mediatis causis, propter quas languet facultas.

Languida facultatis propter exolutionem vnica profectio non est mediata causa, sed multiplex: ob quam multiplicitem, non fit vnica languidorum differentia, sed varia. Nostrum ergo fuerit in presentia, mediatas hæc causas exolutæ facultatis referre, pulsus illis prodcentes proponere, atque modum, quo inter se distinguantur, breuiter subnectere.

Exoluitur ergo vitalis facultas, vel propter solida, vel propter spiritus, vel propter vtrumque.

D Propter solida, cum vel corrumpitur eorum substantia, vel intemperata redditur.

Corrumpitur defectu, putredine, vel veneno.

Defectus fit, vel in marasmo senili, vel febre marasmode.

Putredo ex prohibita transpiratione, aut ex ipso veneno, quod quidem vel inspiratur vel assumitur, vel insiligit, vel intro generatur.

Intemperies vel est simplex, vel composita: vel æqualis, vel inæqualis, cum materia, aut sine materia.

Quod de solida diximus substantiâ, idem spiritui conuenit: Nam vel corrumpitur, vel alteratur.

E Corrumpitur aut defectu, aut putredine, aut veneno.

Alteratur vel simpliciter, vel composita qualitate accedente. Hoc tantum distat, quod spirituum defectus possit subito accedere ac recedere, solidorum autem minime.

Cum ergo hæc, & tot sint: exolutæ facultatis causæ, tamen si variis signis inter se distinguantur, attamen ex ipsis pulsibus sic prudens quisque medicus illas sciunget. Nam si solidorum cordis substantia patitur, pulsus semper erunt languidi, hæc tibi (Hæcicos intelligo, vt antea exposui non paruos, duos, æquales, frequētes; sed stabiles, firmos, immutabilesque, siue sint æquales, siue inæquales. Contra vero, si ex spiritibus, vel humoribus languor accedat, inconstans erit, atque minime hæcicos ipse languens pulsus.

Cum vero triplex sit solidorum vitium, substantiæ defectus, venenum, atque intemperies: Marcor ipse siue defectus, cognoscetur ex pulsu potissimum innuente, ac circumnente, vt colligitur ex libro de puls. ad Tyron. & 4. de puls. caus. 10. Si quidem cum pulsus isti fiant, vbi partes arteriam ambiētes marcidæ existant, vt propterea qua parte illorum maxime marcida, atque idcirco leuissima, emicare motus possit, in aliis grauioribus non item, sequitur statim proprium marcoris pulsum esse Emululum; in febre quidem marasmode frequētem, in marasmo autem senili rarum; omnibus denique hæcicos.

Neque vero existimet quispiam, horum pulsuum causam esse compositam, eo quod non modo facultatis imbecillitatem, sed & instrumentorum affectionem conuequatur. Quenadmodum enim antea monui, hoc instrumentorum vitium, marcor scilicet, non est immediata huius pulsus causa, sed mediata, quatenus scilicet facultas melius, aut deterius, hac, vel illa arterie parte vititur: leuiore quidem melius, grauiore autem deterius. Itaque leuitas hæc atque grauitas non immediate pulsus mutat, sed mediante languida facultate.

Putredinis ac venenata qualitas signa. Putredo ac venenata qualitas in corde subsistens, illa habet signa quæ proponit Gal. 3. de *proph. ex puls. in fi.* pulsus scilicet non magnos, non frequentes, propterea quasi sanis similes, celeriores tamen: Inæqualis enim tunc est cordis status ad calidum vergens, propter putredinem, ad frigidum simul, propter venenum, quod innarum dissipat calorem.

Celeritas, breuitas, et perperitas. Fit ergo media quadam pulsus conditio, quæ sanitatem simulat. Ex celeritate ramen motus deprehenditur, quam Medici præstantissimi iute febris perpetuam censuerunt comitem, monente hoc ipsum Gal. loco citato.

Soliditas cordis in temperie, et in febre. Intemperies autem solidorum cordis pro sui varietate, varios quoque habet pulsus, omnes tamen languidos, hæc eosque: Frigida enim præter languorem habet paruos, tardos, raros, propterea intermittentes in ærui. Calida vero paruos, frequentes, moderatos celeres, ubi non prius languet facultas, tardos autem, aucto languore, idcirco formicantes Humida molles, paruos, raros: Sicca duros, paruos ac frequentiores, semper ramè connexa imbecillitate.

De compositis intemperaturis eadem est ratio.

Vtrum autem inæqualis faciat inæquales, & quos, mox disputabimus.

Qui sunt languidi facilius variis pulsibus, et spiritibus dissoluantur. At vero languens propter spiritus dissolutos pulsus habet, vt dixi, minime hæcicos, aut stables; Et siquidem dissolutio fiat ex aliqua vacuatione, aut sanguinis, aut aliorum humorum, vt in choleris, vomitu, ventris fluxionibus, sudoribus, diabete, nimia Venere, præterea inedia, motu, balneo, vigiliis, aliisue id genus causis: pulsus sunt primum vermiculosi, mox etiam formicantes: Quod si spirituum fiat dissolutio, ex febre ardentissima, aut cardiaca, syncope, ob biliosam scilicet fluxionem; formicantes tantum, non autem vermiculosi eadunt. Vermiculosi quippe inter tardos sunt, ac raros; Formicantes vero semper inter frequentissimos.

De pulsibus ex spiritu intemperato, idem dicendum, quod de cordis intemperie. Idcirco ad iustificationis causas mediaras transibimus, propofita primum, & soluta quaestione, de inæquali intemperaturæ pulsibus.

C A P V T X I I .

An sit pulsus languidus inæqualis, ex inæquali cordis intemperie,

Quomodo ex æquali cordis intemperie, inæquales fiant pulsus languidi, hæcenus cum Gal. ostendimus. Nunc autem vtrum ex inæquali eiusdem corporis cordis intemperie, inæquales languidi fieri possint, explicandum.

Dupliciter vero præfens quaestio accipi potest, vel enim querimus, vtrum ex inæquali intemperie fiat pulsus inæqualis, eo modo, quo eundem fieri diximus, ex æquali intemperie, prout scilicet robur destruit; & hoc in præsentia non querimus. Etenim clara res est, facultate deficiente pulsifica, eosdem futuros pulsus inæquales languidos, quorum antea meminimus, siue defectus sit ex æquali, siue ex inæquali intemperie. Ideo Gal. 4. de *puls. caus. in cap. de marcescentium pulsu*, eandem repetens & interpretans sententiam, quam lib. de *puls. ad Tyron.* proposuerat, aperte docet, in omnibus marcescentibus, siue ex inflammatione manifesta, siue occulta, siue cum febre, siue citra febrem, pulsus fieri languidos, paruos, quandoque innuentes, vel decurtatos in vnicâ distentione, propterea inæquales: cum tamen in omni cordis marcore cum febre, inæqualis adsit intemperies, calida quidem, propter febriculosos affectus frigida vero, propter calidi atque humidi radicalis defectum. Hæc ergo cum manifesta sint, in dubium non vocantur.

Omne pulsus dissolutus, et in omni parte aliquam habet magnitudinem. Quod si queramus, an ex inæquali corporis cordis intemperie diuersus fieri possit pulsus a prioribus, nempe, in vno istu dispar, vel interruptus, resolute dico hunc ex intemperie, prout facultatis robur destruit, minime fieri posse. Omnis enim pulsus dispar, vel interruptus aliquam habet magnitudinem, vt antea monui. Si itaque magnus fuerit, non poterit exolutam sequi facultatem. Idcirco si Galen. 2. de *proph. ex puls. 4. et 3. de proph.*

A *ex puls.* aperte docet, ex inæquali cordis intemperie, inæquales fieri pulsus, secundum vehementiam, & imbecillitatem, aut de alia inæqualitate est intelligendus, quam de dispari, atque interrupta vnus ictus: vel si de hac intelligatur, intemperiem forte supponit esse materiam connexam, idcirco grauante facultatem, non autem dissoluentem robur. Aut loquitur de quibusdam interruptis, qui partem distentionis amittunt: Aut denique de intemperie fiiente, vel partim facta, partim fiiente intelligendus est, vt sequenti capite ostendamus.

CAPVT XIII.

De Medietis causis, propter quas suffocatur facultas.

C Vm vitalis facultas ægæ admodum mouet arterias, quod sit grauata, grauantes causas, aut sunt inæqualis intemperies sine materia, aut cum materia aliqua, corporis, vel arterias afficiēte. Siue autem materia in vno, siue in alio reperitur loco, aut comprimit, aut tendit, aut obstruit.

Compressio fit ab his, quæ foris insident.

Tensio ab his, quæ vel membranas, vel carnem implent.

Obstructio ab his, quæ in cavitatibus continentur.

Fiunt autem affectiones istæ grauantes in corde, vel per essentiam, vel per consensum.

C Si per essentiam, vel sunt humores, aut tumores. *Affectus vel du per essentiam.*
Et si humores, aut calidi, aut frigidi, aut crassi, aut tennes, aut putridi, aut impures.

Si tumores aut simplices, aut compositi ex simplicibus, nempe inflammationes, Erysipelata, scyrti, cedemata: Ad hæc abscessus, calli, calculi, aut consimilia.

Si fiant per consensum, causa, quæ communicatur, est humor aut vapor, aut flatus, *Causa per consensum.*
aut qualitas, vel manifesta, vel occulta.

Locus autem, à quo communicatur, aut sunt thoracis partes, aut caput, aut ventriculus, aut intestina, locur, lien, mésentereum, vterus, renes, vesica, aliaue id genus corporis *Locus à quo fit communicatio.*
partes.

Quomodo maior harum causarum facultatem grauare possit, satis est conspicuum:

D De inæquali vero intemperie, quæ sit absq; materia, non item. Neque enim constat, quomodo nuda intemperies grauatis causa esse possit. Cum tamē, vt antea monuimus, Galenus variis in locis apertissime docuerit, inæquales fieri pulsus languore, ac vehementia, ob inæqualem in temperiem; non possit autem inæqualis intemperies hanc parere inæqualitatem, quatenus vires deiecit, reliquum est, vt id præset, quatenus suffocat; quomodo autem suffocet, nunc explicabimus.

Inæqualis ergo intemperaturæ nomine possumus vel vnicam intelligere, vel duplicem. Cum sit vnica, & inæqualis, nemo non nouit vni parti cordis magis, alteri minus fore insensam, alioquin inæqualis non esset. Quod si fuerit duplex contraria, vel vtraque eodem modo grauata est, atque facultatem deprimat, vel vna magis, altera autem mi-

Quomodo nuda intemperies grauatis causa esse possit.

E nus.

Hæc ergo stance distinctione, dico inæqualem intemperiem pro duplici qualitate contrariam acceptam, quarum vtraque eodem modo cordis facultatem dissipet, nullum alium facere inæqualem pulsum, præter illos, quos retulimus, & præter quosdam interruptos, de quibus postea dicemus, interruptum vero, qui post interruptionem redeat, nunquam efficiet.

Quod si vna cordis pars magis, altera minus lædatur, tunc facultas parte minus intemperata facilius vitur, magis autem intemperata, deterius; hinc quoque distentionis motus dispar, non tamen interruptus oriri potest.

Nam ad interruptionem faciendam maxima requiritur grauitas, & ad reditum post interruptionem, facultas satis valens: quæ duo in inæquali cordis intemperie absque materia adesse non possunt. Non inquam causa grauans, effatu digna, quia deest materia, neque valens facultas, quia adest intemperies: Itaque dispar tantum fieri poterit pulsus in vnico ictu, quatenus imbecillior sit motus, nunc in principio, nunc autem in fine.

Erit autem imbecillior in principio, quam in fine, quandoque intemperies, quæ minus lædit, superat illam, quæ magis.

Contra vero, erit imbecillior in fine, quam in principio, si intemperies gravior vincat leuiorem.

Hæc etsi raro econtingere possint, attamen cum à Galen. proponantur, rationeque non careant, à nobis quoque proponi debuerunt. Quod reliquum ergo est perficiamus, locos, causas, affectionisque propositas, inter se distinguamus.

CAPVT XIV.

Quomodo Locis, Causa, Affectionesque proposita dignosci, ac distinguere possint.

Cum variz sint propositæ causæ, affectionesque, ob quas pulsus languent, reperiuntur autem hæ causæ & affectiones quandoque primario in corde, quandoque secundario, imo vero aliquando nec primatio, nec secundario, sed per consensum tantum, idcirco omnium distinctio est proponenda.

Primum autem quod ad distinctionem spectat, ex solo pulsus minime est petenda.

Quamuis enim Galen. 4. de præfag. ex puls. 12. in principio nos docuerit, affectio corde, omnium arteriarum pulsus mutari, contra vero quarundam tantum, ubi in arteriis quibusdā determinatis fuerit læsio, sic enim scribit: Cum omnes pulsus per se sint languidi, infirmus est facultas, quod per totum fiet corpus, cum ipsum cordis corpus intemperatum sit: in una parte sū sola illa pars. Artram non valet consequentia, omnes arteria inæquales proferunt pulsus, ergo

eor in propria substantia est affectum: Potest enim affectio in magnæ arteriæ principio consistens, omnium arteriarum pulsus reddere inæquales, vt aperte colligitur ex Galen. 2. de puls. caus. 4. & Ant. patri Medici exemplo confirmatur 4. de loc. affe. vlt. Itaq; cordis affectionem in propria substantia factam, eo dignoscemus argumento, quod ab Hippo. propositum est 2. apb. 41. cum inquit: Qui sape, ac vehementer, & absque manifesta causa, exoluuntur, repente moriuntur. Ex nulla enim alia parte affecta potest quispiam sape, & vehementer, & citra manifestam causam animo linqui, praterquam ea vitatio in propria substantia corde. Fit plerumque omnis generis inæqualitas in pulsū, propter leues arterias obstru-
ctas vel compressas, vt de Antipatro proxime: nullo tamen existente animi deliquit, nisi prope mortem.

Fit quoque pulsus insigniter inæqualis, ex ore ventriculi affecto, accedente quinetiam frequentis syncope, sed causa erit manifesta, vel bulimos; vel frigidorum humorum copia, vel aerimonia, atque tenuitas.

Fiunt plerumque non minus inæquales, ex vtero, cum animi defectu magni momenti, sed & huius defectus, a. que inæqualitatis causæ erunt conspicuæ, forte nec admodum frequentes.

Solu in cor primario læsum, omnem profert pulsus inæqualitatem, cum frequenter, ac valida syncope, interim nulla apparente in reliquis corporis partibus affectione. Ex quo statim concludendum, cor in propria substantia vim pati. Quia vero aut intemperie nuda afficitur, aut à materia aliqua comprimitur, grauatur, vel obstruitur: vtroque quidem adcrit omnium pulsuum inæqualitas, frequensque syncope, sed in intemperie cum materia, aderit palpitatio, in intemperie citra materiam, nulla adedit palpitatio. Hæc voluit Galen. 3. de præfag. ex puls. 4. cum inquit: Quia cum sit duplex, altera in succo eius proprie altera in partibus solidis: illa ex succo profecta, una cum totum corpus sit palpitatio: hæc ex solidis partibus absque palpitatione.

Vtrum vero hæ materia sit in ventriculorum euitate, an solidæ impacta substantiæ, an in ipsomet cordis pericardio, difficillimum est nouisse, nec ad præsentem spectat tractationem, sed ad illos, qui de syncope, atque palpitatione ex profectio differunt, quod & nos quandoque præstitimus.

Nunc autem illud intellexisse sufficiat, cor primario affectū, omnes pulsuum proferte inæqualitates, cum syncope absque causa, addita quæ etiam palpitatione, si adsit materia, absque palpitatione vero, cum desit materia.

Idcirco noxias istas causas, in aliis propinquis cordi partibus reperiri, facile ex hoc dignoscemus, vel quod careant syncope, vel si adsit, nec erit frequens, nec valida, nec tandè absque manifesta causa, imo vero cum ea cunctis cognita, & perspecta.

Huius rei multa possent proferti exempla, quorum primum ex Antipatro desumitur,

A tur, cuius meminit Galen. 4. de loc. aff. ultim. qui omnem habuit in pulsu inæqualitatem, abſque frequenti ſyncope, ob læues arterias læſas.

Secundum eſt alterius, cuius meminit Holl. in Scholio ad caput 30. de morbis internis quem Antipatro ſimilem ſcribit & in vena arterioſa abſceſſum habuiſſe docet.

Tertium eſt Dodonæi, qui ex magnæ arteriæ affectu, eoſdem vult fieri pulſus, quos ventriculorum cordis affectio generat, ſed abſque ſyncope, cum palpitatione tamen cuius rei fidem facit hiſtoria ab eo in *Annot. ad caput 35. Antonii Beniuenuſi* conſcripta, atque his verbis telata: *Callum cuiſdam in arteria magna, ſeco cordi proximo natum obſeruauimus. Multis hunc annis cordis palpiationi obnoxius crebro fuerat, ſex vero ante mortem menſibus in ſiniſtro*

B *carpo pulſum iam exiguum habuit, ut nullus frequenter apparuerit, ac ſepe ſentiri non potuerit. Fuit quoque palpitans corde, difficile admodum huius potum admittere, ſic ut vix unicam ſimul bibere paſſuerit, in pectoris huius ſpatio, ſublatei coloris tumor collectus quoque fuerat.* Hæc Dodonæus. Ex quo, & aliis conſimilibus caſibus patet, magnæ arteriæ callos, tumores inſignes, obſtructioneſque, interruptos, inæqualesque omnis generis pulſus proferre, cum cordis palpiatione, eoſdem vero affectus in vena arterioſa omnia hæc præſtare, palpiatione excepta.

Id quod mihi quoque propria conſtat experientia, Calceolarij cuiuſdam Patauini ſepuagenarii, qui multos iam annos pulſus habet inæquales, illis omnino ſimiles, quos reſert Galen. Antipatrum habuiſſe, abſque palpiatione tamen: Imo vero uſque adeo integra fruitur valetudine, ut omnia obite munia poſſit: Hoc vero, quod mihi valde admiratione dignum videtur, præterite nolo, patientem hunc, tunc primum hanc inæqualitatem

C amittere, cum febris deſiniret, febre autem recedente, eandem ſtatim recuperare. Hic ut dixi Calceolarius eſt, atque iuxta B. Helenæ templum habitat, in via, qua ad Portellum itur. Sic ergo loci affectus in genere & affectiones ſunt diſtinguende.

Cauſæ vero atque morbi in ſpecie, qui grauitatem, obſtructionem, vel compreſſionem faciunt, ita inter ſe diſcerni debent. Nam ſi fuerit ſola materia abſque tumore, pulſus erit inæqualis, inordinatus; ſi fuerit tumor aliquis, erit ordinatus, ſtabiliſque propterea à Gal. Hæticus vocatus.

Rurſum ſi tumor non adſit, ſed tantum matetia, ſiquidem vaporoſa fuerit, cito accedit, & recedit omnis pulſus inæqualitas, neque interrupta eſt, ſed tantum diſpar: Si vero corpulenta fuerit, diutius permanet, pulſumque interruptum, pro ſui copia, ac craſſitie poteſt efficitur. Imo vero euſdem matetiz copiam, atque craſſitiem, ex diſpar tatis, interruptioniſque, modo dignoſcimus. Etenim qui interrupti, & que ſunt languidi in principio ac fine, valde onerata offendunt facultatem, qui in fine tantum, minus: qui in principio magis, quam in fine, omnium minime.

D Materias vero, atque tumorum ſpecies, ſic diſtinguimus: nam materia, aut tumor calidus, pulſus ſimul proferat aliquanto celeriores, maiores, aut ſaltem crebriores: frigidus vero oppoſitos. Ideo eum calidis plerumque febris erit connexa, cum frigidis nequaquam: Et cum materia, ut diximus, pulſus inconfians erit, cum tumore vero firmus, hæticus ac conſtans.

ſed ambiget quiſpiam, an ex inæquali pulſu, per omnes arterias, cum magnitudine, celeritate, ac crebritate ſtabili, ordinata atque cum ſyncope, poſſimus inferre, cor primo tamore calido, inflammatione ſcilicet, aut eryſipelate laborare: Fuit enim Galen. ſententia 3. loc. aff. 2. & 3. de præſag. ex pulſ. 3. Cor non poſſe inflammatione, vel eryſipelate tentari, quin prius anima intereat. Itaque non videtur valere conſequentia, à nobis propoſita, pulſus eſt in omnibus arteriis inæqualis, hæticus, cum celeritate, magnitudine, crebritate, ergo calidum cordis tumorem ſignificat. Huic obiectioni reſpondeo, veram eſſe Galen. ſententiam de maximis cordis tumoribus, qui totam illius ſubſtantiam occupant, non de illis, qui vnam duntaxat eius partem tenent. Docuit quippe experientia, ex multiplici cadaverum ſectione comparata, cor, diu viuentem hominem, abſceſſus vlceraque ſuſtinueſſe: at vero, ſi abſceſſus, ergo & inflammationes, quæ abſceſſus præcedunt. Plura hæc de diſcernimus, dum publice de cordis palpiatione verba faceremus. Cor enim abſceſſus, vlcera, du-

E roſque tumores, & alios id genus morbos ſuſtinere multiplici ſcriptorum teſtimonio comprobauimus, quorum omnium hiſtorias adducere ſuperuacuum eſſe puto, aliquas tamen magis ſingulares præterite nolo.

Incipiemus autem ab Hollerio, qui ſecit. 2. quarti aph. 49. *Coac. prauos. Hippoc. & in com. 79. quarti aph.* ſcribit, in Muliere, quæ quatuor menſes vixit cum pulcenta vrina, poſt mortem

Quomodo morbi & vixit, quæ ubi, obſtructionem, ſed diſſipata, ſed facientes ad breue inter ſe diſtinguuntur.

Materia, aut tumor ſpecifici ſe diſtinguuntur.

Gal. ſententia de cordis inflammatione.

Gal. ſententia de vlcera.

duos calculos inuentos esse, & abscissus in corde diuisos: Columbus quoque *libro 15. Anatom.* in Cardinali Gambara, inquit, tumorem prædurum esse inuentum, ad cui magnitudinem, in sinistro cordis ventriculo.

De abscessu pleraque sunt testimonia, primo eiusdem Hollerii in *Secl. ad caput 29. libri 1. de internis. Beniuens de abdatis cap. 39.* De Apostematibus frigidis, Iouberri in *Annot. ad tract. de Veneribus*, Guidonis à Cauliaco: *De Veneribus* denique Fernellii *5. Patolog. cap. 12.* vt alios multos præcream. Itaque semper potius experientia, quam auctoritas adhaerendum, minime Gal. audiendus, qui loco citato aperte docet, hos in corde tumores non excitari, prius enim hominem interire, syncope correptum, quam vt suboriantur. Diximus enim hæc de maximis tantum moribus esse intelligenda. Idcirco ad rem nostram redeamus.

Prodest Anaphylia.

Potest ergo grauius facultas pulsifica à materia sine tumore, atq; ab omni humore. Potest materia esse in cavitare, in substantia, in pericardio: potest quoque per omnia cordis vasa in cor transferri, erit quandoq; vaporosa, aliquando corpulenta, frigida, calida, multa, exigua, putrida, imputris, venefica, benigna, quorum signa iam sunt propolita. Superesset nunc signa quoque partium & affectionum proponere, quæ cordi communicant, & communicantur: sed de hac re quantum ad hunc spectat tractatum, loquimur in parte, quæ de pulsibus, aut instrumentorum, aut causarum compositarum pertractat, cū affectiones, quæ extra cor sunt, maiori ex parte pulsus proferant inæquales, qui ad solam facultatē vtē atq; proprie reduci non possunt. De Pulsibus itaq; Facultatē hæc sufficiat.

C A P V T X V.

Quis, & quotuplex sit Vfus.

DVm à Facultatē pulsibus, ad Vsum me conuerto, oportet præcipuum esse duxi, ante omnia quid seruius, ac quotuplex, recensere.

Quis sit pulsum Vsum.

Est ergo vñs, *finalis pulsum causa*: Ideo enim facultas mouet arterias, vel vt cor refrigeret, vel vt fuliginis expellat, vel vt spiritus animales reficiat, idcirco triplex est vñs, qui auctus nuncupatur, calor, fuligo, & spiritus animalis deficiens: triplex quoque est imminutus, caloris scilicet, fuliginisque defectus, & spiritus animalis abundantia. Hic est vñs, hæc illius differentia. Quales pariant pulsus, mox explicabo.

C A P V T X V I.

De pulsum differentijs, ex vñs eius surgentibus.

*Qui sit a-
quales vñs
pulsus.
Dubitatio.*

PVlsum, qui vñs tribuuntur, quosdam inuenio æquales esse, alios inæquales: primum de æqualibus, mox & de inæqualibus edisseram.

Æquales sunt Magnus, Celer, Frequens, Paruus, Tardus, Rarus, atque inter hos Moderati. Hos diximus fieri etiam à facultate, ostendimus quinetiam fieri ab instrumentis, idcirco familiares nuncupari, & tamen à nobis in præsentia tanquam à solo vñs producti considerantur.

*Quis sit a-
quales vñs
pulsus.
Dubitatio.*

Quomodo ergo si ex alijs quoq; contentiuis prodeunt causis, vñs tantum à nobis tribuuntur? Solutio est, hos pulsus solo vñs quandoq; conueniri: non quia ab alijs quoq; contentiuis causis, non fiant, sed & quod aliquando ab vnico vñs, nulla interim facta in facultate, aut instrumenti mutatione, mutari possunt. Galeni verba hoc aperte docent *1. de prasag. ex puls. 1.* vbi cum docuisset, magnos, celeres, crebrosq; pulsus ex sola non nunquam facultate, interdum ex solo instrumento prodire, tandem ad vñs se conferens, hæc scribit: *Item si neutrum appareat, clarū est, nec facultatem, nec arteria tuniceam immutatam esse. Restat igitur mutatio aliquatenus esse, & variasse vñs, pulsuum generandorum. Et 3. de prasag. ex puls. 2.* hæc habet: *Item si solus calor increuerit, & in naturali statu maneat facultas, & instrumenta, cum parua est mutatio, pulsuum tantum magnitudo augetur, cum maior, etiam celeritas, cum ingenio iam etiam crebrius.*

Inflatio.

Sed si vera hæc sunt, instabit quispiam: Cur ergo *1. de puls. caus. 3.* vult magnum, celerem, & crebrum pulsum, quo talis euadat, exigere facultatem validam, & que instrumenta mollia? Dico Galen. eo loci, sicuti & *3. de prasag. ex pulsib. 2.* vbi eadem repetit, hoc tantum voluisse, magnum, celerem, ac crebrum pulsum, non necessario, id est, non semper concomitari vñs solum auctum: Ita enim loquitur *1. de pulsib. caus. 2.* Quamobrem peculiare esse dixi pulsus copioso calori magnum, celerem, crebrumque non tamen necessario concomitari: possibile enim, quo tales euadant, facultatem validam, & mollia instrumenta. At nos id quoque confi-

- A conficiemur, non necessario ex solo usu semper hos pulsus fieri, nam si necessarie, ergo & soli, & semper: at non semper, ergo non necessario. Cum tamen à solo usu quandoque fiant.

Reliquum est vt causam, affectionem, modumque exponamus quo fiant, id quod in sequenti præstabimus capite.

CAPVT XVII.

Quanam causa fiat magnitudo, celeritas, ac crebritas diastoles.

- C Vm motus diastoles, caloris refrigerationi inferuiat, sequitur, diastoles magnitudinem, celeritatem, ac crebritatem, ex caloris fieri incremento. Hoc autem caloris incrementum, vel moderatum erit, vel excedens:

Si moderatum parit magnitudinem,

Si immoderata: um, addit celeritatem (si Gal. credimus) mox & crebritatem.

At si Auic. aures præbeamus, ex aucto calore, primo crebritas exsurgit, mox celeritas, denique magnitudo. Ego hæc in re, illa vtendum esse distinctione existimo, quam ex Galen. 3. de præfag. ex puls. 4. excipio, quæ talis est: Calor, ex quo pulsus mutatur, vel est præter naturam in corde, vel adhuc intra naturæ limites continetur: Si præter naturam, aut primario eor occupat, vel secundario: Cum primario, statim fir ad celeritatem mutatio: cum secundario, nempe ex pulmonum, vel vicinarum partium calore: primo mutatio fit ad magnitudinem, secundo autem ad celeritatem, tertio ad frequentiam. Hæc sunt Gal.

- C Verba: *Quare. si quod corpus ipsum cordis in naturali statu constans, vel à materia, quam continent ventriculi eor, aut pulmonis confusæ adine inflammati: vel alia quapiam parte vicina causet, pulsus, refrigerii gratia, in magnitudinem, celeritatem, crebritatem commutentur. prima tum erit in magnitudinem mutatio, altera in celeritatem, tertia in crebritatem: siu calidius sit partibus si contingentibus, quæ in naturali statu sint, celeritas motus primum increfcat, deinde magnitudo.* Ratio-

nenon caret hæc sententia, celeritas enim est certum ac proprium solidæ substantiæ cordis calfactæ signum, vt docuit Galen. tum ibidem, tum 3. de præfag. ex pulsibus 3. Et idem 3. de præfag. puls. 7. loquens de febrium pulsibus, celeritatem hæc: cis potissimum tribuit, vt ostendat celeritatem, solidæ partis calorem significare. Cum ergo resira habeat, si solida cordis substantia primario sit calfacta, prima mutatio erit ad celeritatem: Si vero

- D calor aliunde ineipiat, prima mutatio erit ad magnitudinem, vtpote effectum caloris illius partis, quæ cum corde communicat, secunda ad celeritatem, vtpote effectum caloris iam solidæ cordis communicat. Vbi vero facta magnitudine, apposita celeritate, non desinat calor, necessario additur frequentia: Et cum res hæc processerit ordine, eodem quoque dissoluetur, vt scilicet deficiente calore, prius deficiat frequentia, mox celeritas, tandem magnitudo. Hæc ergo in calore præter naturam eueniunt, facultate valida existente, atq; instrumento molli: Nam si alterutrum ex his deficiat, neque magnitudo, neque celeritas accidet, sed horum loco insignis crebritas, vt alibi demonstrabimus.

Quod si calor non fuerit extra naturæ limites, sed ex causa potius non naturali intendatur, vt ira, vino, motu, aere, aliaue consimili causa, nunquam possum persuaderi, vt

- E existimem, post magnitudinem fieri celeritatem, nisi momenaneam: Nam si celeritas sequitur cordis calorem præter naturam, non poterit profecto ex causa non naturali accedere, neq; facile recedere. Hæc de æqualibus aucti caloris pulsibus, quas vero ob causas augeatur calor, sequenti capite explicabimus.

CAPVT XVIII.

Qua sint mediata aucti caloris causa.

M Ediatæ causæ ob quas calor augeatur, vel naturales sunt, vel non naturales, vel præter naturam.

- F Naturales quidem erunt, calidior temperies, habitus gracilior, ætas iuuenilis, sexusque virilis.

Non naturales autem causas, nemo non nouit esse sex: aerem calidiorum, motum animi, ac corporis, cibos, porionesq; calidas, vel alimentosas, vel medicamentosas, excrementorum retentiones, vigilias, non tamen immodicas, balnea calida.

Præternaturales autem causæ sunt, ephemere atque hecticæ febres, biliosæque omnes, & reliquæ etiam putridæ, vel principales, vel symptomaticæ, ex inflammationibus

scilicet, erysipelatibus, carbunculis, aliisque id genus affectibus oculundæ, quæ etiam si fuliginis copiam quoque præ se ferant, attamen multo quoque æstuant calore. Quomodo autem causæ istæ distinguantur inter se, nunc exponendum.

CAPVT XIX.

Quomodo aucti caloris causa inter se distinguantur.

Cum calor ex naturali causa auctus fuerit, magnum ac frequentem efficiet pulsus, perpetuo sibi similem, non tamē ultra modum celerem, qui quidem ex gracili quoque habitu, calida temperie, ætate iuuenili facile deprehendi poterit.

Magnus quoque, ac frequens erit pulsus, ex causa non naturali, sed qui cito accedat & recedat & ex causa proximè prægressa, absque negotio dignoscetur. Qualis vero sit hæc non naturalis causa, an aer, an somnus, Venus, cibus, potus, balneum, ira, vel quid simile, aut ex ægri relatione, aut quod M. edicus ab ægro nunquam d. scedat, facile sciti poterit. Si neutrum addit, imo vero si consulto æger Medicum decipere prætendat, tunc ea vtendum arte, cuius meminit Gal. r. de præfag. ex puls. r. quam ab eo petendam esse consulto, nec frustra huic loco inferendam existimo.

At si causa fuerit præter naturam, maiorem his omnibus faciet pulsus. Ad hæc celeritatem apponer calor ex altera propria crebritateque, vt antea monui, quæ minime breui mutabuntur, sed ægte, & non nisi longo aliquo temporis spatio. Accedet quintiam caloris acrimonia, rubor, sitis, aliaque id genus: quæ febrem concomitantur.

CAPVT XX.

An ex corde intemperato magni ac celeres reddi possint Pulsus.

Cum de pulsibus facultatis instituta esset disputatio, dictum est languidos semper ex consequenti paruos ac tardos fieri pulsus, quando solida cordis fuerint intemperata. Si ita res habet, quomodo ergo cum Gal. dicimus, ex calida cordis intemperie, pulsus reddi maiores atque celeriores? Vidit Gal. dubitationem hanc, de præf. ex puls. 2. illa m. q. mouet, ac resoluit his verbis: *At commemorandum etiam hoc est, qui fieri possit, vt calor per multum cor teneat, & valeat facultas: Nā si robur temperi, imbecillitas intemperie consequitur, intemperies in cor, vna cum immodico calore inuadens, proinde debilitari facultatem oportebit. Qui tadem ergo, cum pulsus pariter, & maximus, & celerissimus, & creber, vehemensque sit, nō modo calorem in corde amplum, verum etiam facultatis firmitatem esse dicimus, nempe quod cum in aliis locis, tum in febribus dignoscendis, aliud esse demonstrauimus incallescere, & incaluisse. Nam vbi corpus cordis à subiecta calefuit, quam continent eius ventriculi, potest firma esse facultas, quod etiam est in causa, cur plurimum, celerissime & creberrime inspirent illi, ac maxime, celerissime, creberrime pulsent, repugnante calefacienti substantia corde, & foris alteram, qua refrigeret, parem calori alliciente. Hæc cum ex Gal. tam aperte eliciantur, non est, vt pluribus repetamus.*

CAPVT XXI.

Quæ sit crebritas auctum calorem indicans.

Cum dictum sit, crebritatem caloris aucti comitem esse, & tamē paulo antea asseruerimus, crebritatem celeris quoque contractionis esse signum, idcirco quid Gal. primum hæc de re sentiat aperimus, mox quid ipsi arbitremur pronuntiabimus. Galen. itaque 2. de præfag. ex puls. 2. duplicem proponit crebritatem ac tarditatem, vnam, quæ sit post diastolen ante systolen, alteram, quæ sit post systolen ante diastolen, causas deinde tubi-gens, inquit, vtramque quadrupliciter gigni: Etenim crebritas, quæ sit post distentionem, vel sit ex protensa distentione, vel ex anticipante contractione: Et quæ sit ex protensa distentione, indicat caloris puri incrementum, quæ vero ex anticipante contractione, significat fuliginosorum excrementorum copiam.

At si sermo sit de crebritate, quæ contractionem sequitur, hæc pariter sit vel ex protensa systole, vel ex anticipante diastole: si ex protensa systole, indicat fuliginis copiam, si ex anticipante diastole, ostendit caloris abundantiam.

De raritate idem esto iudicium. Etenim raritas, quæ sequitur distentionem, vel fit ex ca

Ægro Medico dicendum d. p. t. u. r. q. u. o. m. o. d. o. c. o. n. s. u. l. t. a. n. d. u. m.

Duplicem crebritatem aucti caloris.

A ex ea abbreviata, vel ex contractione tardante: prima quidem caloris, secunda autem fuliginis defectum indicat. Raritas autem, quæ fit post contractionem, si quidem fiat ex ea abbreviata, ostendit fuliginis defectum, si vero ex distentione tardante, cordis refrigerationem sequitur. Hæc Galco *locitate*, quæ ingeniosa quidem esse fateor, non tamen vitia. Etenim si laxet contractio, non potest dignosci crebritas, vel raritas, quæ systolen præcedit, distincta ab ea, quæ subsequitur. Vna ergo tantum erit crebritas, ac raritas, quæ in illud cadit intervallum, quod est inter vnam, & alteram diastolen; Causæ tamen utriusque sunt duplices, crebritatis quidem, vel diastoles longitudo, vel contractionis celeritas, raritas vero, diastoles breuitas, aut contractionis longitudo, quemadmodum ubi de Rhythmis fuit sermo, abunde exposuimus. Vnica ergo constituta crebritatis, ac raritatis difficultas, causa tamen utriusque duplici, non est iam difficile consequi, quæ nam sit crebritas, quæ fit ex calore, & quæ fit illa, quæ ex fuliginis copia. Etenim si crebritas fit ex protrahata diastole, sequitur caloris copiam, si vero sequatur contractionis celeritatem, indicat fuliginis abundantiam. Quomodo autem contractionis celeritatem dignoscere possimus, antea ex posuimus. Concludamus ergo, verum pulsus, qui ex caloris copia oboritur, illum esse, in quo diastole protenditur.

CAPVT XXII.

Quæ nam affectus præter naturam hic pulsus sequatur.

Magni, celeres, ac crebri pulsus iam propositi, omnium febrium sunt comites, vtpote qui, omnibus, ac semper insint. Quamquam enim alii quoque reperiantur in febribus pulsus differtentia; cunctis tamen minime conveniunt, nec semper insint, eo quod caloris essentiam in corde existentem non consequuntur, sed vel exolutam facultatem, vel instrumentorum læsionem. Hæc docuit Gal. *3. de praeseg. 7.* ubi aperte docet, plurimos inæquales pulsus. qui in febribus reperiantur, esse affectus humorum ad os ventriculi confluentium, angorem inferentium, vel quouis alio modo cor ipsum, atque arterias lædentium. Quæ cum aquo Galeni sint apertissima, dimittamus, & ad alia traſcamus.

*Qui pulsus
fit, non pro
pulsione.*

CAPVT XXIII.

De causis parvitatæ, tarditatæ, ac raritatis diastoles, tam immediatæ, quam mediæ.

Sicut magnus, celer, & frequens pulsus calorem auctum sequitur, ita oppositus refrigerationis est proprius. Refrigeratio autem fit vel ex naturali causa, vel non naturali, vel præternaturam.

*Refrigeratio
non causa.*

Naturalis quidem causa, est frigida cordis intemperies, habitus pinguis, obesus, i. e. *Natura de-
xus muliebris, ætas senilis.*

Causæ non naturales sunt aer, atque omnia, quæ appropinquant frigida, otium, moror, timor, inedia, somni excedentes, immodice evacuationes, cibi, potus, medica-
*Non naturalis
ita.*

Causæ denique præternaturam Comata, Apoplexiz, paralyſes, stupores, torpores, Præternatu-
ram.

E deſtillationes, asthma's, marcores seniles, hæctica ventriculi, aliarumque partium, Hydropes, cachexiz, & alia id genus affectiones. Ex his patent non modo causæ, sed & affectiones, per quas hi pulsus oboriti consueverunt: quas inter se distinguere operæ præcium esse duximus, ut antea quoque de calore à nobis factitatum est.

CAPVT XXIV.

Quomodo causa, affectusque frigidi inter se distinguantur.

Naturalis causa frigiditatis nunquam pulsus mutabit ad tres propositas differtentias, sed ad raritatem duntaxat. Cum enim valeat in hoc casu facultas, nec magnus adſit frigoris excessus, idcirco nec parvus, nec tardus admodum erit pulsus, sed rarus, atque si-
Fbi perpetuo similis, nisi à causa non naturali, vel præter naturam mutetur. Accedente vero non naturali causa, non modoratum, sed & isto tardiore effici oportet, qui tamen brevi accedet atque recedet, & ex ægri, vel adstantium relatione comparabitur. At vero cum raritati, tarditati que etiam parvitas connectatur, iam opus est causam adesse præternaturam. Vtrum vero sit melancholica, an marasmus, an hæctica ventriculi, an cachexia, vel Hydrops, vno verbo, aliqua ex prædictis affectionibus, non est præſentis loci explica-
te.

ec. Habet enim quæque affectio sua signa propria, ex propriis locis petenda.

CAPVT XXV.

*Quomodo distinguantur magnus & parvus pulsus, qui fit ex aucto vel imminuto calore, ab eo, qui fit ex abundantia aut defectu spirituum animalium: Et an spiritus animalis deficiens, vel abundans possit pulsus prædictos exci-
sare, & quomodo.*

*Dupliciter
magnus fieri
potest.*

Quemadmodum Gal. duplicem proposuit finem, ob quem natura magnam facit distinctionem, quorum vnus quidem est, caloris naturæ tutela, alter vero spiritus animalis generatio: ita quoque dupliciter supponit magnum fieri pulsus, vel quod calor abundet, vel quod animalis spiritus deficiat. De paruo pulsu idem dictum volo. Etenim non minus ex vsu imminuto, quam ex spiritu animali abundante prouenit.

Quod si ita res habet, vt sane habet, profecto distinctiuis opus est signis, quibus magnus ex aucto calore distinguatur à magno ex deficiente spiritu, & paruus ex defectu caloris segregetur à paruo, ex abundantia spiritus.

*Idem qui pul-
sus, ab calo-
rem aucto
dequatur.
Quomodo
aucto ma-
gnus pulsus
fit, qui
excessu spi-
ritus defi-
cit ab eis,
quæ sunt
calor an-
imalis.*

Magnus ergo cognoscetur pulsus ob calorem auctum, si patitur fuerit celer: neque enim vbi deficit spiritus, potest celer esse, quia nec abundat calor. Adhæc magnus ex calore, habebit carnis ruborem ac calorem.

Magnus ex spiritus defectu, potius refrigerationem, ac pallorem.

Tertio magnus ex calore potest esse diuturnus: magnus ex spiritus defectu, erit momentaneus: idcirco ille absque causa spiritus vacuante; hic vero non nisi ex causa aliqua proxime spiritus digerente fieri poterit, qualis est subita recensque aliqua vacuatio, aut timor, aut quid tale.

Dixi autem subitam ac recentem euacuationem, quandoquidem si defectus spiritus, cerebri, aut cordis morbum sequatur, & ex consequenti antiquum affectum, non autem errorem externum, magnus nunquam erit pulsus, quia in spiritus defectu, ex cerebri, aut cordis morbo, languet facultas, cum qua non potest esse pulsus magnus. Scire autem potest magnus cum euacuatione facta ex aliquo errore externo, qui cito corrigatur: Etenim cum non sint partes præcipue intemperatæ, facultas adhuc valet. Facile etiam distinguetur paruus pulsus ex vsu imminuto, ab eodem ex spiritu animali copioso: quia vbi partes frigidae sint, paruum simul, tardum, rarumque habent pulsus, palloremque & cutis refrigerationem, præterquam quod ex actionibus laxis, pituitosisque excrementis dignoscuntur.

*Quis pulsus
excessu spi-
ritus abun-
dantia.*

Spiritus vero abundantia pulsus habet paruos, sed tamen aut celeres, aut saltem frequentes, cum carnis calore, rubore, tensione, atque plenitudine venarum: Fit enim talis pulsus in plethora quæ ad vasa, quæ propter sanguinis, ac spiritus copiam, non dilatantur, cum tamen spiritu carere non possint.

*Quid pulsus
magnitudi-
nem impa-
det.*

Sed dicet quispiam, si in plethora calor abundat, ergo magnus erit pulsus, quomodo ergo paruus? Respondeo futurum magnum, nisi quid impediat: impediunt autem vasa nimium repleta, vt quandoque asphixias, seu artieriarum interceptiones efficiant, de quibus Hipp. 4. acut. 23. Quod si nihil vasorum dilatationem prohibeat, & tamen adsit calor auctus, & spiritus copia, tunc pulsus fiet magnus, quia plus poterit caloris vehementia, quam spiritus abundantia: Sicuti è contra, vbi valde sit refrigeratus calor, & tamen spiritus quoque deficiat, plus poterit refrigeratio ad paruitatem producendam, quam deficiens spiritus ad magnitudinem.

Hæcenus de differentiis, quæ in diastole reperiuntur, quæ tamen cum sint familiares, idcirco ab aliis quoque contentiuis causis producuntur, æquum est, pulsuum vsui attributoeum distinctionem proponere ab iis, qui à facultate, & instrumento producuntur.

CAPVT XXVI.

Quomodo inter se familiarium pulsuum proxima causa distinguantur ex pulsû magno, celeri, ac crebro paruo, tardo, ac raro.

Cum pulsus magnus, celer, creber, cum oppositis paruo, tardo, ac raro, fiant non modo ab vsu aucto, vel imminuto, sed & à facultate valida, vel debili, & ab instrumento duro

A duro, vel molli: sic debent inter se distingui. Si pulsus sit magnus, celer, ac creber, considerandum numquid cum magnitudine, atque celeritate, adfir quoque vehementia, aut mollities, necne.

Si adsit vehementia, rursus considerandum, numquid pulsus tanto fir celerior, quanto est vehementior, & tunc magnitudinis, ac celeritatis causa, est facultatis robur: An potius fir celerior, quam vehementior: tunc enim quia est celerior, hoc de usu aucto accepit.

*Heri pul-
sus desit-
tente mo-
do.*

Pari ratione, si pulsus tanto fuerit celerior, quanto mollior, alterationem à sola mollitie mutuauit. Sin vero multo celerior, quam mollior, non à mollitie tantum, sed & ab usu aucto. Quod si multo vehementior, quam celerior, tantum abest, ut aucta sit caliditas, vt potius frigiditas aliqua, pulsus alterationem excitari: Sin multo mollior, quam celerior, quanto mollior est, tantum detraxit solius usus exolutio. Quod si iam celerior simul & mollior, vehementiorque appareat, considerandum, vtrum tanto sit celerior moderato, quanto ex ambabus causis facta accessio est, ex mollitie, & contentione; an non tanto. Nam si tanto, ab illa sola est immutatus, si magis, accessit quoque usus incrementum, sin minus, propter usum exolutum.

Eadem est ratio in paruitate, ac tarditate inuestiganda: Ex vsu exolutio, an facultatis imbecillitate, an ex instrumentorum duritie orta fuerint. Ob vsu enim variasse pulsus, probabile est, si nec durior, nec imbecillior inueniatur. Ob facultatis vero infirmitatem, vbi quanto languidior fuerit, tanto etiam tardior, ac minor. Ob instrumentorum duritiem, cum tanto sit tardior, quanto durior: sin autem multo tardior moderato videatur, quam languidior, in eum statum ex imbecillitate, & refrigeratione incidit. Si vero minori sit excessu tardior, maiori veto languidior, ex imbecillitate, & calore, is quoque natus sit.

Pari modo vbi à tarditate inueniatur durities, si quanto tardior est pulsus, tanto etiam videatur durior, sola alterationis durities causa est: Si vero multo tardior, quam durior, non modo durities, verum etiam frigiditas. At si sit durior, quam tardior, non solum durities, verum etiam caloris nomine talis qualis.

Iam vero si tardior, durior, languidior, perpendendum, an tanto sit tardior moderato, quantum excessit ex vtriusque causis, imbecillitate, ac duritie, nec ne: Nam si tanto, ob illas est mutatus pulsus: Quod si magis adiuncta sit causa, usus erit exolutio: sin minus, etiam propter usus incrementum. Causarum veto magnitudo, ex proportionis excessu emergit, quia de re cum Gal. 1. de praeseg. ex puls. s. abunde egerit, nos in praesentia nil aliud docuisse volumus, ne forte gliscere confusio à las subministraremus.

CAPVT XXVII.

De Pulsibus Sympliciter.

Pulsus differentiae, quae ipsi contractioni contingunt, ut haecenus diximus, sunt illae, quas in distentione fieri docuimus. Ex fulgine enim aucta contractionem fieri maiorem, celerior, ac frequentior, ex imminuta vero minorem, tardior, ac rariorem, minime in dubium est tenendam.

*Fulgine
aucta, ac di-
minuta pul-
sus.*

Quod si ita res habet, ut sane habet, demonstrabunt haec differentiae remotas sitas causas, ex quibus & per quas latentes morbos, locosque affectos, inueniri possumus, idcirco maxime erunt vsus.

At veto si later contractio, ut nos contra Gal. docuimus: vix, ac ne vix quidem ratio inueniri posse videtur, quia haec differentias nobis comparare possumus, cum tamen si vique adeo vtilis sunt, minime potest erimitti debeant, quoniam ergo est ratio qua dignosci possint? Vt arbitror duplex est, cuius etiam meminimus in capite de rythmis, vna quidem à priori, altera à posteriori.

A priori quidem cognitis causis, & affectionibus, in quibus fuligo abundat, de quibus mox dicam. Valet enim consequentia, abundat fuligo, ergo magnus, celer, ac frequens est contractio, sicuti & è contra, deficit fuligo, ergo parua, tarda, ac rara est contractio.

A posteriori vero ex frequentia, ac raritate, quam ipsa met contractio efficit. Ex hac enim frequentia, ac raritate magnitudo ac celeritas, vel paruitas ac tarditas eatenus probatur, quatenus crebritas augmentum fuliginis, raritas defectum ostendit. Ex cre-

britate enim, quam parit systole, fuliginis copiam declarari, hactenus ostendimus, sicuti ^A
ex raritate, defectum.

Nunc autem dicebamus, ex copia fuliginis magnitudinem, ac celeritatem, ex defectu autem tarditatem, ac paruitatem fieri. Hoc ergo modo frequentia, & raritas ex systole facta; alias quoque systoles differentias ostendit. Sed & sigillatim frequentia ex systole facta celeritatem, raritas vero eiusdem tarditatem declarare valent. Etenim cum necessarium sit in abundantia fuliginis maturius systolen incipere, & diutius etiam perdurare, ut ex Gal. paulo antea docuimus, hoc sane magnum supponit pertransiri spatium: At vero breui pertransitur, alioquin frequens non efficeretur pulsus, ergo ex frequentia facta, propter fuliginis copiam, possumus audacter contractionis celeritatem comprobare.

Fuligo igitur magnum, celerem, crebrumque efficit pulsus, crebritas autem sola ^B
sensu dignoscitur, magnitudo vero ac celeritas ratione tantum.

Eadem vero est paruitatis, tarditatisque ratio. Etenim sit utraque hæc differentia ex fuliginis defectu, sicuti & raritas: Cognoscuntur autem duæ illæ priores vel ex causis defectus fuliginis, vel ex raritate, ut facile unicuique patere potest. His ergo sic præmissis, reliquum est, ut videamus, qualesnam sint auctæ vel diminutæ fuliginis causæ, qui affectus, & quomodo inter se possint distingui.

C A P V T XXVIII.

De causis tam immediatis, quam mediatis magnitudinis, paruitatis, celeritatis, ac tarditatis in systole.

*Fuliginis
est excrementi
tota causa.*

Magna, celer, ac crebra sit contractio, cum magnus adest fuliginis fororum excrementorum proventus, parua autem, tarda, & rara, cum exiguus.

Habent vero hæc fuliginosa excrementa causas naturales, non naturales, ac præter naturam.

Naturales sunt intemperies calida, humida, ætas iuuenilis, habitus carnosus.

Non naturales sunt aer quoque calidus, humidus, fomnus copiosus, cibis & potus, præsertim crassioris succi, otium, excrementorum retentio.

Præternaturales autem erunt omnes febres putridæ, præsertim circa accessionum initia, vno verbo, affectus, qui sunt cum putredine, ut Carbunculi, Herpetes, vlcera interna & externa, abscessus: suppurationes, maxime autem pulmonum, & thoracis vniuersi, ^D
siue suppuratio sit ex rupto abscessu, siue ex desultatione, vel sanguine extrahenari, aut alia quacunque causa.

Imminuitur vero hie expurgandæ fuliginis usus, ex oppositis causis, scilicet ex intemperie sicca, habitu gracili, aere sicco, exercitationibus, vigiliis, inedia, excretionibus copiosis, febribus ephemeris, Hæticisque simplicibus, putridisque omnibus, flatus atque declinationis tempore: Hoc tamen discrimine, quod in exquisitis biliosis, per hæc tempora minime abundet fuligo, in pituitosis magis, in melancholicis vero medio quondam modo res habet, inter bile & pituita. Hactenus de auctæ atque diminutæ fuliginis causis.

C A P V T XXIX.

De distinctione causarum auctæ, vel diminutæ fuliginis.

Autam ex naturali causa fuliginem docebit constans, ac perpetua systoles magnitudo, celeritas, ac crebritas in intemperie calida, & humida, habitu carnoso, cuius sudor sit valde calidus, atque olidus quodammodo videatur, ut docuit Gal. *l. meth. 7.*

Quod si fiat ex causa non naturali, hanc diligenter ab ægotante, atque assidentibus venari oportet, utrum sit cibi, vel potionis alicuius proprietas, an excrementorum retentio, vel quid consimile.

Quod vero ad causam præter naturam spectat, ex se erit conspicua, nempe febres putridæ, vel præcipua, vel symptomatice, ex abscessu scilicet, vel suppuratione, carbunculo, aliaue consimili causa. ^F

Varias imminutæ fuliginis causas eodem modo venabimur: considerantes scilicet, numquid paruitas, ac tarditas systoles sit constans, ac perpetuo sibi similis, an alia atque alia.

Er si alia atque alia, numquid breui ex vna in aliam mutetur differentiam, absque consuetarum actionum læsione; an potius diutius permaneat, actionesque habeat lætas,

Con-

- A** Constant enim causam docet naturalem, inconstans brevis, sine actionum latione non naturalem, diutius permanens, cum actionum latione, præternaturales. Vtrum vero eum fuerit præter naturam, sit feb. ephemera, an hæcica, an putrida in statu, ac declinatione, ex aliis locis est petendum.

CAPVT XXX.

De Pulsibus inæqualibus vsus.

- Q**uemadmodum familiares pulsus qui ab vsu produciuntur sunt magni, celeres, crebri, cum suis oppositis, ac moderatis, ita inæquales ex eodem vsu prodeuntes, ad eandem magnitudinem, celeritatem, ac crebritatem, & oppositis differentias, atque ad tythmos spectant, vt hinc variz insurgant differentiz, partim nominatz, partim innominatz. Ex nominatis enim sunt Caprizantes, Dicroti, Interrupti, Intercurrentes, atque intermittentes. Ex innominatis vero, quidam dispares, ratione locorum diuersorum, alii vero ratione vnus tantum loci: Et horum quidam in vnico ictu, quidam in pluribus; quorum alii sunt dispares æqualiter, alii vero inæqualiter. Hic est pulsus inæqualium catalogus, quos ego ad vsum referri existimo. De causa vero ex parte vsus, ob quam inæquales hi pulsus fiant, d. seremus primum in genere, mox & in specie.

CAPVT XXXI.

Qua sit inæqualium pulsuum causa, ex parte vsus.

- C** Si quæ est causa ad vsum spectans, quæ pulsus pariat inæquales: profecto ea est, quam passim Gal. in lib. de prasag. inæqualem vocat intemperiem: Etenim nil aliud est inæqualis intemperies, quam in inæquali vsu, vt mox ostendamus. Inæqualem autem intemperiem inæquales parere pulsus, apud Gal. est compertissimum. Vt enim plurima alia omittam loca, vnus ad mentem Gal. aperiendam videtur aperitissimus, qui habetur 2. de prasag. ex puls. 8. cuius verba nunc adducemus, alia vero ex eodem lib. cap. 7. & ex lib. 3. cap. 3. 4. ac 5. sub loco subnectemus. Itaque Galen. cap. 8. 2. de prasag. ex puls. sic scribit: Tantum hoc loco satis fit, inæqualem cordis intemperiem, qua quidem ipsum corpus cordis teneat, comitari pulsus bisferi entem, & consequi etiam illum, qui perdidit externam quietem: ad hæc illum, cuius impeditur dysentia. Præterea demonstrauimus illos, quorum motus interpellatur quiete, comitari omnes inæqualem cordis intemperiem: Quin etiam citra interpellatam dysentionem, qui inæquali representantur tarditate, & crebritate, plane etiam hi, præter alias, à quibus eos signa demonstrauimus, & hanc causam obtinebunt, de qua sermo habetur in inæqualem cordis intemperiem. Hæc cum longa satis oratione, apertisq; verbis, loco citato, aliisq; infra adducendis, doeuisset Gal. aliquando confundere visus est: Quandoquidem iij. iv. ac v. capis, serij libri de prasag. ex puls. tantum abest, vt velit ex inæquali intemperie, pulsus fieri inæquales, vt potius scribat moderatos euadere. Legantur illius verba iij. de prasag. ex puls. iij. Etenim inæquali in temperie inter cor, & arterias, verba faciens sic scribit: Quo circa, contingit aliquando, vt arteria, qua frigida est, sed à corde calefit, nec paruum pulsus, qui frigida est, adas; nec magnum, qui calida, sed inter vtrumque medium, qui moderatus est, & naturalis. Et paulo infra de inæqualitate inter cor, & contentos succos
- E** hæc habet: Nonnunquam percipitur in corde huiusmodi pugnantia temperamentorum: nam modo frigidus visceris corpus aquo est, & in ventriculo contenta substantia, calidior: modo è diuerso, substantia frigidior, cor autem calidius: vbi etiam pulsus sunt moderati similes, nam medium quoddammodo status hic efficitur, ex duobus contrariis constitutus. Et 3. de prasag. ex puls. 4. sic ait: Si qua sit alia visceris intemperies, vt aliam ipsam corpus intemperiem habeat, aliam sanguis, & spiritus, qui sunt in eius sinibus, in æquales nunquam efficit pulsus, sed ex affectionum consensum, pulsus medium quendam statum sortiuntur. Et hæc quidem de inæquali intemperie profert Galen. quæ ex duobus consistit contrariis qualitatibus in gradu æqualibus.

Quia vero videbat hæc non semper in gradu esse æquales, idcirco posse quempiam euitmare, si et quidem æquales pulsus ex contrariis qualitatibus æque potentibus, inæquales vero, dum vna aliam exuperat ipse tacite huic obiectioni occurrens facta inæqualis intemperiei in tres species diuisione, docet ex vnaquaque æquales fieri pulsus, sed quosdam moderatos, alios vero immoderatos: Inquit enim, contrariarum qualitatum consensum tripliciter fieri, primo vt tanta sit solidorum cordis caliditas, quanta humorum contentorum frigiditas: secundo, vt cordis calor aliquanto superet humorum frigiditatem. tertio vt eisdem calor superetur à contentorum frigiditate. His igitur sic se habentibus,

Quid inæqualis intemperies, inæqualis inæqualis pars, inæqualis inæqualis pars, inæqualis inæqualis pars.

Triplex consensum qualitatum, quod est inæqualis, quod est inæqualis, quod est inæqualis.

sibus, *cap. 3. eiusdem libri*, inquit, cor calidius quam humores frigidiores, pulsus parere maiores, celeriores, crebriores: Cor autem minus calidum, quam sint humores frigidi, eodem efficere paruos, raros, in celeritate moderatos, vel tardos (non dicit esse in æquales) *cap. vero 4.* loquens de temperamentorum confusione, cordis & humorum, æqualiter se habente, moderatum dicit pulsus futurum in magnitudine, celeritate ac crebritate: postea statim quasi palinodiam canens, inquit, celeritari accedere incrementum, etiam si cordis caliditas non superet humorum frigiditatem, eo, quia cordis corpus sit ex calore ad motum vsque adeo proclive, ut cæteris partibus, semper celeriori reddat pulsus. Hinc infert primam pulsus mutationem fieri ad celeritatem, cum cor primario sit calidum, ad magnitudinem vero, aut frequentiam, cum secundario. Additque non ex aliena tantum, verum etiam ex propria sententia, pulsus celeritatem proprium esse cordis supercaliditatis signum, quod (ut antea dixi) est memorie mandandum: neque enim frequentia, aut magnitudo, perinde febrem demonstrant, quemadmodum ipsa celeritas. Sed hæc obitet.

Pulsus celeritatem esse cordis supercaliditatis signum.

Ad propositum redeunt, videtur Gal. loci citati voluisse, ex vnicò vsu nullum fieri pulsus inæqualem, sed æqualem, quandoque moderatum, nonnunquam immoderatum, cuius oppositum alibi expressissimis docuerat verbis.

Cum ergo varia sit hæc de re Gal. sententia, ut à contradictione vindicari possit, atque modus, quo inæqualis intemperies æqualitatem, & inæqualitatem faciat, cuique confisteret: Nos de inæquali intemperie ædifferentiis, breuiter quædam ad Gal. mentem præmittimus, in æquales pulsus ex his onudos adducemus: denique apparentem in Galen. contradictionem pro viribus tollere conabimur.

Quid Gal. in æquali intemperie memores assiderat.

Propria in æquali intemperie duplex.
A quoniam quædam intemperie magis, quædam minus pulsi.

In æquali intemperie nomine Gal. in his libris de præfag. ex puls. intelligit propriam & impropiam. Propriam illam interpretor, quæ ad qualitates spectat: impropiam vero, quæ ad alios vsus, nempe expurgandi fulgines.

Ad primam quod attinet, hæc adhuc in duas subdiuiditur: vna enim est simplex, altera composita: Et simplex quædam ex vnicâ constat qualitate: composita ex duplici; sed omnino contraria, ut est calida ac frigida, humida & siccæ: quæ propterea vni dici debet contraria, quam in æqualis. Sicuti prior vere in æqualis dicitur, cum in æqualiter partem occupet, hæc scilicet magis, illam vero minus. Ex hac ergo simplici in æquali intemperie semper in æquales sunt pulsus; & composita vero quandoque æquales, aliquando in æquales, ut suo docebimus loco.

Impropria in æquali intemperie duplex.

At si sistemus de in æquali intemperie improprie dicta, quæ potius in æqualis vsu dici debet, hæc quoque est multiplex, prout multiplices sunt vsus. Ex quorû ad inuicem commixtione, variz oboriri possunt pulsus in æqualitates; quas quidem omnes non recensimus, sed illas distinximus, quæ ad artem faciunt. Talis est in æqualitas, quæ sequitur vsum complicatum, ex necessitate refrigerandi vel calfaciendi, superante necessitate expellendi fulgines, vel è conuerso. Pulsus vero in æqualitatem, quæ sequitur ad in æqualitatem tantum expellendi fulgines, tanquam minime vtile dimittimus, eo quod in istis contingat, cuius differentie non innotescunt. De hoc ergo vsu nihil dicemus, sed dumtaxat de in æquali intemperie simplici, de eadem composita contraria, & de complicatione vsus calfaciendi, aut refrigerandi, cum vsu expellendi fulgines.

CAPVT XXXII

Quæ sit causa in æquali pulsus in vno situ, & in duplici loco.

In æquali intemperie duplex.

Demonstraturus quomodo in æqualis intemperies sit in æqualium pulsus causa, ab ea sumam exordium, quæ ex duplici contraria qualitate calida, ac frigida ortum ducit. Quæ ratione loci duplex esse potest: Aut enim in vnicâ parte organica vtrique hæc qualitas contraria vno & eodem tempore consistit: Aut vna qualitas est in vna parte, altera vero contraria in alia. Priorem nunc dimittimus, de ea infra dicturi.

Ad secundam vero quod pertinet, hæc adhuc in duas subdiuiditur: Etenim vel vna qualitas est in corde, altera vero in arteriis, vel vtrique est in arteriis, sed inter se distinctis.

Priorem quandoque docuit Gal. æquales facere pulsus, ut 3. de præfag. cap. 3. 4. ac 5. aliquando autem inquit fieri in æquales, ut eodem 3. de præfag. 4. circa initium. Nec tamen sibi contradicere: Etenim quâdo inquit æquali fieri pulsus ex hac duplici contraria qualitate, ad vnicum

A vnicum respicit locum, in quo quæritur ipse pulsus: Cum vero inquit esse inæqualem, ad duplicem respiciet locum.

Si enim tangantur arteriæ tantum, profecto ex contrariis qualitatibus, quæ sunt inter ipsas, & eor, fir moderatio quædam temperamenti, ex qua moderatus fir pulsus.

Quod si vno & eodem tempore manus eordi, & arteriis adinqueatur, in arteriis quidem moderatus, in eorde vero aut maior, celerior, ac frequentior, aut minor, tardior, ac rarior sentietur. Moderatus quidem in arteriis, tardior aurem ac minor in eorde, eum arteriæ sint calidæ, eor vero frigidius. Moderatus autem in arteriis. Sed in eorde celerior, ac maior, quando eor sit calidus, arteriæ frigidæ.

B Sed duo hac in parte quæri possunt: Primum est, quam ob causam contrariæ istæ qualitates faciant pulsum moderatum in arteriis, non etiam in corde. Etenim videtur ratio persuadere, tantum posse arteriarum qualitates moderare cordis temperiem, quantum cordis temperies arteriarum qualitatem. Cum tamen Galen. asserat, moderari temperiem in arteriis, in corde anrem minime: ideoque moderatum apparere in arteriis pulsum. Immoderatum vero & plane vtrium in corde. Hæc est prima dubitatio.

Secundo posset iure quis quærete, qui fieri possit, vt cor aliquando sit arteriis frigidius. Si enim est fons caloris, ratio sane dicitur, nunquam illud posse vicinis partibus esse frigidius: quod tamen Galen. loco citato asseruit.

C Ad primum quod attinet, dico non posse arterias perinde eor s intemperiem moderare, sicuti cor arterias, quod eor sit longe validius arteriis, vt non facile possit mutari, valeat tamen modare. Non inficior tamen, aliquando tantum posse arteriarum intemperiem, vt non modo cor moderari, verum etiam calidius, aut frigidius reddere possit. Hoc tamen raro contingit, & tunc tantum, cum intemperies fuerit maxima, arteriæ vero cordi valde proximæ. Et hæc de priori dubitatione.

Ad secundam vero quod attinet, dico, posse cor arteriis frigidius esse duplicem ob causam; vel quod primo, & per essentiam in sui ipsius corpore, cavitare, aut per eardio, frigidus, erudosque contineat fucos, vel quod eodem à iecore per eam vnam, aut à pulmonibus per arteriam venalem suscipiat. Tunc enim nihil prohibet, quominus arteriæ ex aorta dicentes ortum, sint calidæ, eum tamen cor ipsum sit frigidius. Dixi frigidius, non frigidum: Etenim cor viuente animali nunquam frigidum esse potest, sed in comparatione ad sui ipsius proprium temperamentum, atque ad arterias proximæ, frigidius nuncupatur. Igitur cor frigidius, arteriæ calidiores, pulsus parient in arteria moderatos, in eorde tardos, vt docuit Galen. 3. de præfag. puls. 4.

D Ex quo loco obiter monendum mihi videtur lecto, conferre à quando eum honeste fieri possit motum cordis, atque arteriæ simul vno eodemque tempore explorare, videbuntur enim propter inæqualem intemperiem, arteriarum pulsus non esse febriles, eum tamen febris addit, poterunt quoque moderati esse, refrigerato corde existente. Sed de his obiter. Venio ad aliam inæqualitatem, ratione duplicis arteriæ.

CAPVT XXXIII.

E De secunda inæqualitatis causis, quæ in duabus arteriis reperiuntur.

Alteram diximus reperiri inæqualitatem vniuersitatis, quæ in duabus diuersis arteriis, eodem tempore tactis sentitur, idcirco non innotescit, nisi in bina arteria pulsus eodem tempore exploretur. Huius causa est ipsarummet arteriarum intemperies inæqualis, vel propria & essentialis, vel communicata à duabus diuersis partibus, vel quandoque ab ipso tantum corde.

Propria, & essentialis est, quando illius brachii, quod tangimus, arteriæ sint calidæ, alterius vero frigidæ; commun- earum à duabus diuersis partibus, eum gratia exempli laborat iecur, non lien; vel lien, non iecur; vel iecur calida, lien frigida affectione. Tunc enim arteriæ, quæ è directo fuerint partis laborantis, vel hoe aut illo modo affectæ, calidiores, frigidiores, humidiores, sicciioresue redditæ, pulsus pariter efficiunt celeriores, aut tardiores, quam in opposita parte.

F Denique hoc ipsum quandoque fieri vnicui laborante corde inæquali intemperie, docuit Gal. citato loco, cum tamen non admodum rationi consentaneum videatur. Quomodo ergo voluerit Gal. hoc fieri, primum explicabo; quid deinde hac in re dubium faciat, subiungam: quæ demum ratione Gal. tueri possit apertam.

Vult ergo Galen. 2. de *præfag. ex puls. j.* arterias aliquando in æqualem recipere à cordis intemperiem, cum duplex quoque sit in corde contraria qualitas, quatum vnaquæque suas habeat arterias, quibus communicetur: Sic enim communicata caliditate quibusdam, frigiditate vero aliis, fit, ut calidiores celerius, frigidi ores serius moueantur, non ex propria tantum, sed ex inæquali cordis intemperie. Hoc voluit in illis verbis 2. de *præfag. ex puls. 7.* Neque vero mirum est, vel in æqualitatem vnius pulsus fieri ob cordis intemperiem: etenim partes arteriarum calidioribus eius partibus opposita, & calidiores fieri alius, & dilatabuntur magis, celeriusque mouebuntur, Frigidioribus opposita, & ipsa erunt frigidiore, & mouebuntur tardius, & minus dilatabuntur. Cum vero oppositum fuerit totum vni, calidioribus cordis partibus, tum celerius mouebitur, tum magis distendetur hoc, quam illa, quæ frigidioribus obiecta sunt. Hæc quidem Gal. quæ maximis sane inuoluta sunt difficultatibus.

Primum enim non concedet fortasse vnusquisque, posse vno & eodem tempore cor, duabus inter se apprimè contrariis qualitatibus tentari.

Secundo, dato quod hoc fieri posset: quæritur, quoniam in affectu id contingat: posset enim quispiam dicere, viuere animal non posse, corde duas insignes intemperies sustinente, cum vnica ut plurimum ægros præcipitet.

Sed & tertio apprimè difficile est consequi, qua ratione arteriæ duplices contrarias habeant pulsus, ob vnius cordis inæquale vitium. Non enim quædam ex vna, aliæ ex alia cordis parte oriuntur, sed omnes, quæ tangimus, ex aorta prodeunt, ut non videatur rationi consentaneum, has vno, illas alio mutari modo. Hæc sunt hæc in re dubia, quibus iam sigillatim occurrendum: Primum explicando quos modis duæ contrariæ qualitates simul stare possint: Secundo proponitam difficultatem enodando: Tertio affectus, per quos Cor in has contrarias incidat qualitates, enumerando: Denique omnes inæquales pulsus ex his oriundos, proponendo.

C A P V T XXXIV.

Quomodo duæ contrariæ qualitates, eodem tempore, simul reperiantur.

DVrum profecto pluribus videtur, duas inter se omnino contrarias qualitates, frigidam & calidam, humidam & siccam, eodem tempore simul stare posse. Hoc tamen Gal. docet, & ratio persuadet, Gal. quidem id aperte declarat, libro de inæquali intemperie, cap. postissimum 2. Idemque confirmat, & exemplo à corde desumpto illustrat, 2. de *præfag. ex puls. j.* & 2. & 3. de *præfag. ex puls. 4. 5.* Ratio autem duobus modis id fieri posse contendit: Vno quidem, cum qualitas fuerit positiua vna, altera priuatiua: Altero, cum ambæ sint positiuæ. Primo modo adest calor & frigus in febre marasmodi, in hydrope cum febre, in fluore hepatico bilioso, vel atrabiliari: adest humor & siccitas in hecica ventriculi, in hydrope ascite, & leucophlegmatia, cum febre pantheræcica, aliisq; id genus affectibus: Hoc modo non inconuenit, vnam eandemque partem similem duplici hæc intemperie laborare, sed de hac non loquimur in præsentia. Illa enim intemperies, quæ caloris aut humiditatis defectum in corde significat, non pertinet ad vsum, sed ad facultatem, quia temperamenti robur destruit.

Secundo autem modo, duæ simul reperiuntur contrariæ qualitates positiuæ, non in vna & eadem parte similari, sed in organica: Cuius cum varix sint similes partes, aliæ internæ, externæ aliæ, possunt sane contrarias aliquando fortiter intemperaturas. Et sane, si quæ est pars huic inæquali intemperaturæ subiecta, ea est cor. Non tamen quod dissimilares sit, quantum quod cum pluribus partibus communicationem habeat, quæ longe contrariis inter se militat temperaturis. Communicat enim cum iecore, atque venis omnibus per cauam venam: communicat cum pulmonibus, atque aere externo, per asperas, leuesque arterias: cum pericardio, quia in eo continetur, cum aorta, omnibusque arteriis, atque cum vena arteriosa, quæ cum eo fert principium. Ab his ergo omnibus partibus, aut materiam suscipit, aut qualitatem, aut vtrumque: Materiam quidem à iecore, à toto, à pericardio, & à pulmonibus: Qualitatem tantum ab arteria aorta, & vena arteriosa, quia ab his nil vel parum potest in eor iterum remeare.

Si ergo per tam varia loca, per tot diuersas materias cor alteratur, quid mirum, si aliquando in vna parte fuerit calidius, in altera vero frigidius: in hac humidius, in illa siccius? Poterit sane: Nec quempiam aduersus hoc acriter pugnaturum mihi persuadeo.

Maius faceret negotium, quod antea proposuimus, quomodo scilicet Cor in æquali

hæc

Deus intemperie duas qualitates simul habet posse.

Calor & frigus in uno respondet, in hydrope seu hepatico.

In organica parte duas contrarias qualitates positiuas simul reperiuntur.

Quomodo iterum iterum communicat, & cum aliis partibus.

A hæc donatum intemperie, arteriis inæqualitatem afferat, cum omnes arteriæ, quas tangimus, vnicum habeant principium, nempe aortam, quæ ex sinistro tantum sinu emergit. Huic dubitationi, vt respondere possim, illud mihi in mentem venit, quod quotidie in clinicis nobis obseruamus, magna scilicet ex parte, in his fieri sanguinis fluxiones *aut æquæ, tamen* Solent Hippocrati aut æquæ nulla sit vena, quæ recta linea à liene ad nares tendat: illa itaque eadem caula, quæ facit, vt venis omnibus ex eodem ortum ducentibus, laborante tamen liene, fiat sanguinis è narè sinistra effluxus, eadem quoque erit causa, cur ex vna cordis parte, alio atque alio modo intemperata, varia fiat in arteriis motio. Communicatur enim vapor quidam inæqualis, frigidus his, calidus autem aliis, ob quem hæc celerius, illæ autem ferius mouebuntur.

Ex quibus patet, quomodo duplex contraria qualitas vno & eodem tempore cor occupare, quomodo inæqualiter arterias efficere: quomodo denique primam hanc pulsuum inæqualitatem, in tangendis variis arteriis perceptam, parere possit. Vtrum vero eadem alios quoque pariar inæquales, & quos, declarabimus in sequentibus.

CAPVT XXXV.

Qua sit causa disparitatis inæqualiter factæ, in vno ictu.

Inter pulsus inæquales, qui ex inæquali cordis intemperie duplici, ac contraria ortum ducent, sunt quoque disparēs in vno ictu inæqualiter tamen, & sine vlla Arithmetica proportionē, ab vno extremo in aliud tendentes. Horum causam asserimus non esse aliam, quàm duplicem hanc qualitatem in corde vno & eodem tempore inuentam, cuius

Elam antea meminimus.

Etenim quatenus calida adfir intemperies, distentionem oportet celerrim fieri: quatenus vero frigiditas vrgeat, opus est eandem mutari vel in ipso distentionis initio, vel in medio ictu, vel in fine, vt tarditas aliqua appareat. Hoc docuit Gal., *de præfag. ex puls.* his verbis: *Quinetiam citra interpellatam distentionem, qui inæquali representantur tarditate & erubritate, plane etiam hi, præter alias, à quibus gigni eos demonstrauimus, & hanc causam obtinebunt, de qua sermo habetur, inæqualem cordis intemperiem: si quando inter se adeo contendunt calida partes cum frigidis, vt subsistere interdum necesse habeant calida retenta à frigidis: interim celerius frigidæ moueri à calidis attractæ.*

Hæc quæ Gal. docet, dubio non carent, longioreque egent interpretatione.

D Primum autem, illud apprimè videtur difficile, posse in vnicò pulsu celeritatem, ac tarditatem cadere. Cum enim celeritatem hanc supponat Gal. esse febrilem: quod ex eo reddetur manifestissimum, quia (vt inferius demonstrabo) Gale. ipse hanc vnius ictus disparitatem, vocauit febrilem inæqualitatem: qui quæso fieri potest, vt pulsus ex calore febrili celer, in eadem distentione tardus euadat, mox iterum quandoque celeritatem recuperet? Nonne certum est tarditatem esse frigiditatis propriam, nonne Galen., quoque in hoc laborat, vt ostendat, motum celerem ideo fieri tardum, quæd partes frigide cogant illum subsistere? At si hæc vera sunt, eritne ergo febris passio mixta ex calore & frigore in eodem temporis momento? recedatne calor in vnica distentione à corde, cum tardus sit motus? Quod si recedat, quomodo statim redibit? & si redeat, quomodo iterum statim recedet? Hæc mihi persuadent, nomen tarditatis à Galeno non accipi pro vera tarditate absolute accepta, sed pro comparatiua, accepta scilicet in relatione ad reliquas motus partes, qui multo sint celeriores. Vt sit sensus, quasdam distentionis partes esse admodum celeres, alias vero ita remissas in celeritate, vt in illarum collatione tardæ dici possint.

Erum statim recedet? Hæc mihi persuadent, nomen tarditatis à Galeno non accipi pro vera tarditate absolute accepta, sed pro comparatiua, accepta scilicet in relatione ad reliquas motus partes, qui multo sint celeriores. Vt sit sensus, quasdam distentionis partes esse admodum celeres, alias vero ita remissas in celeritate, vt in illarum collatione tardæ dici possint.

Neque vero quis statim obiciat, non fore diuersam inæqualitatem hanc ab æqualiter dispari. Dico enim vnā ab alia differre, quod in priore celeritas affatim mutetur in valde minorem celeritatem, aut ex minima affatim transeat in maximam: in secunda vero sensim, paulatim, ac quasi per gradus numerosque Arithmeticos celeritas augeatur vel minuat.

F Hoc ergo sic exposito, aliud quoque in eadem hac parte remanet explicandum. Docet Gal. disparē hunc pulsum inæqualiter fieri à duplici qualitate inuicem pugnante, in corde inuenta; At vero idem docuit, ex hac ipsa inæqualitate illam emergere, quæ in duabus diuersis arteriis feritur, quomodo ergo eadem inæqualis cordis intemperies, nunc disparēs inæqualiter in vnica arteria, nunc vero inæquales tantum ratione diuersarum arteriarum pulsus pariet.

*Inæqualis
cordis intem-
peries tripli-
ter accipi-
tur.*

Pro huius dubii solutione dicendum, Inæqualem cordis intemperiem tripliciter accipi, vel vt vtraque intemperies est facta, vel vt vtraque est fiens, vel vt vna est fiens, altera facta.

Primo modo, nunquam sunt dispares. Etenim cum robur facultatis exposcant, non potest in duplici facta cordis intemperie robur facultatis inneri: Nihil tamen prohibet, quominus duplex in duplici arteria inducatur intemperies, de qua antea diximus.

Secundo modo dispares isti apte admodum fieri possunt, cum in intemperie fiente robur facultatis optime stare possit.

De intemperie partim facta, partim fiente, aliqua est dubitatio. Si enim vtraque sit præter naturam, sane nunquam ex hac poterit fieri pulsus dispar.

*Intemperies
præternatura-
ra itaque vir-
tutis dissoluit.*

Etenim facta intemperies præternaturam, siue vnica, siue duplex, semper robur virtutis dissoluit, vt non possit magna fieri dissensio: Quod si facta intemperies sit adhuc intra limites sanitatis, siue vero sit præter naturam, non erit ab re arbitrari, ex his quoque disparem inæqualiter fieri. Rem ita esse, tunc omnes concedent, cum affectus intellexerint, in quibus disparitates istæ inæqualiter factæ inueniuntur, de qua re in capite sequenti.

C A P V T X X X V I.

In quibusnam affectionibus dispares pulsus inæqualiter inueniantur.

Disparium pulsuum inæqualiter, quosdam diximus fieri ex vtraque cordis intemperie inæquali fiente: alios vero, partim ex facta, partim ex fiente.

Ad primos quod attinet, reperiuntur hi, in omnibus febribus putridis nothis, compositis, pituitosis, ac melancholicis, in Epialis, ac Lypitidis non pesseris, atque omnibus quæ nonnulla habeant connexa symptomata, refrigerationem inducentia, vt sopores, syncopas humorolas, vteri strangulatus, ventriculi anxietates, & alia id genus. In his posse dispares istos reperiri, docet ratio, atque ex parte Gal. autoritas.

Ratio, quia adest robur facultatis, ex vna parte, & inæqualis vsus in corde, ex alia.

Adest robur facultatis, quia nulla ex prædictis febribus est hectica, ergo non est intemperies facta.

Ad hæc nulla habet focum in corde, aut partibus cordi valde proximis, quia non est continens, sed Periodica, ergo neque potest facile cordis robur dissolvere. Patet ergo virtutem consistere posse, ex qua magna fiat dissensio.

*Cur in no-
tha febre sit
inæqualis &
fuit.*

Ex alia vero parte inæqualem adesse Vsum, inductione patet. Etenim notha febris ac composita, ex omnium sententia habet frigidi, ac calidi humoris mixtionem, ergo & inæqualem vsum.

De melancholica, ac pituitosa, idem probat: Etenim in neutra ex his febribus, totus humor simul, & æqualiter accenditur, aut putrescit, imo vero admodum inæqualiter, vt vna pars manifeste calida, alia vero conspicue frigida reperiatur. Neque vero exist. nec quispiam in Epiala tantum hoc reperiri: Nam etsi in Epiala propter vitreæ pituitæ frigiditatem, non modo humoris pars maneat tempore putredinis imputrida, sed & suam frigiditatem fortiter admodum in corpus imprimat: non tamen ex hoc sequitur, quin alius quiuis pituitosus succus putrescens partes quasdam semper non retineat imputres, ac frigidas, quoniam, vel quod in toto corporis ambitu non sint dispersæ, vel quod sint minus frigida, quam in vitreæ pituitæ, rigorem, ac frigiditatem Epialæ similem inferre non possint. Testem huius rei habeo Gale. 2. de diff. feb. x. qui causam reddens, cur in Quotidiana inæqualitas quædam caloris appareat, inquit hoc fieri ex caloris & ebullitionis inæqualitate: Eleuari enim agente calore in humorem, frigiditate visciditatisque donatum, bullas quasdam, ex quibus dum calor erumpit inæqualiter, quasi per cribrum quandam transiret, tactum nostrum ferit. Quod si inæqualis hic calor ex Gal. mente ad eum peruenit, quis quæso ibit inficias, eundem, eodemque modo, cor ipsum petere? At si hoc modo petit, ergo dissensionem faciet celeritate inæqualem, vt nunc explicamus. Ex quo sequitur inæqualem esse in pituita omni putrescente calorem.

At vero nec minus inæqualem esse debere in melancholica, ratio ipsa conuincit. Cum enim frigidus ac terrestris sit humor iste, æquali accensione sane admodum est ineptus: Hinc Gal. primo ad Glauco: apertissime quarianis hanc tribuit inæqualiter factam disparitatem, quam in aliis non ita aperte explicuit: Inquit enim Iaso citato, in Quattanis

vni-

A Vnius ictus inæqualitatem adesse, in qua prima, ac postrema distentionis pars sit celerior quam media. Cum autem hoc non ob aliam fiat causam, quam quod non æque sint calidæ omnes melancholici humoris partes, sequitur statim, omnem febrem, quæ vel ex humoris inæqualitate, vel ex inæquali putredine, vel ex inæqualitate, quam possunt inferre quædam symptomata, habeat inæqualem hunc usum, eandem necessario inæqualitatem inæqualiter factam statim habituram. Hoc autem ex eo potissimum confirmatur, quod Gal. inæqualitatem vnius ictus primo illo ad Glau. 5. ac 6. & alibi vocet febrilem, Febrilem intelligo, quæ omnes sequatur febres, cum inæquali intemperie.

*Primo ictus
inæqualis
in quartana.*

B At vero cum vnius ictus inæqualitas triplex tantum sit, interrupta scilicet, ac duplex dispar, necessum est vnam ex his conuenire febribus iam propositis; Non potest autem conuenire dispar æqualiter, quia illa sequitur vnicam intemperiem, non duplicem, vt mox ostendam. Erit ergo aut dispar inæqualiter, aut interrupta: sed sic est, quod interrupta ex usu procedens, non differt à dispari inæqualiter, nisi loco, aut secundum magis & minus. Ergo tandem concludendum, hanc inæqualitatem esse febrium propositarum maxime propriam.

*Primo ictus
inæqualis
triplex.*

Quod autem propositorum symptomatum ratione fiat, & authoritas & ratio suadet.

Ratio quidem, Etenim proposita symptomata sapiunt naturam frigidam, comata inquam, syncope humorosa, anxietas ventriculi, & alia id genus.

C Ex alia parte febris est calida, vtræque affectio suas communicat vno & eodem tempore cordi qualitates: oportet itaque disparitatem subsequi, inæqualiter tamen.

Hoc ipsum sentire Gal. ex multis quidem locis confirmare possem, sed vnus sufficiat 3. de praesag. ex puls. 7. vbi aperte docet, ex omni refrigerante causa, siue à toto corpore, siue ab ore ventriculi, siue ex timore, aut morore procedat, pulsus fieri tardiores: At si hæc incidant febris tempore, quis quæso inficiabitur distentionem alioquin celerem, statim non posse vsque adeo mutari, vt tarda videatur? nemo vt arbitror. Hi ergo sunt affectus, per quos potest distentio inæqualis inæqualiter fieri. Ex quibus facile vnusquisque specifi- cas poterit huius specifice inæqualitatis causas inuenire.

D Cum enim horum disparium pulsuum, quidam habeant duo, quidam vero tria tempora: Qui sunt in febribus nothis, aut compositis, duorum tantum, qui vero in pituitosis, ac melancholicis, tria habebunt.

Ratio est clara. Etenim vbi ad sit aliqua bilis portio, semper breuior aderit distentio, quam vbi non ad sit: At vero in nothis atque compositis aliqua adest bilis portio, ideo breuior in illis erit distentio, quam in quotidianis, ac quartanis. Brevis autem distentio in duorum tantum, longior in tria potest diuidi tempora: vt ex eodem Galen. 1. ad Glauco. 6. colligi potest, itaque illæ duo, hæc tria habebunt in vnicâ distentione tempora.

Rursum autem cum horum disparium quidam sint in principio celeriores quam in fine, alii vero è contra: priores minorem, reliqui maiorem annunciant caliditatem.

E Idipsum de illis dico, qui in tria diuiduntur tempora: Hi enim si principium ac finis sit celer, media motus pars tarda, ostendunt magis vrgere calidos, quam frigidus humores; contra vero, si velox sit media, tardæ autem extremæ motus partes, frigiditas calorem vincit. Et ex his quidem non modo febrium species, sed & loci affecti, imò vero, quod maius esse putro, varias febrium tempora, multiplex quoque putredinis modus aut commixtionis humorum gradus, diuersa quoque symptomata, colligi possunt. Et de locis quidem affectis postea. Nunc autem quod ad reliqua pertinet, primumque ad dignoscenda febrium tempora me conuerto.

*Quoties
febris
diagnoscitur.*

Febris ergo principium cognoscetur, si tarditas superet celeritatem, augmentum, si celeritas superet tarditatem: status, si celeritas iam ex roto tarditatem vicerit.

F Idipsum de vario putredinis modo dictum volo. Si enim celeritas longe superet tarditatem, maior est putridi quam impuridi humoris portio, si contra, impuridus putridus puri: dum superabit.

*Modus
diagnoscendi
gradum
mixtionis
humorum.*

Mixtionis quoque humorum gradus sic dignoscetur. Nam si bilis superet, celeritas quoque tarditate erit superior, si pituita, aut melancholica præcipue impurida, tarditas celeritatem vincet.

Symptomata quoque proposita plus posse, quam febrem, ex eo reddetur conspicuum, si celeritatem maiori ex parte in tarditatem mutauerint,

Mo.

Moneo autem hoc etiam loco, tarditatis nomine in prædictis febribus me fere semper A
per minorem intelligere celeritatem, non positivam tarditatem.

Dixi *ferè*, non semper, quia symptomaticum actionem excipio, quam sane aliquando istam esse scio, ut veram inferat in febribus tarditatem, quem admodum in syncopali humorosa videre licet. Et hæc de disparibus inæqualiter cum febre.

Sed & sine febre quandoque fieri posse, non recuso, dum causæ quædam nec naturalēs vno & eodem tempore calidæ ac frigidæ in corpore inveniuntur, aut una quidem, calida scilicet, sit non naturalis, altera vero nempe frigida, præter naturam. Tunc equum febris nulla quidem aderit, eo, quod causa calorifica non sit præter naturam, pulsus tamē ratione causæ frigida erit præter naturam. Porcit hic pulsus quandoque reperiri in intemperie frigida cerebri, pulmonum, ventriculi, cum materia multa pariter frigida, accedente tamen motu violento a nimo, aut corporis, balneo, medicamento vel calido, aut alia consimili causa cordi communicata. Nihil enim prohibet has causas disparē inæqualiter facere.

Sed quia dictum est aliquando ex facta & fiene quoque intemperie invicem mixtis posse hos gigni pulsus, quomodo hoc quoque contingat, paucis explicabimus, mox expositis affectis locis, huic parti finem exponemus. Demus ergo aliquam esse vitiosam cordis intemperiem, naturalem tamen siue calidam siue frigidam: Hæc siue est facta: Accedat huic opposita fiens, poterit sane disparē efficere. Sed non est, quod de his inquirendis admodum sumus solliciti. Satis est causas & affectus morbosos, ex quibus pulsus isti oriuntur, invenire, reliquos in eam tantum finem sciscitari debemus, ut morbosos à non morbofis distinguamus. Quam siue distinctionem aliarum actiones læsæ, excrementaque ac qualitates mutaræ facile docebunt. His sic expeditis, iam quod sumus polliciti, præstabitur, ut scilicet de locis patientibus per hos pulsus inveniendis, aliqua etiam breviter dicamus. Primum quidem illud pro constanti habendum, in nullo dispari iam proposito, focum febris esse in ipso corde. Ratio est in promptu, quia virtus constat, in temperies non est facta, facultas non admodum gravatur, quia non interruptitur motus, oportet ergo materiam esse extra cor. Ceterum à corde non potest longe distare. Etenim quæ longe distat, facit potius disparēs in acervo, quam in vno ictu, oportet ergo, ut sit propinqua, vel saltem in loco, cui cor facile consentiat.

Locus valde propinquus sunt pulmones, pericardium, septum, mediastinum, membrana succingens costas, & aliarum similes. Loci autem, quibus cor valde consentit, sunt cerebrum, lien, iecur, ventriculus, veterus; itaque ex horum locorum affectionibus propositis, poterit fieri pulsus dispar inæqualiter.

Dixi *posse*, non autem necessario fieri talem: quia ex iis ipsis locis & affectionibus poterit quandoque interruptus oriri, quandoque vero dispar tantum in acervo, prout causæ magis aut minus in cor ipsum operentur, ut infra ostendam.

Sed dicet quispiam, si ex his locis sit dispar pulsus in vno ictu, quomodo ergo Gal. 2. illo de præfug. cap. 2. dixit disparē fieri ex inæquali cordis intemperie? Non enim v. de biur hæc esse cordis, sed aliarum potius partium inæqualis intemperies?

Respondeo, inæqualem cordis intemperiem esse duplicem, fientem, ac factam. Fiens adhuc vel est primaria, vel secundaria. Primaria habet focum in corde: secundaria vero ex his locis oriri potest, quos iam recensuimus. Veniamus modo ad disparē æqualiter, E

CAPVT XXXII.

De causis disparitatis æqualiter factæ in vno ictu.

Quæ de inæqualitate dispari inæqualiter dicta sunt, (ni fallor) nobis aditum præbent facilem ad discendum, quomodo fiat disparitas æqualiter. Cum enim in hac transitus minimi fiat ab extremo ad extremum, sed tantum gradus quidam vnius qualitatē magis aut minus intendi videatur, hic non potest sequi duas omnino inter se contrarias qualitates, sed vnicam, eo, quem nunc exponam, modo.

Cum ergo fiat pulsus dispar proportionabiliter ex intemperie vnicâ, nempe vel frigiditate, vel caliditate, siquidem fuerit frigiditas, vel sensim ac paulatim augetur, vel sensim ac paulatim diminuitur.

Si primo modo, sit pulsus tardus, dispar, cuius finis tardior erit principio.

Si vero secundo modo, principium erit sine tardius.

At

- A** At si fuerit caliditas, pari ratione, vel intenditur paulatim, vel paulatim minuitur: Si paulatim intendatur, sinus distoles erit celerior principio. Si paulatim minuat, prius erit sine celerius. Et haec me etiam non loquente patet, has interperies non esse factas, quia suscipiunt magis ac minus. Nil tamen prohibet, quominus sint cordi essentiales, ac primariz. Cum enim non diu eot ipsum obsiderint, possunt primario ibi insidere, nec tamen facultatis robur destruere: Sunt tamen maiori ex parte aut secundariz, aut per consensum. Consensus autem ab illis ipsis est locis, quos antea recensuimus, *in caput. de diff. paribus inaequaliter*. Erunt enim omnes thoracis ac capitis partes, lien, ventriculus, iecur, & vterus. Hi enim loci propter viciniam & vasa communia, possunt facile, ac breui suas eorundem, tam simplices, quam compositas communicare qualitates. Quomodo itaque fiant hi
- B** pulsus dispares aequaliter, & ex quibus locis satis declaratum est: Nunc vero de affectionibus agendum.

CAPVT XXXVIII.

In quibusnam affectionibus fiant pulsus dispares aequaliter.

- D**isparium pulsuum aequaliter quosdam diximus esse tarditate, alios vero celeritate inaequales. De his, qui sunt tarditate inaequales, pauca dicemus: de reliquis plura.
- Cum enim priores sint absque febre, quia ubi non adest celeritas, neque adest calor: sint quoque absque vlla alia magna cordis intemperantia, quia interperies non est facta, sed fians, sint denique absque vilo affectu cordis instrumentario, quia nulla est interruptio, intermissio, aut alia inaequalitas, quae instrumentarium ostendat morbum: sequitur ex his, inaequalitatem hanc tarditatis, nullum sequi usque adeo magnum morbum, qui patientem cogat ad vocandum Medicum: itaque haec pulsus differentia, raro admodum cadet sub notitiam Medicum. Si aliquando tamen sentiat, ea, ut arbitror, non potest istam sequi causam, quam morborescentem, aut timorem ingentem, ac diuturnum, frigiditque cibi, potus, aut medicamenti interni, vel externi immodicum usum, aerem qui ipsum inspiratum appetit frigidum, otium, somnum prolixum, retentaque in capite, pulmonibus, ventriculo, intestinis, liene, vtero, iecore, aliisve id genus partibus pituitosa, aut melancholica, non tamen putrida excrementa.

Quae causas sequuntur inaequalitatem tarditatis.

- Haec, cum cordis temperiem adhuc minime vitiauerint, sed tantum ad illam frigidam reddendam omnes suas vires intendunt, necessum est tardum fieri pulsuum, quia interperies, quae introducit est frigida: Inaequalis vero, quia non tota simul fit, interperies, sed per partem post partem. Denique aequaliter, quia pars, quae alteratur, est solida cordis substantia, & causa, quae alterat, non est materia, sed qualitas, quae assatum non agit, sicut materia, quae, cum moles, ac pondus accesserit, interruptionem pariet, ut suo ostendam loco. Haecenus de causis & affectibus inaequalis tarditatis in vnicuique distole.

Quod si adsit inaequalis celeritas, aequaliter tamen, seu proportionabiliter facta, tunc alias sequitur causas, & affectiones multo frequentius Medico occurrentes.

- Missis enim nunc causis non naturalibus, quae parum referunt, Ex causis praeter naturam sequitur febres omnes ephemeraz, ac putridas simplices, & exquisitas biliosas aut sanguineas, benignas, continuas, ac periodicas, non tamen symptomaticeas vocatas: quorum omnium reddetur ratio, postquam auctoritas non est ita in promptu.

Sequitur haec disparitas febres, quae est disparitas celeritatis, praeter naturam. Omnem vero celeritatem praeter naturam febrem esse, docuimus antea, & docebimus quoque in posterum.

Sequitur quoque ephemeraz omnes. Etenim cum ad hanc disparitatem inducendam requiratur calor inaequalis in corde, & robur facultatis, ex quo possit fieri magna distole, nulla profecto est febris, in qua duo haec simul reperiantur facilius, quam in ephemeraz. Addidi vero ephemeris simplices & exquisitas biliosas, ac sanguineas benignas, quia

Omnis celeritas praeter naturam est febris.

- F** in his quoque prout simplices sunt, calor tantum abundat, prout benignae, robur facultatis permanet.

Posuimus autem in hac classe continuas continentes, quia tam sanguineae, quam biliosae, sunt aliquando ex humoribus tantum ebullientibus, non ex putrescentibus exarant: in quo casu facultati iniunxerunt sensum: Quando autem ex putredine fiant, non statim ab initio eorundem temperiem corrumpunt, sed progressionem temporis tantum, ut

H apud

apud Galenum *ix. meth. 3.* colligi potest qui propterea nos ad mittendum sanguinem sollicitat, antequam putredo incipiat, vel augeatur.

Ex periodicis autem symptomatibus illas excludimus, quæ inflammationes partium, aliosue id genus morbos sequuntur; Etenim in his disparitas non ex simplici calore, sed ex instrumentis quoque compressis, grauique facultate ortum ducit: de qua composita ea faciemus infra. Nunc autem cum satis superque causas, affectusque omnes præter naturam exposuerimus, simul cum suis locis affectis, ex quibus fit eeleritatis disparitas in vnicuique, ex quibus patent quoque cuiusque specificæ differentia huius inæqualitatis causæ, reliquum est, ut conclusionem quandam ex dictis colligamus, ætâquam dubiam, comprobemus: mox vero ad interruptos descendamus.

*Disparitas
non diastole
systole.*

Quod ergo ex dictis colligimus est, inæqualitatem, quam Gal. *1. ad Glau. 5. ac 6.* vocat propriam febrem, nullam esse aliam, quam disparem istam vnius ictus, siue æqualiter, siue inæqualiter fiant. Cur sic credam, in sequenti capite exponam, aliorum prius adductis, reiectisque opinionibus.

C A P V T XXXIX.

Quid sit febris inæqualitas.

Non semel profecto meminit Gale, febris inæqualitatis, nam *1. ad Glau.* de tertiana intermit. verba faciens, inquit, quod si interualli tempore iam quiescit homo à febre, relinquatur tamen propria febrium inæqualitas, in tertiarum motu, tunc certum esse tertianæ feb. indicium. Hæc cum dixerit Gal. plerisque impulsit ad querendum, quænam esset hæc propria febrium inæqualitas, Diximus nos esse vnius diastoles disparitatem. Quid alii hæc de re sentiant, nunc breuiter recensendum, refutandumque, nostra autem sententia confirmanda.

*Quid febris
inæqualitas
sit.*

Quidam putant febrilem dici inæqualitatem illam, quæ attenditur penes systolen ædiastolen: Cum enim diastole possit esse celerior systole, ac vicissim systole ipsa diastole; Hanc dicunt febrilem esse inæqualitatem. Est vero celerior systole ipsa diastole in principio, & incremento febris: contra vero diastole ipsa systole, in statu ac declinatione. Toto, ut aiunt, cælo decipiuntur isti, neque Gal. sententiam considerant, quam adduximus, adducemusque.

*Febris inæqualitas
etiam in
ephemeris
reperiatur.*

Primum quidem inæqualitas hæc febrilis est etiam in ephemeris, ergo non est illa, quæ cadit inter systolen ac diastolen. Consequentia est clara: quia cum in ephemeris non sit putredo, semper diastole est celerior systole. Quod vero in ephemeris addit hæc inæqualitas, patet ex Gal. *1. ad Glau. 3.* qui loquens de ephemerarum pulsu, inquit illas cognosci ex pulsu, qui vel non sit inæqualis in vno ictu, vel quam minime. Ecce Galenum non esse ausum expungere prorsus vnius ictus inæqualitatem ab ephemeris. At si conuenit vnius ictus inæqualitas ephemeris, nunquam sane erit interrupta, ergo dispar, & potius æqualiter, quam inæqualiter.

Præterea si hæc inæqualitas esset illa, quæ cadit inter systolæ ac diastolen, non diceret Gal. *1. ad Glau. 5.* tertianas interualli tempore adhuc propriam retinere feb. inæqualitatem: Tempore enim interualli non adest diuersitas systole à diastole, cum tamen possit eo tempore adhuc inæqualis adesse intemperies, quæ ipsam diastolen adhuc inæqualiter moueat, hancque diastoles disparitatem & inæqualitatem pariat. Hoc ipsum aperte docent Galen. verba *1. ad Glau. 6.* ubi scribit: *Et ipsius vnius motus inæqualitas in quartana febre, eius formam ostendit, nam quæ omnibus communis est febribus, in vno pulsu arteria inæqualitatem, in hac manifestissime comprehendere licet: multo enim velocius principium, finemque motus inuenies, quam medium. Non tamen in tertiana ita se habet, breuis enim in ipsa est velocitatis excessus, & præsertim inconfidentia.* Si quis profecto accurate hæc verba perpendere voluerit, vique adeo aperte colliget, propriam vocaram febrilem inæqualitatem non aliam esse, quàm vnius ictus, ut alia non indigeat probatione. Et quamuis illam tertianis non perinde, atque quartanis in eo cap. *6.* tribuisse videatur, imo vero *2. de cris. 3.* à tertianis illam prorsus ablegasse visus sit: at amen cum *1. ad Glau. 5.* eandem apertissime tertianis concedat, existimandum Galenum, si alibi id negauerit, reuera non negasse, sed hoc rantum quod *2. de feb. diff. 3.* de ephemeris dixerat, voluisse obscuram scilicet in his hanc esse vnius ictus inæqualitatem, vique sensibilem.

Cur autem in his fere sit insensibilis, in quartanis vero ac quotidianis conspicua,

non

A non est arduum explicare: Cum enim in ephemeris, & sythetis tertianis calor sit purus, ac facile accensus, breuemque faciat distentionem, brevis autem distentio in tres non possit diuidi partes, ut duæ extremæ sint celeres, media vero tarda, sequitur disparitatem in his valde occultam esse. In quattranis vero, ac quotidianis, quarum calor non ita cito accensus, longior em facit distentionem, potest media illius pars aliquanto esse tardior principio ac fine, ut hinc in his sit elata hæc vnus ictus inæqualitas, in aliis autem obscurior. Ergo nunc receptui hac in parte canentes, disparem celeritate pulsum, æqualiter in vno ictu fieri ex calida intemperie inæqualiter corpus cordis occupante, ut in ephemeris, biliosis, sanguineisque continentibus, ac synceris tertianis: disparem vero inæqualiter, ex duplici contraria: ambæque dici proprias inæqualitates febiles, quemadmodum quoque censuere Tlincavellius atque Christophorus à Vega, in expositione librorum de febrium differentialis.

CAPVT XL

De pulsui interrupti causis.

Quænam interrupti pulsus nomine, illum præcipue intelligamus, qui in media distentione subsistit, mox ad motum reuertitur, vel priore maiorem vel minorem. At tamen præter hunc, alios quoque duos Galenum retulisse inuenio, quorum omni meministi. *de prasag. ex puls. 2.* Ibi enim præter illum, qui in medio subsistit, alium recenset, cuius vltima distentionis pars, simul cum externa quiete, amittitur: Tertium vero, in quo quies tantum externa. Scio Struthium hos retulisse ad Dicrotos, sed quam bene in factum fuerit, alii iudicent. Nos, qui antea illius opinionem refutauimus, idem hoc loco asserimus, ad interruptos, non ad Dicrotos spectare. Horum ergo causæ queruntur.

Cerum ictus à Gal. alius non repetitur, quam inæqualem vsuum. *Dial in Galenæ* quia illam ingeniemus tam horum, quam d. erorum causam, quam in parte, vbi de dicrotis agemus, proponemus. Nunc vero ad inæqualem vsuum à Gal. adductum, quod attinet, illum dupliciter accipi inuenio; vel pro duplici contraria qualitate calida, ac frigida, vel pro calore, ac fuligine, eodem tempore eor obsidente. Hunc vtrumque interruptorum esse causam, ea, quæ Gal. *2. de prasag. ex puls. 7. & 8.* scripta reliquit, aperte deciderant. Cum enim in *capit. 7. principio*, de his ex professo tractare instituisset, statim inquit, hos fieri ex inæquali cordis intemperie: Et paulo post, explicans qualisnam hæc sit inæqualis intemperies, inquit eam esse, cum aliquæ cordis partes sunt calidæ, aliquæ frigidæ, quædam mûdæ, quædam fuligine pleni: concluditque ex hac duplici inæqualitate, motum vario modo interrumpi: ut verba, quæ *sub finem capit. 7.* de his in interruptis scribit, aperte docent: hæc enim habet: *Item vero etiam in ipso corde, omnibusque præterea arteriis, ex inæquali illius visceris intemperie, plures in vna distentione motuum differentia prodibunt, partim illam ad celeritatem conatantium: partim morari cogentium, adeo ut etiam in medio interim ascensu subsistat.* Et in *principio 8. capit.*, in horum explicatione pergens, sub titulo Caprizantis, manifeste ostendit, huius causam esse: primumque inæqualitatem inter vsuum refrigerandi, & exputgandi stiligines, sic dicens: *Nam si vna contingat, ut quædam omnino sint præcalida, alia sumosa fuligine*

E præfocentur, ad contrarios proficiunt motus, ut altera distentionem moliantur, altera concidant.

Huic causæ ergo sane libenter subscribo, qui illam rationi consentientem inuenio. Etenim fuligo valde abundans, potest facere contractionem, nec tamen vires imminuere. Cum autem vrget fuligo, virtusque valet, nil prohibet, quo minus facultas post interruptionem, motum denno recuperet: Sed si fetmo sit, de alio duplici contratio vsu, non facile assequor, quomodo ex eo pulsus semel interruptus, pluriorem valeat recuperare motum. Etenim vel duplex hæc intemperies est facta, vel siens, vel vna facta, altera siens.

Non potest esse villo modo facta, quia facta omnis, ac vitiosa intemperies totum facultatis destruit, quo ruente, magna nunquam fiet distentio, ut in duo diuidi possit tempora.

F Neque possunt esse ambæ scientes, quandoquidem, ex his diximus fieri dispartes inæqualiter.

Quod si quis dicat, non inconuenire, ex iisdem causis ac morbis, ex quibus fiunt illi dispartes, fieri quoque interruptos: Respondemus id minime fieri posse; Etenim cum de his disparibus sermo fieret, ostendimus illam disparitatem nūquam in febribus esse mutationem à celeritate in positivam & absolutam tarditatem, sed duntaxat à celeritate ma-

iore in valde minorem : At vero si ex istis causis ac morbis fieri concederemus interruptionem, ex quibus disparitas sequeretur distentionem, nedum minus celerem, sed & omnino tardam reddi. Nam si interruptatur, tardiores sane fieri necesse est. At si hoc concedamus statim in illas incidimus angustias, quas tunc proposuimus, febrem scilicet momento temporis adfuturam ac recessuram : Aderit enim celeritatis tempore, non aderit eum tarditate, ob refrigerationem succedente. Hæc quantum à ratione distent, nemo non intelligit.

Præterea quæro, quæ sit causa huius tam insignis refrigerationis, quæ possit interruptionem efficere? Aut enim erit materię copia, aut qualitas, aut locus.

Non copia, quia tunc interruptio fieret ex causâ grauantē, non autem ex vñ, de quo nunc loquimur,

Neque ex qualitate, quia nulla est frigidior materia in corpore, quam vitrea pituita, quæ tamen in epialis putrescens hos pulsus non parit.

Si dicamus esse locum, nempe quia materia sit in corde, profectio non poterit materia frigida in ipsomet corde persistens, virtutem non exoluere, quæ exoluta, nunquam fiet magna distentio. Et sane, si volumus videre substantiam atque imaginariam esse hanc causam, euoluat quisque omnia Gal. volumina, dicatque mihi in qualinam affectu voluerit Gal. celerem distentionem ex impensio cordis calore factam, statim ab ingenti frigore in medio intercepti, moxque statim ad motum redire, absque facultatis dissolutione, absque instrumentorum vitio, & absque fuliginis copia, nullum inueniet. Si nullus inneniatur affectus, ergo nec talis dabitur, ex tali causâ pulsus aut si datur, momentosam lequitur causam, vel denique non erit ille interruptus, qui tenentur, sed alter, cuius vltima distentionis pars omnino extinguitur. Dixi momentosam posse sequi causam, neque enim inficior febrienti repente posse aliquando timorem mororemque ingentem, aut initium synopes ex refrigeratione accedere, propter quam distentio celer in medio interruptatur. Sed breui durabit hic pulsus, nam si perseveret timor, ac moror, æqualem faciet tarditatem, si vero syncope accedat, deficient pulsus: Si nil horum perseveret, aut sequatur, celeritas inæqualis, priorique similis redibit.

Quod autem ex inæquali hoc caloris ac frigoris vñ, possit interruptus ille fieri, qui vltimam amittit distentionis partem, & rationi est consentaneum, & omni caret obiectione.

Rationi quidem est consentaneum, quia frigiditas perinde contractionem sollicitat, atque fuliginis copia: At vero ex fuliginis copia, vltima distentionis pars quandoque amittitur, ergo & ex frigiditatis vehementia amitti poterit. Caret vero id omni obiectione: Non enim in hoc interrupto cogemur dicere, calorem febremque prorsus extingui. Et enim pars illa distentionis prior, quæ mouetur, perseverante calore ac febre, semper celeriter movebitur. Non itaque inconuenit distentionē in fine interrupti, etiam si febris adsit, sed inconuenit, illam in medio intercepti, qui prior interruptio non extinguit celeritatem, sicuti facit leonada.

His sic explicatis, si quærat quispiam, in quonam affectu possit tanta esse cordis frigiditas, quæ sola possit distentionem efficere parvam, ac breuem, cum illa à calore ad magnitudinem impellatur? Dixerim ego primam quidem hanc in senili marasmo, vel ex senio, vel ex alia quacunque causâ oborto, cum febre tamen, vel in febre marasmo reperiri posse. Etenim in his affectionibus, cor ex humiditate calidi innati defectu esse frigidum, ex febre autem calidum, nemo ignorat, sicuti & vires esse in hoc casu languidas, cuique est compertissimum. At frigiditas contractionem accelerans, breuem facit distentionem: Imbecillitas facultatis ad eandem breuitatem, paruitatemque concurrat, calor tamen præter naturam celeritatem efficit.

Neque patet, quomodo in his affectionibus interruptus hic pulsus adesse possit. Præter quos tamen, non inficior, posse in febribus quoque putridis antea à me expositis interruptionem hanc fieri, quando causæ refrigerantis facultas intendatur, vel quod materia sit cordi proximior, vel copiosior, vel frigidior, vel symptomata quoque refrigerantia, fortius in corpus agant. Hæc de interruptis ex inæqualitate caloris, ac frigoris.

At si de affectionibus sermo fiat, in quibus propter mutuam caloris, & fuliginis pugnam, interruptur pulsus, hos in præsentia, ad Galen. mentem, in sequentibus vero capitulis ex nostra sententia declarabimus.

Vitrea humorum, quæ in corpore sunt, frigidissima.

Ex inæqualitate caloris & frigoris vñ, si interruptio. Vltima distentionis pars amittitur.

In quo affectu idcirco sit cordis frigiditas, ut parvam faciat distentionem.

- A** Est ergo inæqualis hic fuliginis ac caloris vsus in omni putrida; cuius focus sit in corde, aut partibus cordi proximis, cum aliqua tamen arteriæ venalis, aut aortæ angustia, vel obstructione, vel compressione, vel impletione, quæ fiat à materia vel vaporosa, vel corpulenta, vel multa, vel pauca, vel tenui, vel crassa, vel ibi genita, vel aliunde fluente, vel continua, vel interpolata. Ex quibus tam variis causarum differentiis, varia quoque emergit distentionis interruptio, quandoque in medio ictu, quæ deinde reuertitur: quandoque in fine tantum, nonnunquam continua, quandoque interpolata, ac periodica. Ex quibus breuiter colligimus, febres ex pulmonibus oriundas, omnium maxime interruptos efficere posse, utpote quæ omnium maxime calorem, ac fuliginem in corde conservare possint, ut pneumoniæ exemplo docuit Galen. 4. de caus. puls. subinde vero & alias omnes, quæ non modo calorem ac fuliginem cordi communicare, sed & eodem, aut vasis proximis angustiam aliquam efficere possint. Hæc breuiter ad Gal. mentem, de interruptorum affectibus ad Vsum spectantibus dicta sufficiant. Quid vero ego ipse de interruptorum, ac dicrotorum natura, & causis sentiam, in sequentibus capitulis explicabo, proposita primum Gal. de dicrotis sententia nostraque censura.

CAPVT XLI.

Quæ sit bispulsantis causa, & quæ productionis modus.

- L**ocus hic iam postulat, ut nonnulla eorum perpendamus, quæ ad dicrotorum pertinet pulsum, de quibus hucusque exacte dicere distulimus, quamquam neque in præsentia omnia sint proponenda, sed ea duntaxat, quæ ad dicrotorum non durum spectare videntur: De cæteris enim ad durum tam vibratum, quam non vibratum pertinentibus, inferius verba faciemus. Hoc igitur in loco, primum Galen. sententia erit proferenda, atque cum satis obscura videatur, illustranda, diligentissimeque examinanda: denique nostra subiicienda. Gal. itaque de dicroto non duro verba faciens 2. de præsag. ex puls. 7. & 8. illius causam, & productionis modum explicare conatur, verbis tamen vsque adeo paucis, ut aliis opus habeant locis, ad totius rei dilucidationem.

- Quantum ergo ad causam spectat, pulsum bispulsantem, qui durus non fuerit, inquit fieri ex inæquali cordis intemperie; utrum vero inæqualis intemperaturæ nomine duas contrarias intelligat qualitates, frigidam & calidam mutuo inter se pugnantes, an potius inæqualem vsum refrigerandi, & fuligines expargandi, ipse aperte non explicat. Videtur tamen 2. de præsag. 8. voluisse, illum fieri ex pugna, quæ est inter vsum expellendi, & vsum refrigerandi. Scienim scribit: *Tertium qui ex intemperie nascitur, haud est dicrotus, sed bis modo pulsans, neque necesse est durus, quem si quis velis dicrotum vocare, nihil refert: hoc tantum memineris, non esse similem corporibus duris quæ à duria repercutiuntur, sed ut paulo ante diximus, concertantibus suis mutuo duabus facultatibus, & quæ distendit, & quæ contrahit cor, sed sic est, quod in contractione fuligines expelluntur: ergo certamen erit inter calorem, & fuliginem.* Quomodo autem ex hoc inæquali vsu bispulsans fiat, eum ex eodem interruptus quoque oboriatur, ipse tunc non explicat, pollicetur tamen se postea explicaturum, locus, ni fallor est 2. de præsag. ex puls. 4. ubi de modo, quo fiat bispulsans non durus, nil sigillatim docet, sed de dicroto in genere hæc solum habet: *Etenim in huiusmodi affectibus, ubi ab utraque parte mediæ dum attollitur, attrahatur, rursusque copuletur, cum illis generatur pulsus dicrotus.* Hæc verba modum docent, quo fit dicrotus: qui in hoc consistit, ut laterales arteriæ partes, mediæ tunc contrahant, cum ipsa mediæ distenditur, in quo ab interrupto distinguitur. In interrupto enim, omnes arteriæ partes, eodem tempore distenduntur, sed cum in mediâ fuerint distensione, omnes pariter retrahuntur, postea iterum recuperant motum: In bispulsante vero, non omnes arteriæ partes simul dilatantur, sed mediâ duntaxat, laterales autem tunc contrahuntur, contrariæ vero mediæ se cum rapiunt, quæ iterum simul cum lateralibus monetur. Idcirco in interrupto contractio totam interfecat diastolen, in bispulsante autem non interfecat, sed laterales tantum partes moratur: Hinc colligit Gal. interrupti pulsus contractionem esse mediâ, bispulsantis autem minime: Et 3. de præsag. ex puls. 4. inquit, exercitatum esse oportere Medicum in contractione rite dignoscenda si interruptum, à bispulsante probe sit distincturus: Et sane iure optimo hoc monet: Etenim si interruptus mediâ habeat contractionem, bispulsans autem minime, constat sanè interruptum facile illis fore perspicuum, qui contractionem senserint, ignotum autem, quibus contractio sit ignota. Hæc sunt, quæ à Galen. obscuris verbis haurire potui, quibus dicroti

Bispulsantis generatio fit sanè Gal.

Differentia inter Bispulsantem & interruptum.

non duri causas aperuit, productionis modum proposuit, & distinctionis rationem ab interrupto designauit. Quæ vtrum cum eodem Gale, cum ratione, & experimento consentiant, nunc est expendendum.

Primum ergo, quod ad Galeni consensum spectat, non satis intelligo, quomodo inter se conueniant, quæ de dicroto non duro habet 2. de *præfag.* 7. & 8. cum iis, quæ docet 3. de *præfag.* cap. 4. Nam 2. de *præfag.* vult dicrotum non durum fieri certantibus inter se duabus facultatibus, refrigerante scilicet, & expellente, vt proxime dicebam, 3. autem de *præfag.* ex *puls.* 4. vult eundem fieri ex inæquali cordis intemperie hæctica, seu stabili, ac firma, cuius inæqualitatis hæctice signum proponit, hæcticam quoque febrem, & pulsus hæcticum, absque cordis palpitatione factum, ad illius dicroti differentiam, qui cum palpitationem habeat adnexam, humorum potius, quam solidorum sequitur intemperiem. Hæc profecto cum prædictis minime conueniunt: Si enim datur dicrotus non durus ex inæquali solidorum cordis intemperie stabili, & hæctica, quomodo fieri poterit, conecrantibus inter se duabus facultatibus, dissendente scilicet, ac contrahente? An non cuius constat, hanc esse pugnam, propter caloris atque fuliginis copiam? profecto: At vero fuligo non est intemperies, neque in solidis continetur, sed in cauitate: neque hæcticam facit, siue stabilem inæqualitatem, imo vero inæqualem, neque in febre reperitur hæctica, sed in putrida: quomodo ergo affertur Gale, fieri dicrotum ex inæquali intemperie solidorum cordis hæctica, cum febre hæctica?

Quod si quis dicat, duplicem esse hunc dicrotum, vt patet ex Gale, quorum alterum dicit fieri cum palpitatione, alterum sine palpitatione: illud vero fieri ex humoribus, hunc C autem ex solidis: Fateor quidem Galen, hunc vtrumque proposuisse, sed dum in eo versamur, quem scribit fieri ex intemperie solidorum cordis hæctica, quæro, quis sit modus, quo hic producat? oportet enim in hoc quoque dum media arteriæ pars distenditur, laterales contrahi, sed quid quæso est, quod in hac inæquali solidorum intemperie arteriæ partes laterales extrahat, non autem mediam? Video aliquem pro Gal. durum, retrahi laterales partes ab intemperie frigida, dum mouetur media ab intemperie calida, eo, quod viscus hoc, vno & eodem tempore laboret intemperie vtrique contraria. Sed nil fucii habet fucata hæc responsio: Qui enim fieri potest, vt inæqualis hæc cordis intemperies, refrigeret laterales arteriæ partes, quæ contrahuntur, mediam vero duntaxat calefaciat, quæ omnium primum distenditur? Ad hæc, qui fieri potest, vt eadem inæqualis intemperies, D tot, ac tam varios inæquales pariat pulsus? Diximus enim ex hac fieri disparem inæqualitatem, interruptum, & inæqualem, secundum varias arterias, quæ huius, vel illi cordis parti, hoc, vel illo modo intemperatæ, fuerint oppositæ. Quomodo ergo ex hac etiam dicrotus consurgit? Præterea, si in dicroto inæqualis hæc intemperies est hæctica, cum febre hæctica, quomodo, quæso, potest ita virtus constare, vt binos faciat istos? & cum mediam eleuauerit arteriæ partem, eandem simul rursus cum lateralibus distendat? Sunt hæc omnia facultatis non inualidæ signa: In febre vero hæctica nunquam valet facultas: ideo paulo ante, cum inæqualem cordis intemperiem concederemus, de quæ illius pulsibus loqueremur, dicebamus, illam non esse in facto esse, sed in fieri, atque hanc ob causam posse pulsus producere inæquales, qui aliquo non careant robore. Nunc autem cum inæqualem proponimus hæcticam, profecto factam constituamus oportet. Factam vero intemperiem absque languida facultate nunquam inuenias, in qua certe dicrotus pulsus fieri nequit. Mitto posse aliquem obicere, in hæctica inæqualem intemperiem nunquam reperiri. Hanc enim paruipondimus obiectionem, qui paulo post hanc rem discussuri, modum ostendemus, quo etiam in hæctica possit esse inæqualis intemperies. In præsentia illud tantum rationem eorum supponendum esse censemus, eo modo, quem ex Gal. proposuimus, dicrotum non fieri ex inæquali hæctica intemperie, idcirco aliam causam ac modum esse querendum. Quæ ergo tandem erit causa ista? quæ sit productionis modus? Ego sane alios lubentius audirem, quam vt ipse meam proferam sententiam: Neque enim mihi ipsi satis confido, ingenii mei imbecillitas agnoscens: In re tamen difficili, obscura, nec satis à Galen explicata, existimo cuique licere, aliquid saltem probabile asserere, vt inde exeat aliorum ingenia, integram rei veritatem, in eimmeriis tenebris latitantem, tandem eruant: Idcirco quid hæc de re sentiam, libere proferre non grauabor.

Censeo itaque dicrotum duas, vel quandoque plures esse distinctiones, quæ mediam habeant contradictionem, esseque vnum ex iis, quos creberrime inæquales vocant: Habere

vero

Gal. placita
examinand.
tur.

In feb. hæct.
ca nonnunquam
valet facultas.

Dicrotum non
fieri ex inæquali
hæctica intempe-
rie.

Audire de
dicroto sententia.

▲ vero non modo crebritatis, sed & magnitudinis & paruitatis inæqualitatem.

Huius vero immediatam causam, non modo eandem esse existimo cum in tetrupto-
rum causa, vel paulo ab illis distante, sed & aliam inuenio, quam mox explicabo. Hæc
itaque nunc sigillatim à nobis confirmetur, primum ergo minime apud Gal. in dubium
reuocatur, quin dicrotus sit duplex, vel triplex distentio; Etenim cum scribat hunc bispul-
sare, ad interrupti differentiam, qui cum sit vnica diastole, in duas diuisa, dicitur bisferire,
sanè statim colligitur eum, qui bispulset duplicem dici posse. Quod in dubium reuocatur,
est, vtrum contractionem habeat mediam, nec ne? Galenus negat: ego vero id assero, sic
autem probō. Duplex est pulsus, ergo ex his constare partibus debet, ex quibus omnis pul-
sus constat: Omnem autem pulsus diximus ex duplici motu, atque ex duplici quiete cō-
stare: duplex autem motus est diastole & systole. Ergo dicrotus, vbi bispulsans systolen ha-
bebit. Hoc ratio suadet: nec Galen. quicquam contra hanc sententiam habet, quod illam
infringat.

Si enim dicat, deo contractionem non adesse, quia non sentitur. Dico hanc conse-
quentiam non valere, quia contractio ex eiusdem sententia, in maximis tantum sentitur
pulsibus: dicrorum vero contractio, tanquam minima, est insensibilis.

Quod si quis pro Gal. dicat, modum, quem ipse proponit, vt ostendat in dicroto du-
plicem esse diastolen absque systole, hoc satis demonstrare; Nihil dicit, quia modum illū
iam reiecit. Itaque cum nihil sit contra nos, muta autem pro nobis, vt iam declarabi-
mus, sanè satius est dicere, dicrorum esse duas distentiones, per mediam contractionem
distintas, quam duas absque contractione.

Cum autem id nobis concedatur, statim sequitur, illum esse crebritate inæqualem.
Etenim ad crebritatem constituendam, duo requiruntur: primum, vt inter duas aut plu-
res diastoles, media cada: contractio: alterum, vt quam breuissimum sit inter vnā & al-
teram Intervallum.

Mediam esse contractionem probauimus.

Breuissimum intervallum esse, sensus docet. Crebrum ergo esse dicrotum, nemo,
qui hæc concesserit, inficiabitur. Crebritatem autem esse inæqualem, ex eo patet, quod
cum patientis pulsus non semper sit dicrotus, sed quandoque tantum, propterea neque
semper eodem modo erit creber.

D Accedit, quod cum dicroto non duæ tantum sint distentiones, sed quandoque plu-
res, hæc quoque non erunt semper inter se crebritate æquales, sed inter duas maius, inter a-
lias minus cadet intervallum.

Esse vero pulsus hunc magnitudine ac paruitate inæqualem, ex eo statim colligi-
tur, quod prior dicroto distentio secunda ac tertia sit maior. Hæc de dicroto natura eo lu-
bentius attulimus, vt facilius in causarum cognitionem deueniremus.

Ad causas ergo quod attinet, diximus illas (si ad Gal. mentem proponantur) nil dif-
ferre à causis interrupti, nisi secundum magis, & minus. Nos vero alias quoque excogita-
uimus, quas mox proponemus.

Priores ergo à Gal. adductæ, sunt eædem, quatenus dicrotus sit ex inæquali vsu testi-
gerandi, & expellendi fulgines, vel ex inæquali vsu caloris, ac frigoris. Etenim de prior
inæqualitate meminit *z. de prasag. ex puls. cap. 1. de altera vero, imo de vtraque 3. de prasag. ex
puls. 4.* Si ergo fiat dicrotus ex inæquali vsu caloris ac frigoris, hoc modo generatur: Dum
plus potest calor, quam fuligo, distentio magnitudine superat contractionem, dum vero
fuligo calorem vincit, contractio longior est distensione: Hinc sequitur inæqualitas ma-
gnitudinis distensionis in dicroto. Etenim prima distentio, quæ est maior, sit ex calore do-
minante, secunda ac tertia, quæ longe est minor, sit ob fuliginem vincentem; fuligo enim
vincens, contractionem ac celerare facit, propterea distensionis partem accipiens, illam
efficit breuiorem. Ex his ergo patet causa inæqualitatis dicroto in magnitudine, ac parui-
tate.

F Crebritatis autem causa est apertissima; Cum enim creber enadat pulsus vel ex an-
cto calore, qui facit diastolen longiorem, vel ex aucta fuligine, quæ facit contractionem
magis protensam, si dnæ istæ causæ simul conueniant, quis non videt crebritatum reddi
debere pulsus? At in dicroto hæc simul conuenire iam diximus: Itaque dicrotus lute o-
ptimo ita creber efficitur, vt quandoque contractione careat videatur. Hinc vero inæqua-
lis quoque crebritas pendet; cum enim duplicem sequatur causam, calorem scilicet ac
fuligine.

H + fuligine

fuliginem, prout modo calor, modo fuligo vincit, crebritas etiam inæqualis efficitur. Et hæc tunc de dicroto, quatenus produciatur ex inæquali vſu refrigerandi, & expellendi fuligines.

Quod ſi aliquando fiat ex inæquali vſu refrigerandi ac calefaciendi (de qua tamen redubito) non alio ſane modo gigni poterit, quam eo quem *capite de interruptis* propoſui, ad quem lectorem remitto. Nunc autem tertium illud cauſæ genus aggrediat, quod in capite de interruptis me propoſiturum ſum pollicitus, atque de eo huculque dicere diſtuli, quod ſit tam interruptis, quam dicrotis commune.

Conſiſtit genus hoc non in caloris ac frigoris, aut caloris ac fuliginis inæqualitate, ſed in luſta, quæ eſt inter facultatem ſenſitivam, expultricemque naturalem cordis ex vna & facultatis pulſificam, ex alia. Quid hæc ſibi velint, explicò.

Cordi, non modo data eſt facultas pulſifica, ſed & ſentiens per nervum ſextæ cõiugationis, de qua meminit Gal. *de vſu par. 18*. Data quoque eſt expultrix quædam naturalis, ab ea minime diſtans, ouæ reliquis omnibus ineſt partibus, qua noxia expellere poſſit, de qua Galen. *4. de præſag. ex pulſ. 12*. Habent ergo hæc facultates ſuos quodaſam motus, qui aliquando diſtentionem à pulſifica facultate factam interrumpunt, ita vt ſiant pulſus interrupti, quandoq; vero diſtentiones quaſdam faciunt præproperas atq; importunas, quæ in contractionis tempus cadunt, vt propterea abſque contractione fieri videantur, ex quo ſunt dicroti. Modum declarò.

Hæc duæ facultates, ſenſitiva & expultrix, vel conſiderantur in parte cordis externa, vel in interna, nempe in ventriculis, ſi irritentur.

In externa, tunc irritamentum cauſa erit in pericardii cauitate, aut tunicis, idcirco quandoque baſin cordis, non nunquam cuſpidem afficiet.

Si baſin, tunc ſentiens facultas noxam percipit in extensione, atque ideo fugiens, contractionem facit, ſin cuſpidem contingit læſio in contractione, ideo ex fuga ſequetur extenſio. Ex priore motu ſit interruptus, ex ſecundo dicrotus.

Ratio huius diſticti eſt talis: Cum noxia materia ſit baſi propinqua, quo magis cot dilatur, eo magis cauſæ nocenti appropinquat, eoq; magis ab eadem læditur: Vt ergo noxam fugat, contrahitur. Cum vero hæc cauſa noxia ſit cuſpidi viciniore, quo magis contrahitur cor, eo magis cauſæ noxiæ appropinquat, atque ab ea læditur, hinc fugiens, ad diſtentionem properat. Ex priore motu *vt dixi* ſit interruptus, ex ſecundo dicrotus.

Quia vero interruptorum tres cum Gal. diximus eſſe ſpecies, vnã in qua motus in medio interruptus, poſt interruptionem reuertitur; alteram, in qua vltima diſtentionis pars admittitur, tertiam in qua quies tantum exterior perditæ eſt. Prior ſit ex contractionis vſu, extensionis vſum æquante.

Cum enim ex vna parte adſit ſenſitiva facultas contrahens, vrgente etiam fuligine: ex alia vero vrgat quoque calor, atque irritetur naturalis expultrix ad extensionem, neceſſum eſt inceptam diſtentionem à contractione interpellari, ſed ſtatim perfici, etiam ſi in medio interruptat. Quando autem fuligo ſit multa, calor vero non admodum ingens, neque expultrix admodum irritata, tunc fiet vnus ex interruptis in ſecunda acteris diſtentione, vt ſuſius infra explicabo.

Cæterum quia interruptorum, qui poſt interruptionem motum recuperant, quidã illam recipiunt priore imbecilliore, minorem atque tardiorem, aliã robuſtiorẽ, maiorem ac celeriorẽ: Priores habent facultatem expultricem, vel non admodum irritatam, vel imbecillam: ſecundi autem valde irritatam, ac validam.

Porro non diſſimili ratione ſingulæ ſpeciei dicrorum differentię in ſuas referri poſſunt cauſæ. Cum enim plurimæ ſint, quæ tunc meminit Gal. *1. de pulſ. diſſ. 16*, à plenitudine, magnitudine, duriſſe, celeritate, ac crebritate deſumptæ, harum omnium varietas ex vario cauſarum concurſu exoriri poſſeſt. Mitto in præſentia duos, de quibus ſuo loco: & ad reliquos me conuerto, qui cum maiores, ac celeriores fuerint, habebunt pro cauſa non modo facultatem irritatã ſentientem, ſed & expultricem, & calorem auctum, cū virtute valida: Minores veto ac tardioreſ efficiet calor non vrgens, & facultas ſentientis, atque expultrix, ad diſtentionem non admodum procliuſ: Inæquales vero celeritate pariet uterque vſus valde auctus, cum inæquali iam propoſitarum facultatum irritamẽto. Et hæc tunc de interruptis & dicrotis, ob ſenſitivæ & expultricis facultatis irritamentum, in externa cordis parte.

Quod

Ratio, & quæ dicroto cauſa ab auctore exposita.

Modo ab expultrice & ſenſitiva facultate cordis, ſibi dicroto quæ interruptis.

Inter interruptos.

A Quod si sermo sit de his facultatibus, quatenus in cordis sinibus reperitur, existimo has frequentius facere dicrotos, quam interruptos: quomodo tamen interrupti quod exoriri possint, breuiter exponam, mox ad dicrotos orationem conuertam.

*Quando, & quo frequen-
tius facit
dicroti &
proditio fa-
cultatis.*

Interrupti ergo ex his facultatibus in cordis ventriculis irritatis, si fieri possunt: Quod ex vna parte ad sit calor, ac sensitiua facultas, quæ noxam fugiat, ex quibus fit distentio: Ex alia vero virgeat facultatem pulsificam contrahentem fuligo multa, insurgatque expultrix ad noxia per contractionem expellenda: Tunc dum fit distentio, necessario etiam sequitur contractio, quæ aut mediam interruptit diastolen, aut postremam adimit partem, interruptumque generat. Quod si facultas sentiens irritata distentionem faciens, nil habeat, quod illam impelleret, imo vero naturalem expultricem habeat auxiliatricem,

B hinc dicrotus emerget, ac multiplex.

Dicrotus quidem, quia distentiones multiplicentur fere absque contractione: Multiplex vero, quatenus varia est magnitudinis ac crebritatis inæqualitas, prout plures aut pauciores concurrunt ad distentionem causæ, ut paulo antea explicauimus. Probabilis, si fallor, est hic interruptorum ac dicrotorum causa, probabilior tamē, imo certa et uadet, cum ratione & Gal. auctoritate fuerit munita.

Ratio quidem est multiplex, & prima quidem talis: dicrotus atque interruptus pulsus cum illa inueniuntur cordis palpitatione, quam facit facultas expultrix irritata à causa noxia: ergo tam palpitationis, quam pulsuum illorum pulsuum, vnica erit causa, neque facultas expultrix irritata.

*Et quia pal-
pitatio
cordis causam
impertit ad di-
crotos & pro-
ditio.*

C Pulsus illos cum palpitatione reperiri, docet experientia, & Galenus.

Experientia quidem multiplex est, sufficiat tamen vnicum pro exemplo opponere, in quem hoc tempore, dū hæc typis mandarentur, incidit autem Religiosus quidam S. Iustinus, qui palpitatione hac cordis spuria laboras, nedum dicrotos, sed & omni inæqualitatis genere donatos habebat pulsus, cuius rei testimonium habeo Excellentissimum Alexandrum Vigontiam, aliosque nonnullos studiosos, qui cum casu hic interfuerint, cū primum ad ægrum fui vocatus, inæqualitates istas singuli exploratas habuere. Gal. vero, *de præfag. ex puls.* 4. apertissime docet, dicrotum, qui fit ex inæquali humorum Intemperie, cum palpitatione connexum esse. Hanc vero palpitationem esse illam, quæ fit ex facultatis expultricis irritatione, probo ex eisdem Gal. verbis partim citat. loco, partim *de Placit.* 1.

D Et citato quidem loco: Ibi enim palpitationem proponit ex inæquali humoris Intemperie factam: sed sic est, quod inæqualis Intemperies, ut patet ex lib. de inæquali Intemperie, est dolorifica, ergo sentienti, & expultrici infensa.

Addo, quod cum palpitatione triplex sit, vna ex flatu: secunda ex imbecilla facultate pugnantem cum grauitate: tertia ex facultate irritata. Non potest Gal. loco citato intelligi de palpitatione ex flatu, quia inquit, illam ex inæquali Intemperie fieri, non ex flatu.

*triplex pal-
pitatio.*

Accedit, quod docet experientia, palpitationem ex flatu pulsus non facere valde inæquales: ergo de hac non loquitur.

Sed neque de secunda, quæ tremori est similis: quandoquidem hæc tremulos facit pulsus, de quibus Gal. 2. *de præfag. cap. 12.* agit, tanquam de valde distinctis à pulsibus palpitationis: Relinquitur ergo ibi Galenum loqui de palpitatione facta, propter expultricis irritamentum.

Quod confirmatur ex *6. de Placitis, cap. primo.* Eo enim in loco inquit, palpitationem ac pulsuum præter naturam eodem nomine appellari, affectiones scilicet, non operationes.

Addit affectiones istas perinde atque naturalem pulsuum ex corde fieri, id est (ut ego interpretor) ex facultate aliqua cordis, sed impulsæ à causa præter naturam, qualis est expultrix irritata: ergo sequitur & palpitationem hanc, & pulsus propositos sequi huius facultatis irritamentum.

Confirmatur hanc veritatem ea, quæ habet Gale. *1. de loc. affect. secundo*, cum inquit, dupliciter palpitationem fieri, vel per se, vel quasi in humore quodam cor ipsum mouetur. Nomine enim palpitationis per se, intelligit legitimam ex flatu factam. Nomine alterius, illam quam facit facultas expultrix irritata à causa noxia, siue sit aqua, aut humor aliquis pericardii, siue alia consimilis, quam necessario pulsus dicrotus, atque alius quilibet inæqualis sequitur.

Sed ut res clarius reddatur, alio eandem confirmemus argumento. Est autem tale: Natura

luc est

In quibus
affectionibus
dicrotum
irritamentum
pulsus ha-
buit, ad
cor, de
arteriarum
ex pultrici
sensu.

lucis affectus, in quo adfit pulsus dicrotus, atque interruptus, in quo non adfit causa expultrice facultati cordis, & arteriarum insensa, ergo sequitur propriam horum causam, esse hoc ipsum expultricis irritamentum. In affectionibus dicrotorum interruptorumque pulsuum adesse causam irritantem, tunc reddetur conspicuum, cum affectus isti fuerint enumerati: quod eo libentius faciam, quia eorum enumeratio, maxime facit ad praesagium praesentium, ac praeteritorum. Docebit enim nos haec pars morbos omnes, ac causas, in quibus, & ex quibus dicroti, interruptique pulsus fieri possunt.

Reperiuntur ergo pulsus isti in pneumonia, lethargo, orihopnoea, destillationibus quibuscumque ad laeues arterias & cor; Febribus quae sunt cum crisi mala ac periculosa, affectionibus oris ventriculi varils, atque animi affectionibus nonnullis. In his omnibus casibus pulsus istos reperiri, ex Galeno demonstrabo (quantquam ipsa cuique inspicere deberet experientia) mox vero affectiones istas facultatem habere expultricem irritatam, statim subiungam.

Pulsus Peri-
pneumoniae
ac Lethargi

Pneumonia ergo Gal. 4. de caus. pul. inquit habere pulsus dicrotos, atque in vno istu inaequales.

Lethargum eodem loco inquit eosdem habere pulsus, quos habet peripneumonia.

Orthopneam, secundo de loc. affect. 4. inquit pneumoniz esse connexam, ergo eosdem habet pulsus quos pneumonia, vt etiam ex 4. illo de caus. pul. colligitur.

De crudis laeuum arteriarum tuberculis, Gal. 4. de loc. affect. ultimo in casu Antipatri, nostra quoque accedente experientia, & Petri Salli diuersi hac de re fida attestatione.

Inaequalis
pulsus ex
animi affectu
habet.

De animi affectionibus, Idem Galen. lib. de praegnu. ad Posthumum cap. 6. qui in amantibus, certantibus, atque grauiter animo perturbatis inaequales pulsus fieri docet, inter quos sane dicroti & interrupti sunt frequentissimi.

De oris autem ventriculi affectionibus, quam facile inaequales hos pulsus habeant, quisque apud Galenum legere poterit. 3. de praesag. ex pul. 7. vbi de pulsibus, qui in principiis accessionum apparent, verba facit, quarto de caus. pul. 23. vbi pariter de pulsibus oris ventriculi affectu loquitur 12. meth. cap. 3. vbi de pulsibus syncopes humorosae edisserit. Quoin loco lectorem monitum volo, quod quamuis Gal. non aperte dicat, in syncopali humorosa pulsus esse dicrotos, aut interruptos, sed tantum esse inaequales, attamen ex his, quae subdit, manifeste docet inaequalium nomine, interruptos quoque intellexisse, scribit enim, quod si pulsus sit valde inaequalis male: si vera non intersus fuerit, bene sperandum. Notanda sunt illa verba, si non sit intersus, quae Galen. consulo oppoluit pulsci inaequali, ex quo aperte docet inaequalis nomine se quoque intersus comprehendere.

Gal inaequalis
pulsus non
minus atque
intersus
audiri.

Quae cum ita sint, ea quae de inaequalitate scribit 3. de crisi. vlt. in febribus, quae cum pugna, ac periculo sunt, eodem modo intelligenda esse euulsum de inaequalitate videlicet bis pulsante, atque interrupta.

Quando
destillationes
dicroti &
interrupti
efficiant.

Porro ad destillationes quod attinet, sane non semper pariunt pulsus dicrotos, interruptosque, sed tunc tantum, cum materia ad laeues labitur arterias, quod cum raro admodum contingat, sepius autem in asperas descendat, hinc fit, vt pauci sint patientes, destillatione cum pulsibus dicrotis, atque interruptis affecti, plerumque vero absque his, diffiicili tamen cum tussi, atque respiratione tentanti. Etenim dum materia in asperis statulatur arteriis, tussim, diffiicilemque respirationem; dum vero ad laeues transit arterias, inaequales excitat pulsus.

Idem ab
alio obfer-
uari.

Quinque hoc ipso anno habui patientis cum praedictis pulsibus, tres cum febre, duos absque febre. Febrientes longis antea, ac grauibus tentabantur destillationibus, cum frequentiori orihopnoea, absque vlla pulsus interruptione, vel erebritatis inaequalitate. Tempore febris, nemo illorum diffiicili spitatione ex angustia instrumentorum tentatus est, sed illa tantum, quam faciebat vltus auctus, pulsus tamen pluries habuere dicrotos, atque interruptos. Non ob aliam, vt pnto causam, quam quod colliquata a calore febrili materia, in asperis contenta, & ad laeues delabente, tussis, ac diffiicilis spiratio cederet, inaequalitas vero, atque intermissio, ex irritata cordis, arteriarumque expultrice superueniret. Vnus ex his fuit iacobus Spinus metator ad Plateam lignorum, senex annorum 75-qui diu laborauit febre, fluxuque alui, cum praedictis pulsibus. Alter fuit perillustis Carolus lanua, eadem febre, ac fluxu alui pariter diu confectus. Tertia fuit verula quaedam annorum 40. in platea S. Georgii, quae tamen fluxu alui non fuit correpta. Et hi

qui-

A quidem tres fuerunt cum febre, alios autem duos, quorum memini, in uel per quendam dierum intervalla, hos habere pulsus, propter iam dictas causas, absque febre. Et haec enim si fallor, satis patet, dicrotos, atque interruptos fieri in omnibus iam enumeratis affectionibus, posseque fieri in aliis consimilibus, in quibus scilicet facultas expultrice cordis, & arteriarum ad noxia expellenda insurgat.

Ex hac vero irritatione praedictos fieri pulsus, sigillatim quoque nobis erit demonstrandum: Est enim hoc totius huiusce difficultatis centrum.

Accipio autem primum pneumoniam, & lethargum, atque in illis ex irritamento fieri dicrotos, atque interruptos sic probō: *Pulsus isti in pneumonia, ac lethargo non possunt fieri ex instrumentorum duritie, quia molles sunt; neque ex inaequali calore ac frigore, propter causas ante*

*Ex irritatione
ne si duritia
est, non
possunt.*

B *expositas, neque ex inaequali calore, ac frigore, quia calor in lethargo potissimum, ac pneumonia pituitosa, nunquam ita abundat, ut possit esse fulgini aequalis. Ergo nulla alia relinquitur causa, praeter hanc irritatam facultatem expultricem. Hoc si fallor illi facile concedent, qui sciunt, in utraque affectione multam adesse humiditatem, quae vi caloris febrilis facile funditur ac eoli liquidatur, ut in laeues arterias, atque cor penetrare valeat. Etenim de lethargo verba faciens Hippocr. 3. de morbis, inquit, lethargicos tussi vexari, expultrionem habere liquidam, & quandoque suppuratos fieri, quod etiam secundo de praedictionibus docuerat. At si lethargum potest haec facere, quid quæso de pulmonia censendum? aptissima sane est affectio ista, sicuti & Asthma, & Orthopnoea, & omnis ex capite in pulmones defluxio pulsus istos patet, & irritata cordis arteriarumque expultrice. Quod si id praestant affectiones quae longius à corde distant, putabimus ne, illas quae cordi sunt proximae, aut quae in ipso tem reperitur corde id non facturæ? Hoc equidem à ratione pteritus esset alienum. Idcirco, & cruda arteriarum laeuium tubercula, & multo magis impacti in corde aut pericardio humores, vel in illud impetu quodam irruentes, dummodo pravi, ac maligni fuerint, facultatem hanc irritant, interruptosque, & dicrotos faciunt.*

C Ne tamen quidquam gratis accepisse videamur, id quoque in febribus atque aliis affectionibus probemus. Febres illas malignas, quae crisin habent ante tempus, habere hanc cordis, & arteriarum expultricem irritatam, docent apertissime Gal. verba 3. de crifibus ultimo, quae sic habent. *Inaequalis autem pulsus, pluribus quidem crifibus fit, & praecipue cum non sunt sine pugna, ac periculo. Quid quæso est in crifibus pugna, ex qua fit pulsus inaequalis, quam motus expultricis naturalis, non autem pulsificæ? Hoc si quis negaverit, Gal. consulat toto illo cap. citato, ubi nullius aliterius facultatis mentio fit, quam expultricis naturalis. Propterea 4. de praesag. ex puls. 12. docet omnem crisin esse opus facultatis expultricis naturalis, non autem pulsificæ: & erilis tempore fieri pulsus magnos, atque altos, contractionem vero minus celerem, quia crisis non fit à facultate pulsifica contrahente, sed à naturali expultrice. Si ergo hac facultate cum pugna ac periculo expellente, sunt pulsus inaequales, sequitur necessario hanc inaequalitatem fieri ob motum expultricis irritatæ: Vnde eum tam sit evidens, quam quod evidentissimum, quis quæso negare audebit, eandem inaequalitatem fieri ex aliis quoque morbis, ac symptomatis, eodem modo corpus vexantibus? Certe nulla erit negationis ratio: Si enim sunt interrupti, ac dicroti ex pugna facultatis expultricis cum humoribus noxiis in malignis febribus, nulla est ratio, cur idem noxiis humor, etiam citra febre, aut in alia quacunque febre absque crisi, dummodo irritat, non possit hos pulsus gignere. Idcirco Gal. 3. illo de crifibus ultimo inquit, praecipue inaequales hos fieri pulsus in febribus, in quibus adsint vomitus signa, gravitatisque, ac morbus ventriculi, ex quo statim videtur inferre, inaequalitatem fieri motum expultricis irritatæ à causa gravante, aut mordente. Quod etiam colligitur ex tertio de praesag. ex puls. 7. dum proponit causas inaequalitatis pulsuum, quæ fit in principis accessuum, & ex 4. de caus. puls. 23. ubi de pulsibus ex affectionibus oris ventriculi loquitur.*

Crisis fit à facultate expultrice naturali, non pulsifica.

D *quam motus expultricis naturalis, non autem pulsificæ? Hoc si quis negaverit, Gal. consulat toto illo cap. citato, ubi nullius aliterius facultatis mentio fit, quam expultricis naturalis. Propterea 4. de praesag. ex puls. 12. docet omnem crisin esse opus facultatis expultricis naturalis, non autem pulsificæ: & erilis tempore fieri pulsus magnos, atque altos, contractionem vero minus celerem, quia crisis non fit à facultate pulsifica contrahente, sed à naturali expultrice. Si ergo hac facultate cum pugna ac periculo expellente, sunt pulsus inaequales, sequitur necessario hanc inaequalitatem fieri ob motum expultricis irritatæ: Vnde eum tam sit evidens, quam quod evidentissimum, quis quæso negare audebit, eandem inaequalitatem fieri ex aliis quoque morbis, ac symptomatis, eodem modo corpus vexantibus? Certe nulla erit negationis ratio: Si enim sunt interrupti, ac dicroti ex pugna facultatis expultricis cum humoribus noxiis in malignis febribus, nulla est ratio, cur idem noxiis humor, etiam citra febre, aut in alia quacunque febre absque crisi, dummodo irritat, non possit hos pulsus gignere. Idcirco Gal. 3. illo de crifibus ultimo inquit, praecipue inaequales hos fieri pulsus in febribus, in quibus adsint vomitus signa, gravitatisque, ac morbus ventriculi, ex quo statim videtur inferre, inaequalitatem fieri motum expultricis irritatæ à causa gravante, aut mordente. Quod etiam colligitur ex tertio de praesag. ex puls. 7. dum proponit causas inaequalitatis pulsuum, quæ fit in principis accessuum, & ex 4. de caus. puls. 23. ubi de pulsibus ex affectionibus oris ventriculi loquitur.*

E *quod motus expultricis naturalis, non autem pulsificæ? Hoc si quis negaverit, Gal. consulat toto illo cap. citato, ubi nullius aliterius facultatis mentio fit, quam expultricis naturalis. Propterea 4. de praesag. ex puls. 12. docet omnem crisin esse opus facultatis expultricis naturalis, non autem pulsificæ: & erilis tempore fieri pulsus magnos, atque altos, contractionem vero minus celerem, quia crisis non fit à facultate pulsifica contrahente, sed à naturali expultrice. Si ergo hac facultate cum pugna ac periculo expellente, sunt pulsus inaequales, sequitur necessario hanc inaequalitatem fieri ob motum expultricis irritatæ: Vnde eum tam sit evidens, quam quod evidentissimum, quis quæso negare audebit, eandem inaequalitatem fieri ex aliis quoque morbis, ac symptomatis, eodem modo corpus vexantibus? Certe nulla erit negationis ratio: Si enim sunt interrupti, ac dicroti ex pugna facultatis expultricis cum humoribus noxiis in malignis febribus, nulla est ratio, cur idem noxiis humor, etiam citra febre, aut in alia quacunque febre absque crisi, dummodo irritat, non possit hos pulsus gignere. Idcirco Gal. 3. illo de crifibus ultimo inquit, praecipue inaequales hos fieri pulsus in febribus, in quibus adsint vomitus signa, gravitatisque, ac morbus ventriculi, ex quo statim videtur inferre, inaequalitatem fieri motum expultricis irritatæ à causa gravante, aut mordente. Quod etiam colligitur ex tertio de praesag. ex puls. 7. dum proponit causas inaequalitatis pulsuum, quæ fit in principis accessuum, & ex 4. de caus. puls. 23. ubi de pulsibus ex affectionibus oris ventriculi loquitur.*

Humor noxiis id citra, quod à febre absque crisi inaequalitatem pulsuum facere possit, à expultrice irritata.

F *quod motus expultricis naturalis, non autem pulsificæ? Hoc si quis negaverit, Gal. consulat toto illo cap. citato, ubi nullius aliterius facultatis mentio fit, quam expultricis naturalis. Propterea 4. de praesag. ex puls. 12. docet omnem crisin esse opus facultatis expultricis naturalis, non autem pulsificæ: & erilis tempore fieri pulsus magnos, atque altos, contractionem vero minus celerem, quia crisis non fit à facultate pulsifica contrahente, sed à naturali expultrice. Si ergo hac facultate cum pugna ac periculo expellente, sunt pulsus inaequales, sequitur necessario hanc inaequalitatem fieri ob motum expultricis irritatæ: Vnde eum tam sit evidens, quam quod evidentissimum, quis quæso negare audebit, eandem inaequalitatem fieri ex aliis quoque morbis, ac symptomatis, eodem modo corpus vexantibus? Certe nulla erit negationis ratio: Si enim sunt interrupti, ac dicroti ex pugna facultatis expultricis cum humoribus noxiis in malignis febribus, nulla est ratio, cur idem noxiis humor, etiam citra febre, aut in alia quacunque febre absque crisi, dummodo irritat, non possit hos pulsus gignere. Idcirco Gal. 3. illo de crifibus ultimo inquit, praecipue inaequales hos fieri pulsus in febribus, in quibus adsint vomitus signa, gravitatisque, ac morbus ventriculi, ex quo statim videtur inferre, inaequalitatem fieri motum expultricis irritatæ à causa gravante, aut mordente. Quod etiam colligitur ex tertio de praesag. ex puls. 7. dum proponit causas inaequalitatis pulsuum, quæ fit in principis accessuum, & ex 4. de caus. puls. 23. ubi de pulsibus ex affectionibus oris ventriculi loquitur.*

F *quod motus expultricis naturalis, non autem pulsificæ? Hoc si quis negaverit, Gal. consulat toto illo cap. citato, ubi nullius aliterius facultatis mentio fit, quam expultricis naturalis. Propterea 4. de praesag. ex puls. 12. docet omnem crisin esse opus facultatis expultricis naturalis, non autem pulsificæ: & erilis tempore fieri pulsus magnos, atque altos, contractionem vero minus celerem, quia crisis non fit à facultate pulsifica contrahente, sed à naturali expultrice. Si ergo hac facultate cum pugna ac periculo expellente, sunt pulsus inaequales, sequitur necessario hanc inaequalitatem fieri ob motum expultricis irritatæ: Vnde eum tam sit evidens, quam quod evidentissimum, quis quæso negare audebit, eandem inaequalitatem fieri ex aliis quoque morbis, ac symptomatis, eodem modo corpus vexantibus? Certe nulla erit negationis ratio: Si enim sunt interrupti, ac dicroti ex pugna facultatis expultricis cum humoribus noxiis in malignis febribus, nulla est ratio, cur idem noxiis humor, etiam citra febre, aut in alia quacunque febre absque crisi, dummodo irritat, non possit hos pulsus gignere. Idcirco Gal. 3. illo de crifibus ultimo inquit, praecipue inaequales hos fieri pulsus in febribus, in quibus adsint vomitus signa, gravitatisque, ac morbus ventriculi, ex quo statim videtur inferre, inaequalitatem fieri motum expultricis irritatæ à causa gravante, aut mordente. Quod etiam colligitur ex tertio de praesag. ex puls. 7. dum proponit causas inaequalitatis pulsuum, quæ fit in principis accessuum, & ex 4. de caus. puls. 23. ubi de pulsibus ex affectionibus oris ventriculi loquitur.*

Deviat à multitudine, et non fit propria.

Sed ut tandem omnia in vnum redigam locum, consulant lectores Galenum 2. de caus. puls. 2. ubi quanquam de causis inaequalium pulsuum ex instrumentis se dicturum profiteatur, attamen nil de duritie aut mollitie, quæ instrumentorum est propria, loquitur, sed hoc tantum toto illo capite docet, omnem inaequalitatem ad instrumenta relata, fieri à facultate valida irritata, quæ conatur expellere ea, quæ aut foris offusa arteriis sunt, aut membranis impinguntur, aut interiores obstruunt meatus.

Porro eum facultas ista, non possit esse contrahens, utpote quæ solam detrudat fuliginem, oportet ergo eam esse expultricem naturalem: Vt tandem omnis inaequalitas

qua

quæ non fiat ex languida facultate, aut inæquali intemperie, ad irritatam expultricem naturalem referatur, quamuis à Gal. sub titulo inæqualitatis instrumentorum pertractetur. Idcirco non modo interrupti in vno ictu, sed in acervo, nec modo dicroti, sed & intercurrentes dicrotis valde similes, ex hoc expultrici irritamento producantur.

Et de intercurrentibus quidem res est clarissima, ex 2. de caus. puls. 2.

De intercurrentibus vero cum dicroti, vt dixi, valde sunt similes, idem nunc probō, Etenim vnius probatio est alterius demonstratio.

Galenus ergo secundo de presag. expuls. 5. scribit intercurrentem fieri crisis tempore: Tunc sic arguo, ex eodem Gal. 4. de presag. 12. crisis tempore mouetur expultrix naturalis, ergo intercurrentis causa est expultrix naturalis. Tam antecedens, quam consequentia patet, sequitur ergo ex his alia consequentia, dicrotum ex eadem fieri facultate, ex qua intercurrentis: Etenim intercurrentis à dicroto specie non differt, sed tantum secundum magis & minus: ergo nec causis differt.

Quod specie non differat, probō: vterq; est crebritate inæqualis, vterq; habet distentiones multiplicatas, atque vique adeo crebras, vt contractionem aliquam obicere videantur, ergo sunt eiusdem naturæ, habebunt ergo eandem causas, secundum magis & minus tantum inter se differentes. Quod magis adhuc confirmatur, quia vterque in pulmonis, ergo habent eandem causas.

Dicrotum fieri in pulmonis, docui ex 4. de puls. caus. intercurrentem vero ex 2. de presag. expuls. 5. ergo ambo eandem habent naturam.

At vero si dicrotus & intercurrentis causis non differunt, ergo interruptus cum his conueniet. Ostendimus enim interruptum & dicrotum eandem habere causas: ex 2. xio. mate autem logico: quæ sunt eadem inter se, sunt quoque eadem cum tertio: sed intercurrentis & dicrotus conueniunt causis inter se, ergo conueniet quoque interruptus, qui à Dicroto causis non differt. His profecto existimo vnumquemq; per suaderi posse.

Sed Gal. de Interruptis differentem audiamus, qui vt arbitror vsque adeo clatis verbis hanc aperuit veritatem, vt hæc duntaxat ad opinionis nostræ confirmationem satis esse potuerint. Itaq; 2. de puls. caus. 3. de Caprizante verba faciens, scribit facultatem prius victam imminere grauius, vt superet reiciatque molesta. Tunc quæro, hæc quæ reuicit, an contractione, an potius distentione eiciat? Non contractione, quia non rediret ad distentionis motum: ergo distentione, sed sic est, quod facultas pulvisca dum distendit, non expellit, imo vero attrahit: ergo oportet esse aliam facultatem, quæ hos faciat, talis est expultrix naturalis. Itaq; etiam in Caprizante, omnique interrupto, qui post interruptionem reuertitur, vt noxia detrudantur, expultrix naturalis ea est, quæ mouet.

Clarius adhuc hoc ipsum confirmat Gal. 2. de presag. 6. vbi de intermittente in vno pulsu hæc habet: Hi enim pulsus generantur cum simul & certat natura, & impeditur ab insalubribus causis. Ergo cum reuicere illas quodammodo valeas, atque velut vinculo soluta motum à quiete præstare potiores, signum est commodius, &c. Hæc verba hanc veritatem per belle aperiunt: Primum quia facultatem, quæ certat, vocet naturam, quæ apud Gal. est facultas inferior pulvisca. Secundo dicit illam impedi ab insalubribus causis. Insalubrium autem causarum nomine, non intelligit fuliginem, hæc enim non impedit facultatem, quominus moueatur, sed sollicitat ad contractionem: Per insalubres ergo causas illas intelligit, quæ sentiunt, & expultrici infensæ sunt. Quod confirmatur, quia, inquit, hanc facultatem reuicere in distentione, dum perficit interruptam distentionem, & quasi vinculo quodam solui. Quæ omnia aperte declarant noxam facultatis expultrici grauius irritari, non autem primo, ac perse pulviscæ.

C A P V T X L I I

De quibusdam dubiis contra propositam sententiam et eorum solutione.

Contra ea, quæ de interrupti, ac dicroti causis proximo hoc capite fusius diximus, nulla proponi possunt, quæ dilucidatione, & solutione indigent, Etenim partim obscura, partim vero dubia sunt.

Illud primum controuersum videtur, quam ob causam in hac parte, quam diximus, causas simplices, ex parte vsus tantum pertractare, tot simul causas inleramus, sententiam scilicet, atque expultricem naturalem: Quibus breuiter dico, nos vnicam hoc in loco proponere contentiam, vsus scilicet, non inuenire vero alias quoque ad vngere,

gicæ,

Agere, dummodo continentes non sint. Sed rursus statim instabit quispiam, quomodo *Dubitatio 3*
 responsio hæc vera esse possit, nos videlicet, de aliis duabus contentiuis causis, ne ver-
 bum quidem facere, cum passim & facultatis & instrumentorum facta sit mentio? His du-
 bus, quia duo sunt sigillatim satisfacere oportet. Atque ad primum quod attinet, cum quæ-
 rimus, cur instituto sermone de causis pulsuum ex parte vsus, facultatis mentionem fece-
 rimus, de qua satis suo loco diximus. Respondeo, facultatem cordis esse triplicem; senti-
 entem, naturalem, ac vitalem. *Solutio, Triplex est de facultate*

Hactenus quando fuit sermo de pulsibus facultatis, nomine facultatis, vitalem tan-
 tum intelligebamus. Nunc vero facultatis nomine, sentientem atque expultricem natu-
 ralem intelleximus.

B Quod si quis rursus quærat, in quonam distinguantur causæ granantes facultatem *Dubitatio 4*
 vitalem, ex quibus diximus fieri interruptos pulsus, à causis istis sentientem, atque expultri-
 cem lædentibus, ex quibus, eisdem fieri docuimus. Respondeo, vitalem facultatem gra-
 uari ob quosdam instrumentarios morbos cordis: sentientem vero, & expultricem lædi ab
 errore externo potius, quam à morbo. Hinc fit, ut tunc dicatur grauata esse facultas, cum
 in membrana, carne aut ventriculis cordis, impactus sit humor multus, cum tu more, aut
 citra tumorem. Tunc vero sentiens, & expultrix dicuntur lædi, cum in pericardio, aut ven-
 triculis, noxius humor, aut vapor potius qualitate, quam copia noxius reperitur, vel ali-
 unde in cordis partes affluat, ex quo saculantes istæ, non grauentur, sed potius lædantur,
 atque irritentur. Patet ergo quantum distet interruptus pulsus ex facultate vitali grauata
 C ab eo, qui sit ex sentiente & expultrice irritatis.

Sed quid dicemus ad obiectionem de pulsibus istis à causa instrumentaria produ- *Dubitatio 5*
 ctis? Etenim cum dixerimus, diceros, atque interruptos fieri in pneumonia lethargo;
 crudisque lætium arteriarum tuberculis, sane ex his statim patet, instrumenta esse læsa:
 quorum ergo instrumentorum vitia permiscere cum causâ ex parte vsus.

Solutio huius argumenti ex hæctenus dictis facile colligitur. Instrumentorum vitia *Solutio,*
 dupliciter considerantur, vel vt causæ pulsuum immediatæ, vel vt mediatæ.

Vt immediatæ, tractabuntur infra.

Vt mediatæ, sunt hoc loco propositiæ. Hoc autem in loco, quatenus mediatæ sunt *Instrumenta ad vitia d. n. plius considerantur.*
 causæ, proposita esse instrumentorum vitia, sic probat: Hæc vitia suere à nobis considerata,
 D prout vsum in corde augent, ergo vt causæ mediatæ: Nam immediata causâ, est ipse v-
 sus auctus.

Secundo probat sic: Hæc vitia suere considerata, vt mittunt aliquos humores: aut
 vapores in eor, qui sentientem expultricemque facultatem irritant, ergo vt causæ media-
 tæ. Etenim immediatæ erunt, illæmet saculantes irritatæ. Rem vero sic esse, alia quoque
 ratione confirmo, Interrupti ac dicrosi ex instrumentis, vel saltem ex composita causâ, instrumen-
 to scilicet, & vsu aucto oriundi, sunt omnes duri: At vera illi, de quibus fuit sermo sunt molles, ergo
 non pertinent ad instrumenta. Maiorem probabimus suo loco. Minorem probat ipsemet
 Galen. qui capite de pneumoniâ inquit, raro in pneumonia fieri dicrosos, quia dicrosi ma-
 gna ex parte sunt duri, ex pneumonia vero molles.

E Eadem vero est lethargicorum ratio. Etenim lethargus quoque ob partem affectû,
 ac materiam, non minus facit pulsus molles, quam pneumonia.

Nec quis obiciat, molles quoque ad instrumenta pertinere: Nam etsi hoc conce-
 dimus, negamus tamen ex mollitie vllum fieri dicrosum, vel interruptum. Si ergo molli-
 ties non est dicrosi causa, opus est in affectu mollitiem facientem, aliam esse dicrosi cau-
 sam, qualis est à nobis relata.

At vero rursus instabit qui spiam, proposita esse varia arteriarum vitia, quæ instru-
 menta necessario efficiunt duriora; vt propterea saltem hanc ob causam limites nostros
 transgressimus. Quibus respondeo, nos semper hoc in loco, omnia vitia siue essentialia,
 siue per consensum proposita, considerasse, vt vsum augent, facultatemque sentientem,
 F & expultricem irritant, qua ratione ad hæc locum pertinent: si vero quid aliud facient,
 alio in loco proponetur ac considerabitur.

Aliud quoque circa hoc ipsum occurrit dubium. Si cum vsu adfuit quoque aliâ dua
 causa, nempe sensitiua, & expultrix naturalis, ergo non proponitur unica causa: Solutio est; propo-
 nitur vnica contentiua, reliquæ non ad contentiuias, magis tamè ad vsum spectant, à quo
 impelluntur, quam ad alias causas. His solutis dubiis, ad alia me conuerto.

Dilatatio.

Possit quis quærete, qui fieri possit, vt expultrix contractionem, distentionemque efficiat, imo distentionem potius, quam contractionem, cum certum sit, contractione expelli; distentione vero attrahi materias in corde; *si per distentionem attrahatur materia, quomodo ergo expellitur?* Pro huius dubij solutione, ad Gal. confugio 4. *de prasag. 12.* qui inquit, sanguines, vt expellantur, semper egere contrahente facultate, reliquos autem humores non item. Cum enim humores, ac vapores à fuligine diuersi, non semper sint in sinistro sinu, sed quandoq; in ipsamet cordis carne, aut membrana, aut spatii inanibus, hinc fit vt expultrix naturalis, quam inquit Gal. *loco citato*, membranis, neruis, carniq; esse insitam, dum vult ea detrudere, quæ in cordis arteriarumque cauitate continentur, contractione vtatur: Distentione vero, dum reliqua omnia vult expellere. Cum autem plures sint humores extra cordis, arteriarumque cauitates contenti, quam illi, qui inibi resident, hinc multo frequentius expultrix vtitur distentione, quam contractione. Etenim siue materia noxia sit in exteriori membrana, siue in carne, siue in spatii inanibus, inter membranam, & membranam, vel membranam & carnem, vel in venis ipsis, facilius excuset dilatando, quam contrahendo.

An palpitatio sit perpetua dicendum, & interrupta.

Ex his, ni fallor, quisque colligere potest, nos in præsentia cordis nomine arterias quoque complexi: Idcirco iure optimo affirmare materiam quandoque in membrana exteriori, aliquando in alijs iam dictis reperiri locis. Ex hac hæcenus de præsentibus dubior.

Quæri secundopoteest, *nunquid palpitatio sit perpetua interruptarum, dicrorumque comes, ut scilicet nec palpitatio absque dicroto, neque hæc absque palpitatio reperiantur?* Cui quæsitio breuiter respondeo, in eorum confirmationem, quæ antea diximus, palpitationem scilicet, absque his pulsibus, & hocce pulsus absq; palpitacione reperiri posse. Datur palpitatio absque his pulsibus, quando sit opus solius causæ morbificæ, & quando fiat à facultate & morbo. Si enim sola fuerit causa morbifica, status, verbi causa, hic eodem tempore distendit, quo etiam facultas pulsifica, eodemque tempore fit contractio. Si vero fuerit tremor, motus scilicet facultatis imbecillæ, & grauitatis, tunc minor tantum euadit pulsus ac creber, non interruptus, nec vere dicrotus.

Dixi nec vere dicrotus, quia in vero dicroto vna saltem magna est pulsatio, in secundo autem omnes sunt paræ. In his ergo palpitationis differentiis non sunt interrupti aut dicro. i: Fiant tamen in tertia, quæ est motus expultrici, & sensitiuæ facultatis irritatæ, nec semper tamen, sed facultatibus hæc ad inuicem pugnantibus.

Cæterum neque omnis dicrotus, aut interruptus habet contraxam palpitationem. Non enim illi, qui ex inæquali prodeunt intemperie calida ac frigida. De dubijs hæcenus, nunc ad distinctionem transeamus.

CAPVT XLIII.

Quomodo distinguantur causæ interrupti pulsus à causis dicrotis.

Quomodo distinguantur causæ illæ interrupti à dicroto, quas nos ex propria sententia commentum sumus, abunde exposuimus; Quæ veto ratione duæ illæ priores à Galeno proposiæ, inæqualis nempe vsus refrigerandi, & calefaciendi; refrigerandi & expellendi, modo interruptum, modo dicrotum pariant, nunc paucis declarandum.

Quomodo sunt interrupti & dicroti.

Interruptum ergo facient inæquales isti vsus, enim ex æquo pugnet calor ac frigus, calor ac fuligo, vel aliquis plus possit frigus ac fuligo, quam calor.

Contra vero excitantur dicroti, cum plus possit calor, quam frigus, aut fuligo. Omnium rationes explico.

Cum sit interruptus in medio, qui iterum recuperat motum, æque potest calor, ac frigus, calor ac fuligo. Si enim æque non possent, nec contractio distentionem interrumperet, nec distentio interrupta iterum rediret. Æque ergo in hoc pulsu possunt.

Valeat vero plus fuligo aut refrigeratio, quam calor in interruptis, qui vltimam amittunt distentionis partem, vel saltem externam quietem. Si enim res sic non se haberet, profecto contractio nihil de diastole, aut de externa quiete adimere posset. Admitte, vero, ergo plus potest, quam calor.

In dicrotis autem opus est calorem cæteros superare vsus, quia distentiones ita properant, vt contractionem prorsus obscurare videantur.

Sed dicit quispiam, nonne in dicroto pulsu, distentiones quædam sunt ad modum breues.

A breues, ac paruz: profecto: At breues diximus fieri, subla ta pōstrema motus parte, ob fuliginis incrementum, ergo etiam in dicroris fuligo ealorem superabit. Quod tamen si concederemus, scqueretur dicrorum non differre ab interrupto.

Ut ergo hanc euiemus instantiam, dicemus breuem reddi distolen dupl' citer, vel quod contractio vltimam illius partem accipiar, & hoc modo vel ad interruptum tantum spectat, vel ad interruptum cum dicroto mixtum. Non enim inconuenit, dicrorum cum interrupto quandoque misceri.

Alio modo redditur distentio breuis, calore aliqua ex parte imminuto: consuevit autem imminui, cum aliquæ præcesserint distentiones magnæ, quæ satis impleuerint vsum, ita vt cor tanto opus non habeat refrigerio. Er hoc secundo modo breuis facta distoles ad dicroros tantum spectat, quorum distentiones paruz i deo sunt, quod per priores impletus fuerit satis superq; refrigerationis usus. Sic ergo distinguuntur causæ istæ quatenus interruptos, ac dicroros excitant. Quæ autem ratione vnum causæ genus ab alio distinguui possit, mox explicabimus.

CAPVT XLIV.

Quomodo tam varia interruptorum, ac dicrororum causa inter se distinguantur.

Interruptos, ac dicroros diximus ex triplici causæ genere produci: ex inæquali vfu caloris, ac frigoris, ex inæquali vfu caloris ac fuliginis, denique ex pugna facultatis sentientis, expultricisque naturalis, cum vtraque pulsifica, tam distendente, quam contractante.

Quæ ergo ratione, vnum causæ genus ab alio distinctum esse dignoscemus? Paucis dico, inæqualem vsum priorem facile ab aliis duobus distingui ex pulsi hęcito, siue enim interruptus, siue dicrotus sit, semper eodem modo se habet, constans, impetura bilisq; est, quasi naturalis. Inconstans autem, & appetite varius, ex aliis duobus causarum generibus erit oriundus. Hoc tamen diuicimine, quod qui ex solo calore, a fuligine exoritur, sit absque palpitatione cordis, qui vero ex pugna facultatum omnium, palpitationem magnâ ex parte habeat conexam. Ad hæc priores nunquam erunt sine febre: secundi quandoque erunt cum febre, aliquando sine febre. Præterea priores erunt semper cum febre putrida: hi vero poterunt etiam esse cum ephemera. Quarto illi erunt cum putrida, quæ malori ex parte habet focum putredinis in corde vel partibus cordi proximis: Hi vero poterunt habere febres, ex remotis etiam corporis partibus excitatas. Denique illi nunquam erunt absque aliqua cordis, aut pulmonum angustia: Hi vero etiam sine hac saltem angustia momenti esse poterunt, vt ex antea dictis colligi potest.

Sed quid expediat ne sunt omnia, quæ ad hos dicroros non duos pertinent? non e quidem. Quædam enim Gal. loca hæc de re dubia, difficilia, ac controuersa, paululum adhuc nos detinent, vt illa, si fieri possit, interpretemur, dilucidemus ac conciliemus.

CAPVT XLV.

De expositione quorundam Galen. locorum, & eorum reconciliatione.

E Galen. 1. de puls. diff. 16. de dicroto verba faciens, quædam proponit, quæ & obscura, & controuersa videtur. Primum autem obscurum videtur, quod docui: loco citato, scribens inter mittentium quietem esse mediam inter duos ictus, dicrororum vero contradictionem, congressum, vel redi um.

Dicit quispiam, si dicrotus mediam habet contradictionem, ergo est duplex pulsus crebri tate inæqualis, cuius tamen oppositum nititur Galen. probare. Quod si duplex est pulsus, ergo & quietes habet medias: neque enim fieri potest contractio, quin adit quies externa, nec noua distentio, nisi adit quies interna: Quomodo ergo dicit, mediam esse quietem, inter duos inter mittentium ictus, non autem inter duos dicrororum.

Ad do secundam contradictionem, ex eodem ca. decerpam: Dicit primo Gal. dicrotum esse inæqualem, nec modo in vno ictu, sed & in pluribus; in vno quidem, prout prior ictus maior, validior, ac celerior est secundo: In pluribus vero, quatenus adest eadem vehementia, magnitudinis, ac celeritatis inæqualitas. Postea vero circa finem concludit, dicrororum pulsuum quosdam esse æquales, alios inæquales. Hæc ergo inter se aperte pugnant videntur. Quibus & alia nonnulla subnectere possem, quæ tamen ad illum remitto locum, in quo de dicroto duro incidet sermo.

non duri causas aperuit, productionis modum proposuit, & distinctionis rationem ab int-
terrupto designauit. Quæ utrum cum eodem Gale. cum ratione, & experimento consen-
tiant, nunc est expendendum.

Primum ergo, quod ad Galeni consensum spectat, non satis intelligo, quo modo in-
ter se conueniant, quæ de dictoto non duro habet 2. de prasag. 7. & 8. cum iis, quæ docet,
de prasag. cap. 4. Nam 2. de prasag. vult dictotum non durum fieri certantibus inter se duab.
facultatibus, refrigerante scilicet, & expellente, vt proxime dicemus, 3. autem de prasag. ex
puls. 4. vult eundem fieri ex inæquali cordis intemperie hæctica, seu stabili, ac firma, cuius
inæqualitatis hæctice signum proponit, hæcticam quoque febrem, & pulsum hæcticum,
absque cordis palpitatione factum, ad illius dictoti differentiam, qui cum palpitationem
habeat ad nexum, humorum potius, quam solidorum sequitur intemperiem. Hæc profecto
cum prædictis minime conueniunt: Si enim datur dictotus nō durus ex inæquali soli-
dorum cordis intemperie stabili, & hæctica, quomodo fieri poterit, concertantibus in-
ter se duabus facultatibus, dissendente scilicet, ac contrahente? An non cuius constat,
hanc esse pugnam, propter caloris atque fuliginis copiam? profecto: At vero fuligo non
est intemperies, neque in solidis continetur, sed in cauitate: neque hæcticam facit, siue sta-
bilem in æqualitatem, imo vero inæqualem, neque in febre reperitur hæctica, sed in puri-
da: quomodo ergo asserit Gale, fieri dictotum ex inæquali intemperie solidorum cordis
hæctica, cum febre hæctica?

Quod si quis dicat, duplicem esse hunc dictotum, vt pater ex Gale. quorum alterum
dicit fieri cum palpitatione, alterum sine palpitatione: illud vero fieri ex humoribus, hūc
autem ex solidis: Fateor quidem Galen. hunc utrumque proposuisse, sed dum in eo versa-
mur, quem scribit fieri ex intemperie solidorū cordis hæctica, quæro, quis sit modus, quo
hic producatur? oportet enim in hoc quoque dum media arteriæ pars distenditur, latera-
les contrahitur, sed quid quæso est, quod in hac inæquali solidorum intemperie arteriæ par-
tes laterales extrahat, non autem mediam? Video aliquem pro Gal. d. dictotum, tetrahi la-
terales partes ab intemperie frigida, dum mouetur media ab intemperie calida, eo, quod
viscus hoc, vno & eodem tempore labore intemperie vtrique eōtraria. Sed nil fucci ha-
bet fucata hæc responsio: Quis enim fieri potest, vt inæqualis hæc cordis intemperies, retri-
geret laterales arteriæ partes, quæ contrahuntur, mediam vero duntaxat calefaciat, quæ
omnium primum distenditur? Ad hæc, qui fieri potest, vt eadem inæqualis intemperies,
tot, actam varios inæquales pariat pulsus? Diximus enim ex hæc fieri disparem inæquali-
ter, interruptum, & in æqualem, secundū varias arterias, quæ huic, vel illi cordis parti, hoc,
vel illo modo intemperare, sicut in oppositis. Quomodo ergo ex hac etiam dictotus con-
furgit? Præterea, si in dictoto inæqualis hæc intemperies est hæctica, cū febre hæctica, quo-
modo, quæso, potest ita virtus constare, vt binos faciat idus? & cum mediam eleuauerit
arteriæ partem, eandem simul rursus cum laterali bus distendat? Sunt hæc omnia facul-
tatis non inualidæ signa: In febre vero hæctica nunquam valet facultas: ideo paulo ante,
cum inæqualem cordis intemperiem concederemus, deque illius pulsibus loqueremur,
dicebamus, illam non esse in facto esse, sed in fieri, atque hanc ob causam posse pulsus pro-
ducere inæquales, qui aliquo non careant robore. Nunc autem cum in æqualem propo-
nimus hæcticam, profecto factam constituamus oportet. Factam vero intemperiem abs-
que languida facultate nunquam inuenias, in qua certe dictotus pulsus fieri nequit. Mir-
ro posse aliquem obicere, in hæctica inæqualem intemperiem nunquam reperiri. Hanc
enim paruipondimus obiectionem, qui paulo post hanc rem discussuri, modum ostende-
mus, quo etiam in hæctica possit esse in æqualis intemperies, in præsentia illud tantum tā-
quam certum supponendum esse censemus, eo modo, quem ex Gal. proposuimus, dictoto-
tum non fieri ex inæquali hæctica intemperie, Idcirco aliam causam ac modum esse quæ-
rendum. Quæ ergo tandem erit causa ista? quisue productionis modus? Ego sane alios lu-
bentius audirem, quam vt ipse meam proferam sententiam; Neque enim mihi ipsi satis
confido, ingenii mei imbecillitate agnoscens: In re tamen difficili, obscura, nec satis à Ga-
len explicata, existimo cuique licere, aliquid saltem probabile asserre, vt inde excitata alio-
rum ingenia, integram rei veritatem, in cimmeriis tenebris latitantem, tandem eruant.
Idcirco quid hac de re sentiam, libere proferre non graubor.

Censeo itaque dictotum duas, vel quandoque plures esse distinctiones, quæ mediam
habeant contradictionem, esseque vnum ex iis, quos crebritate inæquales vocant: Habere
vero

ad placita
an anmō-
tar.

In feb. hūc
cum inquam
valet facul-
tas.

Dictotum nō
fieri ex in-
quali hūc
causa intem-
perie.

Adversus de
dictoto sen-
tentia.

A vero non modo crebritatis, sed & magnitudinis & paruitatis inæqualitatem.

Huius vero immediatam causam, non modo eandem esse existimo cum interruptorum causa, vel paulo ab illis distantem, sed & aliam inuenio, quam mox explicabo. Hæc itaque nunc sigillatim à nobis confirmetur, primum ergo minime apud Gal. in dubium reuocatur, quin dicrorus sit duplex, vel triplex distentio; Etenim cum scribat hunc bis pulsare, ad interrupti differentiam, qui cum sit vnica diastole, in duas diuisa, dicitur bis ferire, sane statim colligitur eum, qui bis pulset duplicem dici posse. Quod in dubium reuocatur, est, vtrum contractionem habeat mediam, nec ne? Galenus negat: ego vero id assero; sic autem probō: Duplex est pulsus, ergo ex his constare partibus debet, ex quibus omnis pulsus constet: Omnem autem pulsus diximus ex duplici motu, atque ex duplici quiete consistere.

B statim duplex autem morus est diastole & systole: Ergo dicrorus, vbi bis pulsans systolen habebit. Hoc ratio suadet: nec Galen. quicquam contra hanc sententiam habet, quod illam infringat.

Si enim dicat, deo contractionem non adesse, quia non sentitur: Dico hanc consequentiam non valere, quia contractio ex eiusdem sententia, in maximis tantum sentitur pulsibus: dicrororum vero contractio, tanquam minima, est insensibilis.

Quod si quis pro Gal. dicat, modum, quem ipse proponit, vt ostendat in dicroto duplicem esse diastolen absque systole, hoc satis demonstrare; Nihil dicit, quia modum illam reiecit. Itaque cum nihil sit contra nos, muta autem pro nobis, vt iam declarabimus, sane satis est dicere, dicrorum esse duas distentiones, per mediam contractionem distinctas, quam duas absque contractione.

C Cum autem id nobis concedatur, statim sequitur, illam esse crebritatem inæqualem. Etenim ad crebritatem constituendam, duo requiruntur: primum, vt inter duas aut plures diastoles, media cada: contractio: alterum, vt quam breuissimum sit inter vnam & alteram intervallum.

Mediam esse contractionem probauimus.

Breuissimum intervallum esse, sensus docet. Crebrum ergo esse dicrorum, nemo, qui hæc concesserit, inficiabitur. Crebritatem autem esse inæqualem, ex eo patet, quod cum patientis pulsus non semper sit dicrotus, sed quandoque tantum, propterea neque semper eodem modo erit creber.

D Accedit, quod cum dicroti non duæ tantum sint distentiones, sed quandoque plures, hæc quoque non erunt semper inter se crebritate æquales, sed inter duas maius, inter alias minus cadet intervallum.

Esse vero pulsus hunc magnitudine ac paruitate inæqualem, ex eo statim colligitur, quod prior dicroto distentio secunda ac tertia sit maior. Hæc de dicroto natura eo laudius attulimus, vt facilius in causarum cognitionem deueniremus.

Ad causas ergo quod attinet, diximus illas (si ad Gal. mentem proponantur) nil differre à causis interrupti, nisi secundum magis, & minus. Nos vero alias quoque excogitauimus, quas mox proponemus.

Priores ergo à Gal. adductæ, sunt eædem, quatenus dicrotus sit ex inæquali vsu refrigerandi, & expellendi fuliginis, vel ex inæquali vsu caloris, ac frigoris. Etenim de priori inæqualitate meminit *de presag. ex puls. cap. 8.* de altera vero, imo de vtraque *de presag. ex puls. 4.* Si ergo fiat dicrotus ex inæquali vsu caloris ac frigoris, hoc modo generatur: Dum plus potest calor, quam fuligo, distentio magnitudine superat contractionem, dum vero fuligo calorem vincit, contractio longior est distentione: Hinc sequitur inæqualitas magnitudinis distentionis in dicroto. Etenim prima distentio, quæ est maior, fit ex calore dominante, secunda ac tertia, quæ longe est minor, fit ob fuliginem vincentem; fuligo enim vincens, contractionem ac celerare facit, propterea distentionis partem accipiens, illam efficit breuiorem. Ex his ergo pater causa inæqualitatis dicroto in magnitudine, ac paruitate.

F Crebritatis autem causa est apertissima; Cum enim creber euadat pulsus vel ex aucto calore, qui facit diastolen longiorem, vel ex aucta fuligine, quæ facit contractionem magis protensam, si duæ istæ causæ simul conueniant, quis non videt creberrimum reddi debere pulsus? At in dicroto hæc simul conuenire iam diximus: Itaque dicrotus iure optimo ita creber efficitur, vt quandoque obstructione carere videatur. Hinc vero inæqualis quoque crebritas pendet: cum enim duplicem sequatur causam, calorem scilicet ac

H + fuligi:

Quæ sit diastole causa.

Distentio est duplex, vel triplex distentio.

Si vult habere contractionem mediam.

Quid sit distentio.

Distentio est creber.

Pulsus sunt quandoque dicrori distentiones.

Distentio est inæqualis pulsus.

Quomodo fit dicrorus ex inæquali calore ac frigore.

Consequenter est dicrorus.

fuliginem, prout modo calor, modo fuligo vincit, crebritas etiam inæqualis efficitur. Et hæc enns de dicroro, quatenus produciuntur ex inæquali vfu refrigerandi, & expellendi fuligines.

Quod si aliquando fiat ex inæquali vfu refrigerandi ac calefaciendi (de qua tamen redubito) non alio sane modo gigni poterit, quam eo quem *capite de interruptis* proposui, ad quem lectorem remitto. Nunc autem tertium illud causæ genus aggrediar, quod in capite de interruptis me propositurum sum pollicitus, atque de eo hucusque dicere distuli, quod sit tam interruptis, quam dicrotis commune.

Consistit genus hoc non in caloris ac frigoris, aut caloris ac fuliginis inæqualitate, sed in lucta, quæ est inter facultatem sensitivam, expultricemque naturalem cordis ex vna & facultatis pulsificam, ex alia. Quid hæc sibi velint, explico.

Cordi, non modo data est facultas pulsifica, sed & sentiens per nervum sextæ cõiugationis, de qua meminit Gal. *de vfu par. 18*. Data quoque est expultrix quædam naturalis, ab ea minime distans, quæ reliquis omnibus inest partibus, qua noxia expellere possit, de qua Galen. *de præfag. ex puls. 12*. Habent ergo hæc facultates suos quosdam motus, qui aliquando distentionem à pulsifica facultate factam interrumpunt, ita ut fiant pulsus interrupti, quandoque vero distensiones quasdam faciunt præproperas atque importunas, quæ in contractionis tempus cadunt, ut propterea absque contractione fieri videantur, ex quo fiunt dicroti. Modum declaro.

Hæc duæ facultates, sensitiva & expultrix, vel considerantur in parte cordis externa, vel in interna, nempe in ventriculis, si irriterentur.

In externa, tunc iritamenti causa erit in pericardii cavitæte, aut tuniceis, idcirco quandoque basin cordis, nonnunquam cuspidem afficiet.

Si basin, tunc sentiens facultas noxam percipit in extensione, atque ideo fugiens, contractionem facit, sin cuspidem contingit læsio in contractione, ideo ex fuga sequetur extensio. Ex priore motu fit interruptus, ex secundo dicrotus.

Ratio huius dicti est talis: Cum noxia materia sit basi propinqua, quo magis eor dilatatur, eo magis causæ nocenti appropinquat, eoque magis ab eadem læditur. Ut ergo noxam fugiat, contrahitur. Cum vero hæc causa noxia sit cuspidi vicinior, quo magis contrahitur eor, eo magis causæ noxiæ appropinquat, atque ab ea læditur, hinc fugiens, ad distentionem properat. Ex priore motu (ut dixi) fit interruptus, ex secundo dicrotus.

Quia vero interruptorum tres cum Gal. diximus esse species, vnam in qua motus in medio interruptus, post interruptionem reuertitur; alteram, in qua vltima distentionis pars admittitur; tertiam in qua quies tantum exterior perdita est. Prior fit ex contractionis vfu, extensionis vsum æquante,

Cum enim ex vna parte adsit sensitiva facultas contrahens, vrgente etiam fuligine: ex alia vero vrgat quoque calor, atque irriteretur naturalis expultrix ad extensionem, necessum est inceptam distentionem à contractione interpellari, sed statim perfici, etiam si in medio interrumpatur. Quando autem fuligo sit multa, calor vero non admodum ingens, neque expultrix admodum irritata, tunc fiet vnus ex interruptis in secunda ac tertia differentia, ut fusius infra explicabo.

Cæterum quia interruptorum, qui post interruptionem motum recuperant, quidā illam recipiunt priore imbecilliorē, minorem atque tardiorē, alii robustiorē, maiorem ac celeriorē: Priores habent facultatem expultricem, vel non admodum irritatam, vel imbecillam: secundi autem valde irritata m, ac validam.

Porro non dissimili ratione singulæ specifice dicrororum differentie in suas referri possunt causas. Cum enim plurimæ sint, quarum meminit Gal. *de puls. diff. 16*: à plenitudine, magnitudine, dardie, celeritate, ac crebritate desumptæ, harum omnium varietas ex vario causarum concursu exoriri potest. Mitto in præsentia diuos, de quibus suo loco: & ad reliquos me conuerto, qui cum maiores, ac celeriores fuerint, habebunt pro causa non modo facultatem irritatā sentientem, sed & expultricem m, & calorem auctum, cū virtute valida: Minores vero ac tardiores efficiet calor non vrgens, & facultas sentiens, atque expultrix, ad distentionem non admodum proclivis: Inæquales vero celeritate pariet uterque vfu valde auctus, cum inæquali iam propositarum facultatum irritamēto. Et hæc enns de interruptis & dicrotis, ob sensitivæ & expultricis facultatis irritamentum, in extēna cordis parte.

Quod

*Terria, quæ
noxa dicitur
in causa ad
causam re-
spondente.*

*Quomodo
ad expultri-
cem, & senti-
entem facul-
tatem cordis, fit
dicroti & in-
terrupti.*

*Ut in inter-
ruptis & di-
crotis.*

A Quod si sermo sit de his facultatibus, quatenus in cordis sinibus reperiuntur, existimo has frequentius facere dicrotos, quam interruptos; quomodo tamen interrupti quomodo exoriri possint, breuiter exponam, mox ad dicrotos orationem conuertam.

Interrupti ergo ex his facultatibus in cordis ventriculis irritatis, sic fieri possunt: Quod ex vna parte addit calor, ac sensitiua facultas, quæ noxam fugiat, ex quibus fit dissentio: Ex alia vero virgeat facultatem pulsificam contrahentem fuligo multa, insurgatque expultrix ad noxia per contractionem expellenda; Tunc dum fit dissentio, necessario etiam sequitur contractio, quæ aut mediam interruptit diastolen, aut postremam adimit partem, in interruptamque generat. Quod si facultas sentiens irritata dissentionem faciens, nil habeat, quod illam interpellat, imo vero naturalem expultricem habeat auxiliatricem,

B hinc dicrotus emerget, ac multiplex.

Dicrotus quidem, quia dissentiones multiplicantur sere absque contractione: Multiplex vero, quatenus varia est magnitudinis ac crebritatis inæqualitas, prout plures aut pauciores concurrunt ad dissentionem causæ, vt paulo antea explicauimus. Probabilis, ni fallor, est hic interruptorum ac dicrotorum causâ, probabilior ramẽ, imo certa euadet, cum ratione & Gal. auctoritate fuerit munita.

Ratio quidem est multiplex, & prima quidem talis: dicrotus atque interruptus pulsus cum illa inueniuntur cordis palpitatione, quam facit facultas expultrix irritata à causa noxia: ergo tam palpitatio, quam prauorum illorum pulsuum, vnicæ etiæ causâ, nẽpe facultas expultrix irritata.

C Pulsus illos cum palpitatione repetiti, docet experientia, & Galenus.

Experientia quidem multiplex est, sufficiat tamen vnicum pro exemplo opponere, in quem hoc tempore, dũ hæc typis mandarentur, incidit: est autem Religiosus quidam S. Iustinus, qui palpitatione hac cordis spuria laboras, nedum dicrotos, sed & omni inæqualitatis genere donatos habebat pulsus, cuius rei testimonium habeo Excellentissimum Alexandrum Vigontiam, aliosque nonnullos studiosos, qui cum casu hic interfuerint, eũ primum ad ægrum fui vocatus, inæqualitates istas singuli exploratas habuere: Gal. vero 3. de præfag. ex puls. 4. apertissime docet, dicrotum, qui fit ex inæquali humorum intemperie, cum palpitatione connexum esse. Hanc vero palpitationem esse illam, quæ fit ex facultatis expultricis irritamento, probò ex eisdẽ Gal. verbis partim citat. loco, partim 6. de Plac. 1.

D Ex citato quidem loco: Ibi enim palpitacionem proponit ex inæquali humoris intemperie factam: sed sic est, quod inæqualis intemperies, vt patet ex lib. de inæquali intemperie, est dolorifica, ergo sentienti, & expultrici insensã.

Addo, quod cum palpitatio triplex sit, vna ex flatu: secunda ex imbecilla facultate pugnantem cum gtauitate: tertia ex facultate irritatã. Non potest Gal. loco citato intelligi de palpitatio ac ex flatu, quia inquit, illam ex inæquali intemperie fieri, non ex flatu.

Accedit, quod docet experientia, palpitacionem ex flatu pulsus non facere valde inæquales: ergo de hac non loquitur.

Sed neque de secunda, quæ tremori est similis: quandoquidem hæc tremulos facit pulsus, de quibus Gal. 2. de præfag. cap. 12. agit, tanquam de valde distinctis à pulsibus palpitacionis: Relinquitur ergo ibi Galenum loqui de palpitacione factã, propter expultricis irritamentum.

Quod confirmatur ex 6. de Placitu, cap. primo. Eo enim in loco inquit, palpitacionem ac pulsum præter naturam eodem nomine appellari, affectiones scilicet, non operationes.

Addit affectiones istas perinde atque naturalem pulsuum ex corde fieri, id est (vt ego interpretor) ex facultate aliqua cordis, sed impulsã à causã præter naturam, qualis est expultrix irritata: ergo sequitur & palpitacionem hanc, & pulsus propositos sequi huius facultatis irritamentum.

Confirmatur hanc veritatem ea, quæ habet Gale. 3. de loc. affect. secundò, cum inquit, F dupliciter palpitacionem fieri, vel per se, vel quasi in humore quodam cor ipsum mouetur. Nomine enim palpitacionis per se, intelligit legitimam ex flatu factam. Nomine alterius, illam quam facit facultas expultrix irritata à causa noxia, siue sit aqua, aut rumor aliquis pericardii, siue alia consimilis, quam necessatio pulsus dicrotus, atq; alius quilibet inæqualis consequitur.

Sed vt res clarior reddatur, alio eandem confirmemus argumẽto. Est autem tale: Nul-

Secundo, 6. de præfag. tione, hanc dicroti à prædicta palpitacione.

Cum quæ palpitacionis curia inter resque ad diuinem respectum.

triplex palpitacione.

In quibus
affectibus
interruptum
est dicrotum
pulsum ha-
bente, ad
causam, cor-
de & ar-
teriarum ex-
pulsivam in-
fensa.

luis est affectus, in quo adfuit pulsus dicrotus, atque interruptus, in quo non adfuit causa expultrici facul-
tati cordis, & artieriarum infensa, ergo sequitur propriam horum causam, esse hoc ipsum expultrici
irritamentum. In affectibus dicrotorum interruptorumque pulsuum adesse causam irri-
tantem, tunc reddetur conspicuum, cum affectus isti fuerint enumerati: quod eo liben-
tius faciam, quia eorum enumeratio, maxime facit ad præsignium præsentium, ac præteri-
torum. Doecebit enim nos hæc pars morbos omnes, ac causas, in quibus, & ex quibus di-
croti, interruptique pulsus fieri possunt.

Reperiuntur ergo pulsus isti in pneumonia, lethargo, orihopncea, destillationibus
quibuscunque ad læves arterias & cor; Febris quæ sunt cum crisi mala ac periculosa,
affectibus oris ventriculi varils, atque animi affectibus nonnullis. In his omnibus
casibus pulsus istos reperiri, ex Galeno demonstrabo (quoniam ipsa cuique sufficere
debet experientia) mox vero affectiones istas facultatem habere expultricem irritatam,
statim subinngam.

Pulsus Peri-
pneumoniae
ac Lethargi

Pneumonia ergo Gal. 4. de caus. pul. inquit habere pulsus dicrotos, atque in vno istu
inæquales.

Lethargum eodem loco inquit eisdem habere pulsus, quos habet peripneumonia.

Orihopnceam secundum de loc. affect. 4. inquit pneumoniæ esse connexam, ergo eisdem
habet pulsus quos pneumonia, veritatem ex 4. illo de caus. pul. colligitur.

De crudis lævium artieriarum tuberculis, Gal. 4. de loc. affect. ultimo in casu Anti-
patri, nostra quoque accedente experientia, & Petri Salli diuersi hæc de re fida attesta-
tione.

Inæqualis
pulsus in a-
nimi affecti-
bus.

De animi affectibus, idem Galen. lib. de præcogn. ad Posthumum cap. 8. qui in aman-
tibus, certantibus, atque grauitur animo perturbatis inæquales pulsus fieri docet, inter quos
sanè dicroti & interrupti sunt frequentissimi.

De oris autem ventriculi affectibus, quam facile inæquales hos pulsus habeant,
quisque apud Galenum legere poterit 3. de præsig. ex pul. 7. vbi de pulsibus, qui in principiis
accessionum apparent, verba facit, quarto de caus. pul. 23. vbi pariter de pulsibus oris ventri-
culi affecti loquitur 12. meth. cap. 3. vbi de pulsibus syncope humorosæ edidit. Quo in
loco lectorem monitum volo, quod quamuis Gal. non aperte dicat, in synopali humo-
rosa pulsus esse dicrotos, aut interruptos, sed tantum esse inæquales, attamen ex his, quæ
subdit, manifeste docet inæqualium nomine, interruptos quoque intellexisse, scribit e-
nim, quod si pulsus sit valde inæqualis male: si vero non intersitus fuerit, bene sperandum.

Gal. in qua
de pulsibus
non minus etiam
intersitus
audet.

Notanda sunt illa verba, si non sit intersitus, quæ Galen. consulte opposuit pulsui inæquali,
ex quo aperte docet inæqualis nomine se quoque intersitum comprehendere.

Quæ cum ita sint, ea quæ de inæqualitate scribit 3. de cris. ult. in febribus, quæ cum
pugna, ac periculo sunt, eodem modo intelligenda esse existimo de inæqualitate videli-
cet bis pulsante, atque interrupta.

Quæ de
destillatione
dicroti &
interrupti
affectus.

Porro ad destillationes quod attinet, sanè non semper pariunt pulsus dicrotos, in-
terruptosque, sed tunc tantum, cum materia ad læves labitur arterias, quod cum ræ-
do admodum contingat, sæpius autem in asperas descendat. hinc fit, vt pauci sint patien-
tes, destillatione cum pulsibus dicrotis, atque interruptis affecti, plurimi vero absque his,
difficili tamen cum tussi, atque respiratione tentanti. Etenim dum materia in asperis sta-
bulatur arteriis, tussim, difficilemque respirationem; dum vero ad læves transit arterias,
inæquales excitat pulsus.

Ad usum ab
aliis obser-
uati.

Quinque hoc ipse anno habui patientis cum prædictis pulsibus, tres cum febre, du-
os absque febre. Febricentes longis antea, ac grauibz tentabatur destillationibus, cum
frequenti orihopncea, absque vlla pulsus interruptione, vel erebrius inæqualitate. Te-
pore febris, nemo illorum difficili spiratione ex angustia instrumentorum tentatus est,
sed illa tantum, quam faciebat visus auctus, pulsus tamen pluries habuere dicrotos, atque
interruptos. Non ob aliam, vt patet causam, quam quod colliquata à calore febrili mare-
ria, in asperis arteriis contenta, & ad læves delabente, tussis, ac difficilis spiratio eederet,
inæqualitas vero, atque intermissio, ex irritata cordis, artieriarumque expultrice superueni-
ret. Vnus ex his fuit iacobus Spinus metcator ad Plateam lignorum, senex annorum 75-
qui diu laborauit febre, fluxuque alui, cum prædictis pulsibus. Alter fuit petilus Cas-
toreus lanua, eadem febre, ac fluxu alui pariter diu consistens. Tertia fuit vetula quæ-
dam annorum 80. in platea S. Georgii, quæ tamen fluxu alui non fuit correpta. Er hæc
qui-

A quidem tres fuerunt cum febre, alios autem duos, quorum memini, inueni per quædam dierum intervalla, hos habere pulsus, propter iam dictas causas, absque febre. Et hæc lenius ni fallor, satis patet, dicteros, atque interruptos fieri in omnibus iam enumeratis affectibus, postque fieri in aliis consimilibus, in quibus scilicet facultas expultrice cordis, & arteriarum ad noxia expellenda insurgat.

Ex hac vero irritatione prædictos fieri pulsus, sigillatim quoque nobis erit demonstrandum: Est enim hoc totius huiusce difficultatis centrum.

Accipio autem primum pneumoniam, & lethargum, atque in illis ex irrimamento fieri dicteros, atque interruptos sic probō: *Pulsus isti in pneumonia, ac lethargo non possunt fieri, nisi ex instrumentorum duritie, quia molles sunt; neque ex inæquali calore ac frigore, propter causas ante*

*Expiratio
ne si dura-
tur & mor-
tuosa.*

B *expositus, neque ex inæquali calore, ac fuligine, quia calor in lethargo potissimum, ac pneumonia pi-
tuitosa, nunquam ita abundat, ut possit esse fuligini æqualis: Ergo nulla alia relinquitur causa, præter hanc
irritatam facultatem expultricem.* Hoc ni fallor illi facile concedent, qui sciunt, in utraque af-
fectione multam adesse humiditatem, quæ vi caloris febris facile funditur ac colligatur,
ut in læues arterias, atque cor penetrare valeat. Etenim de lethargo verba faciens Hip-
pocr. 3. de morbis, inquit, lethargicos tussis vexari, expuitionem habere liquidam, & quan-
doque purpuratos fieri, quod etiam secundo de prædictionibus docuerat. At si lethargus pos-
test hæc facere, quid quæro de pulmonia censendum? aptissima sane est affectio ista, sicuti
& Asthma, & Orthopnoea, & omnis ex capite in pulmones defluxio pulsus istos patet, &
irritata cordis arteriarumque expultrice. Quod si id præstant affectiones quæ longius à

C corde distant, putabimus ne, illas quæ cordi sunt proximæ, aut quæ in ipso met reperiu-
tur corde id non faciuras? Hoc equidem à ratione prorsus esset alienum. Idcirco, & cruda
arteriarum læuium tubercula, & multo magis impacti in corde aut pericardio humores,
vel in illud impetu quodam irruentes, dummodo pravi, ac maligni fuerint, facultatem
hanc irritabant, interruptosque, & dicteros faciunt.

Necamen quidquam gratis accepisse videamur, id quoque in febribus atque aliis
affectibus probemus. Febres illas malignas, quæ crisin habent ante tempus, habere hanc
cordis, & arteriarum expultricem irritatam, docent apertissime Gal. verba 3. de crifibus ul-
timo, quæ sic habent. *Inæquali autem pulsus, pluribus quidem crifibus fit, & præcipue cum non
sunt sine pugna, ac periculo.* Quid quæro est in crifibus pugna, ex qua fit pulsus inæqualitas,

D quam motus expultricis naturalis, non autem pulsificæ? Hoc si quis negaverit, Gal. con-
sulat toto illo cap. citato, ubi nullius aliterius facultatis mentio fit, quam expultricis natura-
lis. Propterea 4. de præfag. ex puls. 12. docet omnem crisin esse opus facultatis expultricis na-
turalis, non autem pulsificæ: & crifis tempore fieri pulsus magnos, ac quæ alios, contra-
ctionem vero minus celerem, quia crifis non fit à facultate pulsifica contrahente, sed à
naturalis expultrice. Si ergo hac facultate cum pugna ac periculo expellente, sunt pulsus
inæquales, sequitur necessario hanc inæqualitatem fieri ob motum expultricis irritatæ:
Vnde cum tam sit evidens, quam quod evidentissimum, quis quæro negare audebit, ean-
dem inæqualitatem fieri ex aliis quoque morbis, ac symptomatis, eodem modo corpus
verantibus? Certe nulla erit negationis ratio: Si enim sunt interrupti, ac dicteri ex pu-
gna facultatis expultricis cum humoribus noxiis in malignis febribus, nulla est ratio, cur
idem noxius humor, etiam citra febrim, aut in alia quacunque febre absque crifi, dum-
modo irritet, non possit hos pulsus gignere. Idcirco Gal. 3. illo de crifibus ultimo inquit, præ-
cipue inæquales hos fieri pulsus in febribus, in quibus adsint vomitus signa, grauitasque,
ac morus ventriculi, ex quo statim videtur inferre, inæqualitatem fieri motum expul-
tricis irritatæ à causa grauantæ, aut mordente. Quod etiam colligitur ex tertio de præfag. ex
puls. 7. dum proponit causas inæqualitatis pulsuum, quæ fit in principis accessuum, & ex
4. de caus. puls. 23. ubi de pulsibus ex affectu omibus oris ventriculi loquitur.

*Crisis fit à
facultate
pultrice na-
turali, non
pulsifica.*

E Sed ut tandem omnia in vnum redigam locum, consulant lectores Galenum 2. de
caus. puls. 2. ubi quanquam de causis inæqualium pulsuum ex instrumentis se dicturum
profiteatur, attamen nil de duritie aut mollitie, quæ instrumentorum est propria, loquitur.
sed hoc tantum toto illo capite docet, omnem inæqualitatem ad instrumenta relatam,
fieri à facultate valida irritata, quæ conatur expellere ea, quæ aut foris offusa arteriis sunt,
aut membranis impinguntur, aut interiores obstruunt meatus.

*Humor no-
xius id ci-
tra, quæ est
febris absque
crifi inæqua-
lis pulsus fa-
cit, ut pulsus
dixi expul-
tricis irritatæ.*

F Porro cum facultas ista, non possit esse contrahens, utpote quæ solam detrudit su-
liginem, oportet ergo eam esse expultricem naturalem: Ut tandem omnis inæqualitas
quæ

*Duritie &
mollitiam
ad instrumen-
ta, non fieri
propria.*

quæ non fiat ex languida facultate, aut inæquali intemperie, ad irritatam expultricem naturalem referatur, quamuis à Gal. sub titulo inæqualitatis instrumentorum pertrahatur. Idcirco non modo interrupti in vno actu, sed in æteruo, nec modo dicroti, sed & intercurrentes dicrotis valde similes, ex hoc expultrici irritamento producantur.

Et de intermittentibus quidem res est clarissima, ex 2. de caus. puls. 2.

De intercurrentibus vero cum dicrotis, vt dixi, valde sint similes, idem nunc probō, Etenim vnus probatio est alterius demonstratio.

Galenus ergo secundo de prasag. expuls. 5. scribit intercurrentem fieri crisis tempore: Tunc sic arguo, ex eodem Gal. 4. de prasag. 12. crisis tempore mouetur expultrix naturalis, ergo intercurrentis causa est expultrix naturalis. Tam antecedens, quam consequentia patet, sequitur ergo ex his alia consequentia, dicrotum ex eadem fieri facultate, ex qua intercurrentis: Etenim intercurrentis à dicroto specie non differt, sed tantum secundum magis & minus: ergo nec easus differt.

Quod specie non differat, probō: vterque est crebritate inæqualis, vterque habet distentiones multiplicatas, atque vsque adeo crebras, vt contractionem aliquam obicitate videantur, ergo sunt eiusdem naturæ, habebunt ergo easdem causas, secundum magis & minus tantum inter se differentes. Quod magis adhuc confirmatur, quia vterque in impulsu moniis, ergo habent easdem causas.

Dicrotum fieri in pulmoniis, docui ex 4. de puls. caus. intercurrentem vero ex 2. de prasag. expuls. 5. ergo ambo eandem habent naturam.

At vero si dicrotus & intercurrentis causis non differunt, ergo interruptus cum his conueniet. Ostendimus enim interruptum & dicrotum easdem habere causas: ex 2. axiomate autem logico: quæ sunt eadem inter se, sunt quoque eadem cum tertio: sed intercurrentis & dicrotus conueniunt causis inter se, ergo conueniet quoque interruptus, qui à dicroto causis non differt. His profecto existimo vnumquemque persuaderi posse.

Sed Gal. de interruptis disertentem audiamus, qui vt arbitror vsque adeo claris verbis hanc aperuim veritatem. vt hæc duntaxat ad opinionis nostræ confirmationem latius esse poterint. Itaq; 2. de puls. caus. 5. de Caprizante verba faciens, scribit facultatem prius victam imminere grauius, vt superet reiciatque molesta. Tunc quæro, hæc quæ reuincit, an contractione, an potius distentione eiciat? Non contractione, quia ne non rediret ad distentionis motum: ergo distentione, sed sic est, quod facultas pulserit dum distendit, non expellit, imo vero attrahit: ergo oportet esse aliam facultatem, quæ hos faciat, talis est expultrix naturalis. Itaq; etiam in Caprizante, omni quæ interrupto, qui post interruptionem reuertitur, vt noxia detrudantur, expultrix naturalis ea est, quæ mouet.

Clarius adhuc hoc ipsum confirmat Gal. 2. de prasag. 6. v. b. de intermittente in vno pulsu hæc habet: Hi enim pulsus generantur cum simul & certat natura, & impeditur ab insalubribus causis. Ergo cum reuicere illas quodammodo valeas, atque velut vincula soluta motum à quiete præstes potiorē, signum est commodius, &c. Hæc verba hanc veritatem per belle aperuunt: Primum quia facultatem, quæ certat, vocet naturam, quæ apud Gal. est facultas inferior pulserit. Secundo dicit illam impediri ab insalubribus causis. Insalubrem autem causarum nomine, non intelligit fuliginem, hæc enim non impedit facultatem, quomodo moueatur, sed sollicitat ad contractionem: Per insalubres ergo causas illas intelligit, quæ sentiēt. & expultrici infensæ sunt. Quod confirmatur, quia, inquit, hanc facultatem ita dete hæc reuicere in distentione, dum perficit interruptam distentionem, & quasi vinculo quodam solui. Quæ omnia aperte declarant noxam facultatis expultrici grauari & irritari, non autem primo, ac per se pulserit.

CAPVT XLII

De quibusdam dubiis contra propositam sententiam et eorum solutione.

Contra ea, quæ de interruptis, ac dicroti causis proximo hoc capite fusius diximus, nulla proponi possunt, quæ dilucidatione, & solutione indigent. Etenim partim ob scura, partim vero dubia sunt.

Illud primum controuersum videtur, quam ob causam in hac parte, quam diximus, causas simplices, ex par e vsus tantum pertrahere, tot simul causas inleramus, sententiam scilicet, atque expultricem naturalem: Quibus breuiter dico, nos vnicam hoc in loco proponere contentiuam, vsum scilicet, non in conuenire vero alias quoque ad v-

gcic

Agere, dum modo continentes non sint. Sed rursus statim instabit quispiam, quomodo responso hæc vera esse possit, nos videlicet, de aliis duabus contentiis causis, ne verbum quidem facere, esse passim & facultatis & instrumentorum facta sit mentio? His dubiis, quia duo sunt sigillatim satisfacere oportet. Atque ad primum quod attinet, cum querimus, cur instituto sermone de causis pulsuum ex parte usus, facultatis mentionem fecerimus, de qua satis suo loco diximus. Respondeo, facultatem cordis esse triplicem, sentientem, naturalem, ac vitalem.

Dubitatio 2

Solutio.
Triplex est
de facultatibus

Hactenus quando fuit sermo de pulsibus facultatis, nomine facultatis, vitalem tantum intelligebamus. Nunc vero facultatis nomine, sentientem atque expultricem naturalem intelleximus.

B Quod si quis rursus querat, in quonam distinguantur causæ granantes facultatem vitalem, ex quibus diximus fieri interruptos pulsus, à causis istis sentientem, atque expultricem lædentibus, ex quibus, eosdem fieri docuimus. Respondeo, vitalem facultatem gravari ob quosdam instrumentarios morbos cordis: sentientem vero, & expultricem lædi ab errore externo potius, quam à morbo. Hinc fit, ut tunc dicatur gravata esse facultas, cum in membrana, carne aut ventriculis cordis, impactus sit humor multus, cum tumore, aut citra tumorem. Tunc vero sentiens, & expultrix dicuntur lædi, cum in pericardio, aut ventriculis, noxius humor, aut vapor potius qualitate, quam copia noxius reperiatur, vel aliunde in cordis partes affluat, ex quo facultates istæ, non grauentur, sed potius lædantur, atque irritentur. Patet ergo quantum distet interruptus pulsus ex facultate vitali gravata ab eo, qui fit ex sentiente & expultrice irritatis.

Dubitatio 3

Solutio.

Sed quid dicemus ad objectionem de pulsibus istis à causâ instrumentaria productis? Etenim cum dixerimus, dicrotos, atque interruptos fieri in pneumonia lethargo, crudisque læum arteriarum tuberculis, (sane ex his statim patet, instrumenta esse læta: quocumque ergo instrumentorum vitia permiscere cum causâ ex parte usus.

Dubitatio 4

Solutio huius argumenti ex hæcenus dictis facile colligitur. Instrumentorum vitia dupliciter considerantur, vel ut causæ pulsuum immediatæ, vel ut mediatæ.

Solutio.

Ut immediatæ, tractabuntur infra.

Instrumentum
vbi vitio de-
phicit con-
sideratur.

Ut mediatæ, sunt: hoc loco proponitur. Hoc autem in loco, quatenus mediatæ sunt causæ, proposita esse instrumentorum vitia, sic proba: Hæc vitia fuere à nobis considerata, prout vsum in corde augent, ergo ut causæ mediæ: Nam immediata causâ, est ipse vsum auctus.

D Secundo proba sic: Hæc vitia fuere considerata, ut mittunt aliquos humores; aut vapores in cor, qui sentientem, expultricemque facultatem irritant, ergo ut causæ mediæ. Etenim immediatæ erunt, illæmet facultates irritatæ. Rem vero sic esse, alia quoque ratione confirmo. *Interrupti ac dicroti ex instrumentis, vel saltem ex composita causa instrumentis scilicet, & vsum aucto oriundi, sunt omnes duri: At vero illi, de quibus fuit sermo sunt molles, ergo non pertinent ad instrumenta.* Maiorem probabimus suo loco. Minorem probat ipsemet Galen. qui *capite de pneumonia* inquit, raro in pneumonia fieri dicrotos, quia dicroti magna ex parte sunt duri, ex pneumonia vero molles.

E Eadem vero est lethargicorum ratio. Etenim lethargus quoque ob partem affectâ, ac materiam, non minus facit pulsus molles, quam pneumonia.

Nec quis obiciat, molles quoque ad instrumenta pertinere: Nam etsi hoc concedimus, negamus tamen ex mollietate vllum fieri dicrotum, vel interruptum. Si ergo mollietatis non est dicroti causâ, opus est in affectu mollietatem facientem, aliam esse dicroti causam, qualis est à nobis relata.

At vero rursus instabit qu'piam, proposita esse varia arteriarum vitia, quæ instrumenta necessaria efficiunt duriora, ut propterea saltem hanc ob causam limites nostros transgressimus. Quibus respondeo, nos semper hoc in loco, omnia vitia siue essentialia, siue per consensum proposita, considerasse, ut vsum augent, facultatemque sentientem, & expultricem irritant, quâ ratione ad hunc locum pertinent: si vero quid aliud facient, alio in loco proponetur: ac considerabitur.

Aliud quoque circa hoc ipsum occurrit dubium. Si cum vsum auctum quoque alia duæ causæ, nempe sentientia, & expultrix naturaliter, ergo non proponitur unica causâ. Solutio est, proponitur unica contentiva, reliquæ non ad contentivas, magis tamē ad vsum spectant, à quo impelluntur, quam ad alias causas. His solentis dubiis, ad alia me conuerto.

A breues, ac parue? profecto: At breues diximus fieri, sublata postrema motus parte, ob fuliginis incrementum, ergo etiam in dirotis fuligo calorem superabit. Quod tamen si concederemus, sequeretur dirotum non differre ab interrupto.

Ut ergo hanc cuiremus instantiam, dicemus breuem reddi diastolen dupliciter, vel quod contractio vltima nullius partem accipiat, & hoc modo vel ad interruptum tantum spectat, vel ad interruptum eum diroto mixtum. Non enim inconuenit, dirotorum eum interrupto quandoque misceri.

Alio modo redditur distentio breuis, calore aliqua ex parte imminuto: & consuevit autem imminui, cum aliquæ præcesserint distentiones magnæ, quæ satis impleuerint vsum, ita ut cor tanto opus non habeat refrigerio. Et hoc secundo modo breuis facta di-

Bstoles ad dirotos tantum spectat, quorum distentiones parue ideo fiunt, quod per priores impletus fuerit satis superque refrigerationis usus. Sic ergo distinguuntur causæ istæ quatenus interruptos, ac dirotos excitant. Quæ autem ratione vnum causæ genus ab alio distingui possit, mox explicabimus.

CAPVT XLIV.

Quomodo tam varia interruptorum, ac dirotorum causa inter se distinguantur.

Interruptos, ac dirotos diximus ex triplici causæ genere produci: ex inæquali vsu caloris, ac frigoris, ex inæquali vsu caloris ac fuliginis, denique ex pugna facultatis sentientis, expultricisque naturalis, eum vtraque pulsificæ, tam distendente, quam contra-

Cheate.

Quæ ergo ratione, vnum eorum genus ab alio distinctum esse dignoscemus? Paucis dico, inæqualem vsum priorem facile ab aliis duobus distingui ex pulsi hectico, siue enim interruptus, siue dirotus sit, semper eodem modo se habet, constans, impermutabilisq; est, quasi naturalis. Inconstans autem, & apprimè varius, ex aliis duobus causarum generibus erit oriundus. Hoc tamen ducimus, quod qui ex solo calore, a fuligine exoritur, sit absque palpitatione cordis, qui vero ex pugna facultatum omnium, palpitationem magnâ ex parte habeat con nexam. Ad hæc priores nunquam erunt sine febre: secundæ quædoque erunt eum febre, aliquando sine febre. Præterea priores erunt semper eum febre putrida: hi vero poterunt etiam esse eum ephemera. Quarto illi erunt eum putrida, quæ maior ex parte habet focum putredinis in corde vel partibus cordi proximis: Hi vero poterunt habere febres, ex remotis etiam corporis partibus excitatas. Denique illi iniquam erunt absque aliqua cordis, aut pulmonum angustia: Hi vero etiam sine hac saltem magni momenti esse poterunt, ut ex antea dictis colligi potest.

Sed quid expedita ne sunt omnia, quæ ad hos dirotos non diros pertinent? non equidem. Quædam enim Gal. loca hæc de re dubia, difficilia, ac controuersa, paululum adhuc nos detinent, ut illa, si fieri possit, interpretemur, diluamus ac conciliemus.

CAPVT XLV.

De expositione quorundam Galen. locorum, & eorum reconciliatione.

E Galen. 1. de puls. diff. 16. de diroto verba faciens, quædam proponit, quæ & obscura, & controuersa videtur. Primum autem obscurum videtur, quod docui: loca citato, scribens intermittentium quietem esse mediam inter duos ictus, dirotorum vero contractionem, congressum, vel redi um.

Dicit quispiam, si dirotus mediam habet contractionem, ergo est duplex pulsus erebrire inæqualis, cuius tamen oppositum nitiur Galen. probare. Quod si duplex est pulsus, ergo & quietes habet medias: neque enim fieri potest contractio, quin adsit quies externa, nec noua distentio, nisi adsit quies interna: Quomodo ergo dicit, mediam esse quietem, inter duos intermittentium ictus, non autem inter duos dirotorum.

Adde secundam contradictionem, ex eodem ca. decerpiam. Docet primo Gal. dirotum esse inæqualem, nec modo in vno ictu, sed & in pluribus; in vno quidem, prout prior ictus maior, validior, ac exterior est: secundo; in pluribus vero, quatenus adest eadem vehementior, magnitudinis, ac celeritatis inæqualitas. Postea vero circa finem concludit, dirotorum pulsuum quosdam esse æquales, alios inæquales. Hæc ergo inter se aperte pugnant videntur. Quibus & alia nonnulla subnectere possem, quæ tamen ad illum remitto locum, in quo de diroto duro incidet sermo.

Aulicis 1.

Ad primum ergo quod spectat, ut Gale. à contradictionis suspitione vindicetur, sciendum est, illum voluisse in dicrotot pulsu contractionem adesse, non tanquam finem vnius integræ diastoles, sed tanquam causam, ob quam, vna diastoles duos habet pulsus. Explico, vult Gal. dum incipit distendi arteria in media parte, eo ipso tempore illam contrahi in lateralibus, mox iterum distendi omnes illius partes simul. Ergo contractio est eausa, cur duplex appareat distentio, licet teneta duplex non sit, quia duplex proprie est, cuius motus in omnibus arteriæ partibus, vno & eodem tempore sentitur, tam in priori, quam in altero ictu. At in dicrotot non ita pars enim media, quæ mouetur, vnam præfert diastolen, partes laterales aliam. Iure ergo scribit Gal. non esse mediam dicrototi quietem, sed contractionem, congressum, atque reditum. Fit contractio ob laterales partes fit congressus, quia omnes simul mouentur: fit denique reditus, quia prior arteriæ pars mora iterum simul cum aliis mouetur. Sic ergo adest in dicrotot contractio, ex Gal. & tamen non est media quies, inter vnam, & alteram diastolen.

Aulicis 2.

Ad secundum quod pertinet, dico inæqualem esse magna ex parte pulsum dicrototi, quandoque tamen æqualem, quando facultas ira valeat, & visus sit audis, ut secundam distentionem emiori æqualem facere possit. Itaque sibi non contradicit Galen. quia vtrum est, dicrototum habere inæqualitatem vnius ictus, & collectiuam ut plurius, non ita tamen semper, aut necessario. Hæc pro dilucidando loco ex primo de puls. diff. 16. Transco modo, ad alium locum 3. de præfag. ca. 4. in quo præter alia multa apprimè difficilia, duo sunt consideratione digna, quæ in duobus sequentibus capitibus pertractabuntur.

CAPVT XLVI.

De altero quodam loco in tertio de præf. ex puls. quarto.

Difficilis
an Gal. res.
noberta.

Cum dicat Gal. 3. de præfag. ex puls. 4. pulsum bispulsantem dignosci ex inæquali cordis intemperie hæctica, cum febre hæctica: Durum visque adeo non nullis hoc visum est, ut textum illum, tanquam mendosum refutauerint, & vbi habet, inæqualem, existimene legendum esse æqualem. Hos minime audiendos censeo. Si enim æqualem legamus, quomodo ex æquali intemperie fieri pulsus bispulsans? Ar vero Galenus hoc probandum assumpserat, dicrototum esse bispulsantem, quia fit ex solidorum cordis inæquali intemperie. Itaque si æqualem legamus, erit sensus, cognosci pulsum bispulsantem, si citi inæquali cordis intemperie, cum idem cor hæctica & æquali intemperie laborauerit. Hoc autem, quam sit à Galeni mente alienum, nemo non nouit. Erenim ex æquali intemperie, nunquam dicrototi fieri poterit. Debet ergo text. loqui prout stat, neque id, quod dicit inæqualem debet mutari in æqualem. Quomodo autem in hæctica possit dari intemperie inæqualis, in sequenti capite enucleabimus. Nunc autem locus iste mihi apprimè aptus est visus, in quo lectores monerem, maximum in textu illius capitis reperiri mendum, quod neminem ante nos visisse animaduerti. Et sane debuissent hi, qui partem illam emendare voluerunt, quæ contradictione non indigebat, hanc potius respicere, quæ nisi corrigatur, Galen. sensum omnino cotrumpit. Sunt autem illa verba, vbi scribit: *Nec hæctica inæqualitas est, & stabilis dures, intemperies existimanda inæqualis in cordis corpore esse.* Hæc verba, si hoc legantur modo, quo & latinus, & græcus eodem habet, conclusio erit præmissis omnino contraria. Laborat ibi Galenus, ut modum ostendat, quo distinguatur dicrotot ex inæquali cordis intemperie, ab eo, qui fit ex instrumentorum vitio; & duos proposuerat modos, quibus in huius rei dignotionem venire possemus: Primus erat, vt obseruaremus, an hæctica addit in pulsu inæqualitas: Secundus, vt omnia signa exploraremus, ex quibus instrumentorum affectiones demonstrari possint. His sic propositis, hæc subiungit, quæ sunt didorum conclusio. *Quare si neque indicia adsint, quibus noscuntur hi affectiones, nec hæctica inæqualitas, & stabilis dures, inæqualis existimanda in intemperie in corpore esse.* Si ita legatur hic textus: nec hæctica inæqualitas, & stabilis dures, intemperies existimanda inæqualis in cordis corpore esse, quomodo quæto procedit hæc ratio: præmissa est ista; Si adsint inæqualitas hæctica, fit dicrotot ex inæquali cordis intemperie: conclusio vero repetita, hæc erit, cum non adsint inæqualitas hæctica, tunc cor laborat inæquali intemperie. Quantum hæc à prioribus distent, non videt. Ergo, vbi dicit textus, *nec hæctica inæqualitas, & stabilis dures, &c.* affirmatiue, ac copulatiue hoc legerem modo: *Et hæctica inæqualitas, ac stabilis per dures:* tunc enim hic erit verborum sensus: Ad dignoscendum pulsum bispulsantem, ex inæquali cordis intemperie,

Modum quo
Gal. existimans
quomodo di
dicrotot ex in
æquali cor
dis intempe
rie oritur ad
ferat ab eo
qui ex in
strumento
vitiis con
surgit.

Atemperie, ab eo contradistinctum, qui sit ex instrumentorum vitio, duo sunt necessaria; primum, vt nulla adsint signa affectus instrumentorum: Secundum, vt adsit hectica, ac stabili inæqualitas: Si enim illa desint, adsit vero hæc, quæ cordi est propriissima, protecto statim cognoscemus ex Galeno bispulsantem, ex inæquali cordis intemperie factum. Quomodo autem in hectica possit adesse inæqualis intemperies, in sequenti explicabimus.

CAPVT XLVII.

De alio quodam dubio, & eius resolutione.

Dictum est in præcedenti cap. Gal. verba, præmissarum loco posita, quæ 3. de præfag. ex puls. 4. hunc in modum habent: *At si vero simul cætera omnia induta, febrem hecticam esse declarant, multo certe dignoscitur certum inæqualem intemperiem viscerum corpus tenere*: Sic esse legenda, prout sunt: nõ autem vbi dicit, *inæqualem*, legi debere, *æqualem*. At vero si hoc modo legatur & exis, sane dubium alicui faciet, quomodo scilicet hæc inæqualis intemperies, in febre fixa stare possit, cum vbiq; docuerit Gal. præcipue vero lib. 2. de inæq. intemperies, hecticas esse æquales in temperies.

Hæc est dubitatio, quæ occurrebat. Cui sic satisfacimus: Hecticam æqualem esse intemperiem, nisi quid prohibeat, sicut enim febris est totius corporis calor, nisi quid prohibeat: prohibet autem quandoque humorum frigiditas, vel malignitas, aut viscerum inflammatio, aliæque consimiles causa, quo minus in totum calor distribuitur, ita & febris hectica, est æqualis intemperies, nisi quid prohibeat, vel humorum frigiditas, vel quid simile. Huius rei fidem facit Gal. quæ 3. de præfag. ex puls. 5. inæqualem proponit intemperiem inter cor & humores, dum cor est calidum, humores frigidi, asseritque tunc esse febrem hecticam, si ergo datur inæqualis intemperies in febre hectica, facta i. l. hæc partis comparatione, cum humoribus, dabitur quoque facta collatione vnus partis cordis cum altera. Etenim nihil prohibet, quo minus aliquando pars cordis, quæ sit frigida humori propinqua, sit pariter frigida, quæ vero ab eodem distet, sit calida, sicque erit hectica cum inæquali intemperie.

*Quomodo
in hectica
possit esse in-
æqualis in-
temperies.*

Sed dicit quispiam, ergo non d. fieri hectica a putridis, vel ephemeris? Dico hanc ab illis differre, quod hectica sit intemperies iam facta, illæ vero sint fientes, & quatenus tales inæquales vocantur, Hectica vero vt hectica, nulla est in fieri, sed tota est facta.

Cæterum rursus quispiam instabit, si hectica est intemperies facta, quomodo ergo potest illo tempore esse inæqualis? Etenim de ratione inæqualitatis est, vt hanc partem magis, illam vero minus occupet. Dico nos per inæqualem intemperiem non intelligere vnicam, sed duplicem: vnicam inæqualis semper est in fieri, duplex vero contraria, potest esse vtraque facta, & hectica aut vna saltem facta, altera fiens: Ex quibus dummodo calida sit facta, hecticam constituit febrem, etsi frigida esset in fieri. Hactenus de inæqualitatis vnus istius causis, nunc modo ad collectiuam transibimus.

*Inæqualis
est semper
duplex.*

CAPVT III.

E*De causis inæqualitatis collectiuæ ex vfu in genere.*

Pulsuum inæqualium inæqualitate collectiuæ ex inæquali vfu prodeuntium, quidam sunt Nominati, alii vero innominati.

Nominati quidem sunt intercurrentes.

Innominati vero disparēs magnitudine, celeritate, ac crebriitate, tam æqualiter, quàm inæqualiter, et tam ordinati, quam inordinati. Præter quos, sunt & inæquales in rythmis.

Horum omnium causas, quatenus ad vsum spectant, exposuit Gal. 2. de præfag. ex puls. 7. his verbis: *Item vero etiam motus qualitatesque ex præpollentibus in se partibus, comparat totum vñ* seu: nam calidiores si motus præsent, maturior simul, & celerior, maiorque sit dissentio: si frigida, se-

*Dispari pul-
su in magni-
tudinē solis-
sima inæ-
qualitatem
ex inæquali-
tate.*

Frior, tardior atque minor: ac subinde motus principatus maiors partium defertur numero: sapientiam magnitudinis vñ: quæ enim mire quippa desiderant, hæc expeditores ad opus, & intensiores sunt, etiam si numerum a quærent non requirunt. Hæc quanquam videantur apertissima, multis tamen difficultatibus sunt repleta, quas si non explicauerimus, lectores hac in parte sine vilo fructu relinuemus. Quid ergo in hac disputatione proponendum, d. soluendumque sit, exponemus in sequenti capite.

Quomodo ex inaequali usu aequales pulsus fieri possint.

Quanquam docuerit aperte Galen. *titato cap. 7. secundū de praesag. ex puls.* omnes dispa-
pulsus in aetuo, fieri pugnantibus ita inter se duabus contrariis qualitatibus calore,
scilicet, ac frigore, vt modo ex vna, modo ex alia parte stet victoria, arramen cum huius
oppositum proponat *1. de praesag. ex puls.* idcirco, vt partes istae, & affectus, in quibus haec dis-
paritas inueniatur, facile haberi possint, hoc in loco accurate admodum ea omnia, inter-
pretabimur, quae de inaequali hac intemperie inter eos, & contenta, docet Gal. *3. de praesag.
ex puls. 4. & 5.* Etenim ex huiusmodi explicatione, nedum causae & affectus omnium dispa-
rantes consequemur, qui affectus non admodum vulgares edocere possint, Gal. itaque
capit. illo 4. tertio de praesag. cum explicasset, quomodo ex inaequali cordis, & humorum in-
temperie, fierent dicitori, statim explicare aggreditur pulsus illos, qui ex inaequali in tem-
perie cordis, & vicinarum partium oriuntur.

Et accepta inaequali intemperie pro duplici qualitate contraria, illam duobus prae-
cipuis diuidit modis. Primo vt cor sit calidū, proxima frigida: secundo vt cor sit frigidum,
proxima calida.

Rursum autem vtrumque membrum in tria alia minora partitur. Corde enim ca-
lido existente, proximis vero locis frigidis, hoc tribus contingit modis: Primo vt tanta sit
cordis caliditas, quanta contentorum frigiditas: Secundo, vt maior sit cordis caliditas, quā
contentorum frigiditas: Tertio vt paulo minor sit cordis calor, quā contentorum frigus.

Pari modo subdiuiditur aliud membrum, in quo cor est frigidum, proxima calida:
Aut enim tanta est cordis frigiditas, quanta humorum caliditas; aut maior est humorum
calor, quam cordis frigiditas; aut minor est humorum calor, quam cordis frigus.

Ex his sex inaequalitatum modis, qualesnam emergant pulsus, sigillatim docet Gal.
Et primo quidem, *cap. 4.* de illis loquens, quos parit cor aequale calidum, atque sunt proxi-
ma frigida: inquit primum moderatos fore celeritate, magnitudine, ac crebritate, sed la-
guidiores: postea subiungit: hos quandoque manifeste celeriores esse futuros, nonnun-
quam vero oblate tantum, magnitudine tamen ac crebritate moderatos, sed semper rem-
issiores. Causam vero huius diuersitatis inquit esse calorem, primo ac per se, corda solida,
atque etiam membranas occupantem. Huius enim hoc esse proprium, vt ceteris
etiam partibus per se mutet pulsus ac celeritatem, tamen si magnitudinem ac crebritatem
relinquat moderatam. Celeritatem vero quandoque euidentiore, quandoque obscu-
riorem esse inquit, prout maior quoque aut minor fuerit cordis caliditas: Erenim maiori
caliditati, maior celeritas, minori autem minor aderit, quibus etiam remissio pulsuum re-
spondebit. His sic explicatis, subdit Gal. pulsus hos in quibusdam hecticis reperiri, quae ple-
rumque Medicis imponunt, qui cum videant nullam esse in pulsū magnitudinis, aut cre-
britatis factam accessionem, moderatamque esse celeritatem ac imbecillitatem, aegros
absque febre esse pronunciant, cum tamen semper hecica febre laborent, nonnunquam
pestilenti, aliquando autem non pestilenti. Occultae vero huius febris simulatque pulsus
sani causam, non putat esse aliam, quam solidorum cordis & humorum contentorum inae-
qualem intemperiem: Frigidus enim humores in corde, proximi sue cordi partibus con-
tinentos, calori cordis relinquit, non patitur magnitudinem, ac crebritatem intendatur, cum ta-
men celeritas cordis calefacti nunquam decesse possit. Hae Gal. *loci citata*, quae sane verissi-
ma sunt, atque memoriae mandanda; Febres enim has multis Medicis imponere, siue pes-
tilentes sint, siue non pestilentes, ego ipse testis esse possum, qui (non quidem ingenio meli-
opera, neque enim mihi quicquam aut in hac, aut in alia quacquam parte tribuo, sed quic-
quid habeo, si quid habeo, Deo Opt. Max. semper acceptum refero) qui, in qua, absit ver-
bo instantia, me pluries cum aliis Medicis pro hac re certasse profiteor, atque ex sola pul-
sum celeritate & remissione, pestilentes febres cognouisse assero, quas alii, nec febres qui-
dem esse affirmabant. Cum tamen vel paulo post, vel quandoque longiore temporis tra-
ctu patientes necarent. Exerceri ergo oportet Medicum, in hac dignoscenda diastoles ce-
leritate ac remissione: Erenim cum haec fuerit in promptu, etiam si reliqua sint modera-
ta, magnitudo inquam, ac crebritas, de hecica statim suspicandum, quae tamen frigidita-
tem vicinarum partium habeat connexam,

Vtrum

*Quomodo
in pulsibus
Medicis im-
ponant.*

*Qua sit cau-
sa pulsus, si-
militatem pro
si ferant.*

A Vtrum vero pestilens sit, vel non, aliis deprehendimus signis, eodem cap. 4. à Gal. propositis, nempe ex anhelitus scetore, urinis, vel crassis, vel aqueis, absque contento, vel cum quibuldam contentis, telas aranearum æmulantibus, de quorum natura, & causis, in nostro de urinis tracta, usq; disputauimus. His accedat oculorum flammæ rubor, præcipue à balneo, inappetentia, sitis, & frigida cupiditas. Hæc si derепente eueniant, hæticam pestilentem morbi festè declarant. Quod si nec sitis, nec color oculorum flammæ, nec inappetentia valida, nec urina à naturali statu mutata, nec scetor anhelitus adsint, sed pulsus celeritas dumtaxat atque remissio, cum quadam totius corporis inæqualitate, adsint, que vno verbo in diea morbi potius chronici, quam acuti, de hætica non pestilenti verèdum, quæ tamen habeat propinquas partes frigidæ. Propin quarum autem frigidarum partium nomine, cum Galen. in fine illius quarti capitis, non modo frigidus humores in sinibus contentos intelligo, sed & pericardium, humoresque pericardii, mediastini, septique partem cordi proximiorē, pulmones, & vasa omnia, quæ in cor interuntur, vel ex eo, de exeunt.

Habemus iam pulsus ex prima inæqualitate oriundos, habemus quoque affectus, in quibus sunt, & modum distinguendi illos inter se, superest, vt iam ad aliarum inæqualitatum pulsus saluam conuerteremus, sed quia paulo antèdictum est, cum Gal. ex hac prima inæqualitate, pulsus fieri quandoque celeritate moderatos; quærit quispiam, in quoniam affectu tales euadant. Non enim in hætica fieri posse videntur, si vera sunt, quæ diximus, hæticæ febris celeritatem distentionis esse perpernam comitem. Ego quantum sit ex me, existimo, hos quoque in febribus hæticis inueniri, vt cum earum calor sit satis magnus, celeritas sit euidentissima, cum minor, sit quoque celeritas obicuri or, cum adhuc minor, sit pulsus celeritate moderatus.

C Ad instantiam respondēdo, celeritatem propter oppositam frigiditatem in artetia non dignosci, hæticam tamen adesse, duobus modis dignosci posse, primo ex quadam pulsus imbecillitate; Etenim si in hac celeritatis, magnitudinis, ac crebritatis moderatione, pulsus sit iusto languidior, oportet sane consistere moderationem illam esse præter naturam, videri tamen naturalem, propter inæqualitatem intemperiem. Secundo ex cognitione eiusdem inæqualitatis intemperaturæ. Cum enim frigiditas partium cordi vicinarum nobis fuerit explorata, & tamen pulsus celeritas e moderatus appareat, sane cōfiteri oportet, cor esse iusto calidius, alioquin ex propin quarum partium frigiditate, tardos efficeret pulsus; at facit celeritate moderatos, ergo caliditatem continent præter naturam. Hæcenus de prima inæqualitate. Ad secundam & tertiam modo deueniamus, in qua cor est calidius, quam vicina sint frigidiora; aut est minus calidum, quam vicina frigidiora.

D Ex priore combinatio ne vult Gal. 3. de præfag. cap. 3. fieri pulsus celeriores, imbecilliores, maiores, ac crebriores, ita tamen vt longius ad celeritatem, & remissionem, quam ad magnitudinem, aut crebritatem inclinent.

Ex tertia vero inquit, fieri pulsus minores, ac rariore s, celeritate moderatos, aut tardos, imbecilles tamen.

E Qualesnam sint affectus, in quibus pulsus isti reperiuntur, non est difficile ex Galeno, eodem loco intelligere: Etenim pauli post inquit, in febre hætica omnes istos reperiri.

Quod si quis quærat, quomodo in febre hætica pulsus celeritate possint esse moderati? iam tradita est responsio.

Si vero ulterius vrgear, quomodo etiam tardi? Dico tardos à Gal. non absolute, sed in comparatione ad celeriores, dici tardos. Ad do rarditatem hanc non perinde futuram in corde, atque in artetis, vt ex Gal. superius ostendimus. Quo fit, vt hætica quoque potius temper sit æqualis intemperies, sed tunc tantum, cum nihil sit, quod prohibeat. Si enim adsit frigiditas aliqua opposita, non necessario est æqualis intemperies.

F Sed iam ad aliud diuisionis præcipuum deueniamus membrum, in quo inquit Gal. cor esse frigidum, vicinas vero partes calidas, quod tribus pariter specificis modis euenire diximus, in quorum priore dum æque potest cordis frigiditas, atq; vicinorum calor, redduntur pulsus magnitudine, ac crebritate moderati, tardiores tamen, atq; imbecilliores. Tardos autem intelligo, vel in distentione tantum; vel in distentione & contractione; in distentione tantum, vbi febris sit patrida; in distentione vero ac contractione, cum febris sit ephemera. Hæc Gal. cap. illi quæmo, qui qualesnam euadant pulsus, ex aliis quoque duab, quæ supersunt combinationibus, vsque adeo clare explicat verbis, vt nos, qui in diffi-

Tribus modis potest esse frigiditas, vna vero solida.

lioribus tantum immorari volumus, eos se ferre pudeat, Hæc igitur apud Galenum legat, quia intelligite ament, nos interim quæ multo difficiliora sunt examinabimus.

*Deinde,
Quid febris*

*5. Iulio,
Quid Gale.
intelligat
per cordis
frigida sit
in febribus.*

putrida: Peto qui fieri possit, ut cor de existente frigido, febris adit: Si enim febris est calida cordis intemperie, nec quidem animo concipi potest, corpus febre laborare, cor vero frigidum esse. Pro huius dubii solutione quid ego sentiam, libet aperiam. Quando Gal. inæqualem hanc constituit intemperiem iniet cor & vicinaria ut cor dicatelle frigidum, vicina vero calida, per cordis frigiditatem intelligit intemperiem habituales ac factam, quæ multo tempore ante febris ephemeræ vel putridæ aduentum in corde repetiri possit: Hoc proboduplici medio: primo, quia talis esse debet cordis frigiditas, de qua ibi Gal. loquitur, qualis fuit caliditas, de qua in superiore capite disseruerat; Sed caliditas cordis, de qua antea disputauerat, erat hæctica siue habitualis, ergo hæc quoque frigiditas, de qua in cap. 5. verbe facit, debet esse hæctica, & habitualis.

Secunda ratio: Hæc frigida intemperies, de qua ibi loquitur, pulsus facit imbecillos, ergo est hæctica & facta. Quod imbecilliores faciat docet Gal. *loc. citat.* Consequentia vero ex iis, quæ idem Gal. scribit *1. de prasag. expulsi.* est manifesta, ibi enim inquit in hoc disferre factas cordis intemperias ab iis, quæ sunt, quod facta virtutem cordis exoluant, pulsusque reddant imbecilliores, sientes vero minime.

Hoc igitur stante facilis iam patet ad solutionem aditus, cum enim dicebamus, non posse febrem vilam absque cordis calore constitui, fateor: dico enim calorem illum spirituum, vel humorum communicari cordi in fieri, & cor, quanquam ex se frigidum, tamen quatenus febris adest, incallescere.

Ad Galenum vero, qui inquit in ephemeræ ac putrida cor esse frigidius, dico Galen, tunc loqui de frigiditate vel naturali, vel acquisitiva iam diu cor obfideat, & facta, ex qua pulsus quoque redduntur imbecilliores, cum qua tamen stare potest calor hic febrilis in fieri. Quod confirmatur, quia tamen ex cordis temperaturis, quas Gal. *2. meth. cap. 1.* proponit, quædam magis, quædam vero minus ad febrem sint dispositæ, attamen omnes tamen vult febrilem suscipere posse caliditatem: inter has vero sunt frigida, frigida humida, frigida sicca, ergo fieri potest, ut cor habituali quadam intemperie frigida donatum, incalescat tamen, & febrile dicatur. Non itaque erit febris ephemeræ, ac putrida in corde nullo modo calido, sed in corde ex natura, aut ex alia quacumque diuturna causa refrigerato, quod tamen, tunc aliquam contrahet caliditatem in fieri, cum ephemeræ, putridæque febris superueniat.

His sic propositis, pro solutione dubii, patet, quomodo possit stare simul febris in corde, & intemperies frigida. Etenim febrilis calor est in fieri, frigida in facto esse.

Patet quinetiam, quomodo pulsus moderatæ magnitudinis ac crebritatis, quandoque etiam tardiores in febris istis reperiri possint, pugnante scilicet cordis habituali frigiditate aduersus calidas istas causas cordi propinquas.

Patet denique partes istæ vicinæ calidæ, erant enim illa mer, quas antea diximus esse frigidæ, calotique cordis oppositas, pericardium scilicet, mediastinum ac septi partem cordi propinquam, pulmones, vasa cordis omnia, humoresque in his locis conuenientes. Ex quibus tota Gale. mens *1. de prasag. expulsi. 4. ac 5.* est explicata, modumque aperti, quo ex duplici contraria qualitate, pulsus moderatus, vel saltem æqualis esse possit. Nunc autem ad alterum caput, quod polliceri fuimus, descendemus, quod est de causis disparium pulsuum in æcruo.

CAPVT L

Quenam sint causa, & affectiones omnium pulsuum disparium in æcruo.

Ex proxime dictis, non obscurus patet ad inveniendas disparium omnium causas, & affectiones aditus.

Primum enim, si de causis sis sermo, cum ex iis, quæ Gal. docet *2. de prasag. expulsi. 7.* appertum sit, has esse duas illas contrarias qualitates inter se pugnantas. Ex quibus a quales fieri iamiam docuimus; reliquum est, ut diuersitatis causam queramus, quam sane aliam esse non inuenimus, quam locorum diuersitatem, in quibus hæc cadit intemperaturæ inæqualitas. Etenim sicuti inæquales sunt, pugnante cordis intemperie cum intemperie pro-

Arie propinquarum partium iam enumeratarum, ita dispares euadent, dum fiet harum in-
temperatarum pugna, vno ex modis ab hoc iam explicato diuersis, qui erunt quatuor
precipui.

Aut enim pugnabit intemperies cordis cum intemperie vnus, aut plurium par-
tium, quæ aliquantulum ab eo distent; aut pugnabit in intemperies partium cordi propin-
quarum, cum iis, quæ magis distant; aut tertio pugnabit intemperies vnus partis à corde
distantis, cum alia pariter distant; aut 4. erit pugna, partium propinquarum inret se. Quid
nomine propinquarum partium intelligam, hæcenus exposui, & nunc quoque repetam,
his enim cognitis, quid nomine partium à corde magis distantium velim, statim inno-
telect.

B Proximas ergo cordi partes diximus esse pericardium, septi, ac mediastini partem, *Quæ sunt
proximæ
partes cordi*
pulmones, præcipue secundum partem, quæ læues continet arterias, vasaque omnia, pro-
xime cor ingredientia, aut ab eo excurrentia. His exceptis, reliquæ omnes possunt dici partes
à corde remotæ: hæc quidem magis, illæ vero minus.

Quomodo istæ omnes disparitatem faciant in æceruo, de cuius Gale, citato loco. Cum
enim calor viciet, celetes, magnos, ac crebros pulsus tamdiu faciet, quamdiu apud calo-
rem fuerit victoria, vincentis frigore, pulsus mutabunt in oppositos siccæ, vassilim.

Victoria autem fiat ex vna parte magis, quam ex alia, vel ratione numeri partium, *quæ sunt
partes pro-
distantes
cordi, sunt in æcer-
uo.*
vel ratione virtutis, & efficacie.

Ratione numeri, cum plures sunt, verbi gratia, calidæ, quam frigidæ.

C Ratione virtutis, cum gradus caloris vnus partis sit magis intensus, quam gradus
frigoris alterius. Est vero magis intensus, vel ex partis magnitudine, vel ex alia quacumque
causa. Sic vnus cordis calor quoadque plus potest, quam multarum partium frigus,
quod & de pulmonibus, cerebro, ventriculo, iecore, atque vtero dictum volo. Earum enim
qualitates, vel ex substantiæ, vasorumque magnitudine, vel officio plus possunt, quam aliæ
plerumque minores partes simul. Atque hæcenus quidem parer omnium disparium in æcer-
uo causa in genere. Non patet autem in specie.

Cum enim triplex sit dispar, vnus æqualiter, duo inæqualiter, vnus quidem ordina-
tus, alter inordinatus: Disparis æqualiter, nulla alia est causa, quam duplex contraria qua-
litas absque materia; disparis vero inæqualiter sed cum ordine, causa est duplex hæc qua-
litas contraria cum materia, sed stabili, ac firma; disparis autem inæqualiter, & absque or-
dine, causa est duplex hæc qualitas cum materia, mobili, vaga, & inconstanti. Omnium
ratio est conspiciua.

D Cum enim solidæ tantum partes adinuicem alterentur, cum propter soliditatem
ægre mutantur, & essentia, numero, magnitudine, ac loco sint semper eadem, hinc pau-
latim, & cum proportionem quadam ex vna in aliam transierint qualitatem: Materia vero
non sic, quæ cum facilius alteretur, neque essentia sit semper eadem, quia corrumpitur,
nec numero aut copia, quia noua generatur, aut influit, idcirco facilius ab vno in aliud ex-
tremum transire potest, ut disparitas inæqualiter fiat; Et accedente quoque eiusdem ma-
terię locali motu, inordinatio. Hæc breuiter de causa.

E Ad affectiones quod attinet, neque istæ à prioribus forma sunt diuersæ, sed loco tan-
tum. Inueniuntur enim pulsus isti in hecticis, in ephemeris, ac putridis.
In hecticis quidem erunt dispares illi, in quibus celetiores, ac crebriores pulsus nu-
mero semper superabunt oppositos.

Fient vero oppositi ob alieuius iam propositæ partis refrigerationem, quæ longius
à corde absit: Et quæ si fuerit absque materia, inæqualitatem æqualiter; si cum ma-
teria, inæqualitatem inæqualiter producet: modo cum ordine, nonnunquam absque
ordine.

Inueniuntur quoque in ephemeris, sed cum quodam discrimine. Etenim in illis,
quæ ex corde primario acenso ortum ducunt, nempe ex ira, morore, & causis similibus,
adfit vero pars aliqua in corpore frigida, celetiores, maiores ac crebriores pulsus, superabunt
oppositos: In illis autem, quæ ex aliis partibus incipiunt, ut dolore, bubone, lassitudine,
&c. sine cor sit frigida, siue partes cordi proximæ, aut saltem multæ ex præcipuis, vti
caput, iecur, ventriculus, plures erunt tardæ, paræ, ac ræ, quam oppositæ. Procedet autem
in his quoque mutatio pulsuum æqualiter, vbi non adfit materia; inæqualiter vero, vbi adfit
materia: quemadmodum in ephemeris ex obstructione, ex bubone, ex vtriusque crudelitate,

alibi.

*Quæ sunt
proximæ
partes cordi*

*Quæ sunt
proximæ
partes cordi*

*quæ sunt
partes pro-
distantes
cordi, sunt in æcer-
uo.*

*Diff. v. pul-
sus triplex.
1. quæ sunt
proximæ
cordi, sunt in æcer-
uo.*

*In quibus
aff. hecticis
adfit præ-
distans ma-
teria.*

aliisque id genus causis contingit. Inveniuntur quoque pulsus isti in putridis, sed cum in febribus sint partes cordi proximæ, propterea hæc sunt calidiores, remotæ vero sint frigidiores, longe plures erunt dissentientes, ac contractiones celeres, & magnæ, quam oppositæ, accedente quinctiam crebritate: Quod si res opposito se habeat modo, ut scilicet pars aliqua à corde remota sit febris putridæ focus, proxima vero cordi, aut cor ipsum, sint frigida, tunc plures erunt tardæ, raræ, ac parvæ pulsationes, quam oppositæ. At si eadem partes cordi propinquæ, aut eadem remotæ, contrarias inter se habeant intemperies, tunc vel æque poterunt, vel vna aliam vi, aut numero superabit, sicque vel tot erunt celeres, quot tardæ, vel quandoque illæ, nonnunquam illæ plures.

Tarditatem autem ac raritatem, semper comparative accipiendam esse moneo: alioquin pulsus istos in febribus propositis contingere, esset à ratione alienum. Sed de hac re alias.

Quod nunc superest dicendum, est in putridis nunquam pulsus istos dispares futuros æqualiter, sed semper inæqualiter, eo quod nulla sit febris putrida absque materia. Ordinatio veto, aut inordinatio, pro ratione quietis aut morus materiæ, aderunt, vel deerunt, ut paulo ante explicauimus, atque cum Gal. comprobare possumus, qui 2. de caus. puls. 2. hæc scribit: *ibi diuersa etiam continens inæqualitas necessario fit, quod nec pari copia humores perpetuo deinceps maneant, nec easdem arterias conuertent, sed ex partibus sæpe ignobilioribus in nobiliores, atque ex usdem rursus migrent in ignobiliores.* De his disparibus satis. Ad intercurrentes modo dicendum.

CAPVT LI.

De Intercurrentis pulsus causis.

Gal. 1. de puls. diff. 11. de intercurrente pulsus verba faciens, hoc tantum docet inæqualem esse ratione crebritatis. At 2. de prasag. ex puls. 5. id ipsum repetit, causamque subiungit dicens, fieri, eo quod cor minus plene functionem obeat, quam usus postularer. Qualis autem sit usus iste, non explicat. Nos ex huius crebritatis natura, usus speciem venabimur.

Igitur cum crebritatem fieri docuerimus, ex aucta fuligine, vel ex aucto calore: Ego sane in ea sum sententia, intercurrentem immediate fieri ex solo caloris augmento, non ex aucta fuligine. Ratio est in promptu.

Nam ubi augeatur fuligo, contractio anticipat, ac longior euadit, At vero tantum abest ut in intercurrente contractio longior euadat, ut potius ex toto amittatur. Etenim in intercurrente, vna diastole aliam videtur præuenire: Non potest autem illam præuenire quin incidat in tempus, quo deberet fieri contractio: At si eodem tempore, quo deberet fieri contractio, sit dissenrio, quis non videt caloris refrigerandi usum ita præualere, ut omnino alium expellendi fulgines usum, tunc temporis obscuret? Itaque intercurrents, ut talis est, fit ex aucto calore, non autem ex fuligine.

Quando ergo inquit Gal. hunc fieri cum cor minus plene functionem obeat, per functionem intelligit illam, quæ refrigerando cordi est dicata. Videntur hanc confirmare sententiam ea, quæ scribit Gal. de intercurrente 1. 4. de caus. puls. 13. Inquit enim in lethargicis fieri intermittentes potius, quam intercurrentes, eo quod longe frigidior sit lethargus quam pneumonia. Si ergo intermittens fit ex aucta refrigeratione, intercurrents vero ex aucto calore, sequitur conclusio propoſita, intercurrentem esse potius signum caloris, quam fuliginis.

Addo aliam quoque rationem: *Intercurrens fit in pneumonia, atque crisis tempore, ergo sequitur potius caloris incrementum, quam fuliginis auctas.* Antecedens est Galen. 2. de prasag. ex puls. 5. Consequentiam probabo. Et primo illam quatenus intercurrents fiat ex pen pneumonia. Secundo quatenus fiat crisis tempore.

Ut ergo fit in pneumonia, probabo sic: *Ubi pulmonum laues arteria angustantur, impeditur aeris frigidi transitus in cor, non impeditur autem fuliginis expulsio, ergo magis augeatur calor, quam fuligo.* Quod aer vix transeat in cor, probatur quia angustæ sunt superiores viæ, quæ ad asperas pertinent arterias, simul cum parte quoque læuium arteriarum: Quod qui transit, non transeat frigidus, probatur, quia per locum inflammatum transiens, caleſcit, cordis ergo calor, & ex materiæ defectu, & ex qualitate aeris calida, non potest refrigerari.

Fa.

In putrida
febris non
quod sitis dis
pare æqua
hor.

Intercurrens,
calore cre
britatis, est
inæqualis.

Ubi sit
hæc crebritas.

A Fuliginem vero expurgari posse, ex eo probatur, etiam si asperæ arteriæ, & lævæ quodæ à corde magis remotæ sicut impeditæ, arteria tamen venalis circa basin, quam habet in corde, non est impedita. Etenim si esset impedita, nil aeris in cor transiret, statimque homo interiret. Transire itaque act in cor, ergo & fuligo excernitur. Cum vero excernitur fuligo, usus contractionis imminuitur, augeri tamen usum distentionis oportet, quia fuligo illa calida, in pulmone cum pariter calidum immixta, calidiorem efficit locum, atque ex consequenti cor ipsum. Hæc ergo est una causa, propter quam ex pulmone, magis augetur calor quam fuligo.

Alia quoque est ratio, quia scilicet cor multa refectum fuliginæ, potest quidem illius partem mittere in aortam, simul cum sanguine, ac spiritu, non potest tamen aliquid aeris frigidum ab ea suscipere: Idcirco intercurrentis potius caloris, quam fuliginis augmentum sequitur.

Hoc ipsum autem alio quoque confirmo argumento à crisi desumpto, quod erat tale. *Fit intercurrentis tempore crisis, ergo fit ex calore, non ex fuligine aucta.* Consequentiā probō ex Gale. 4. de Praesig. 12. ubi inquit, crisis tempore contractionis celeritate minui, diastolen vero fieri magnam, atque altam, eo quod tunc temporis deficiat fuligo, abundet vero humor minime fuliginosus, quem natura non contractione, sed altis potius, magnisque distentionibus expellit. Quomodo autem natura expellente noxia possit minui contractio, augeri autem distentio, superius docuimus, & nunc breviter repetemus.

Facultas, quæ crisis tempore excernit, non est pulsfica, sed naturalis expultrix: illa dum expellit, semper contractione vitur: Hæc, raro contractione, sæpius autem distentione, ob causas à Gal. & à nobis in capite de dictis adductas, quas frustra hic non repetō.

CAPVT LII.

De causis Inæqualitatis Rythmorum.

Inæquales sunt Rythmi, ut suo ostendimus loco, cum distentio vel magnitudine, ut Antiqui, vel celeritate, ut Galenus, contractionem superat, vel contractio distentionem. Vineit autem contractionem distentio, cum plus potest refrigerandi usus, quam expellendi fuliginis; superat distentionem contractio, cum magis abundat fuligo, quam calor. Potest quidem hoc fieri secundum naturam, ex ætatem, temperamentorumque varietate, ut docuit Galenus 2. de pulsuum causis ultimo. Potest quoque fieri ex causis non naturalibus, attamen ex affectibus præter naturam, magna ex parte oboritur: Magis enim abundat calor, quam fuligo, per omnes febres hædicas, atque ephemeræ, per putridas biliolas exquisitas, circa statum atque declinationem: contra vero magis redundat fuligo in putridis, nothiis, compositis, pituitosis, pestiferis, maxime autem circa accessuum initia, & incrementa.

Quando inæquales sunt rythmi.

Quando magis abundat calor, quando magis abundat fuligo.

Ex his tria hæc, quæ magni sane sunt usus, & momenti colliguntur: Primum quidem, certum quoddam omnium putridarum, ipsiusque initii, & incrementi tam vniuersalis, quam cuiusque; priuatæ accessionis signum; Secundo eiusdem loci Galeni interpretatio Tertio, contradictionis cuiusdam, in eodem Gal. apparentis conciliatio.

Erit ergo certum putredinis signum contractionis celeritas, quæ modum excedat. Principii vero & incrementi, ipsa contractio distentione celerior.

Certum putredinis signum.

Ex his, loci illius interpretatio elicitur, qui est in Gal. 2. de febr. diff. 3. ubi scribit, interualli tempore in exquisitis tertianis, nullum in pulsu apparere putredinis signum. Huius dicti ratio etiam explicata clucescit: Si enim putredinis signum est contractionis celeritas, hæc vero in exquisitis tertianis non ad modum viget, & in principio, atque incremento tantum adsit, in statu vero & declinatione ita euascat, ut iam distentio fiat contractione celerior, statim sequitur interualli tempore nullam fore vitiosam fuliginem, nullam contractionis celeritatem, nullam denique in pulsu putrescentis humoris signum. Porro hæc quamquam verissima, pugnat tamen videntur cum iis, quæ de eodem tertianarum interuallo scribit Gal. 2. ad Glauc. c. 5. cum enim ibi apertissime doceat, in prædictis febribus, ac tempore quandam relinquere inæqualitatem, quam febris propriam vocat, hanc vero plectiq; illam esse existiment, quæ est inter diastolen, ac systolen: statim sequitur interualli tempore putredinis signum aliquid futurum. Non enim posset celeritas vnius motus cum alio confecti, nisi ambo essent celeres. Quod si contractio interualli tempore adhuc celerior est,

sanq

sane statim sequitur, putredinis signum in pulsu relinqui, cuius oppositum docet Gal. 2. *A de feb. diff. 3.*

Propria febris inaequalitas, non nasci, quae cadit inter systolen & diastolen.

Hæc contradictio doctissimos plerisque viros torfit, atque etiamnum torquet, à qua nemo eorum se vnquam extricabit, qui censet propriam febris inaequalitatem esse illam, quæ cadit inter systolen & diastolen. Quid ergo dicendum? Nil aliud profecto, quam quod antea docuimus, febrilem scilicet inaequalitatem, nil aliud esse, quam celeritatis dissimilitudinem in vniuersa distentione consideratam, quæ cum non sit effectus putredinis, sed caloris, neque sit propria tertianæ, aut putridæ, vt putrida est, sed communis cuiuscunque febrili, quæ sit inæqualis in temperies, idcirco remanet etiam interualli tempore, quia non omnes cordis partes æqualiter refrigescunt, vt iure dixerit Galen. 1. *ad Glauc. 5.* in tertianis interualli tempore hanc persistere. Quia vero non manet putredo, neque fuligo, idcirco neque manet in pulsu putredinis signum, ipsa scilicet contradictionis celeritas. Ad quam, respiciens Galen. 2. *de differ. febr. 1.* interualli tempore dixit nullum relinqui putredinis signum.

Quid rhythmorum inaequalitas amittatur.

Ex his non modo patet contradictionis solutio, sed etiam colligitur, quid rhythmorum inaequalitas annunciet. Etenim ex distentionis magnitudine ac celeritate, arguimus calorem fuliginem superiorem; contra vero ex contractionis magnitudine ac celeritate, fuliginem ac putredinem. Patet quin etiam hanc rhythmorum inaequalitatem collectiuam, nunquam in veris ephemeris, aut hecticis, sed in putridis tantum assururam: Cum enim in hecticis, & veris ephemeris nulla ad sit præternaturalis fuligo, sed calor tantum, hinc distensio semper superat contractionem, nunquam vero superatur: In putridis vero præcipue notis, atque pestilentibus, breui temporis interuallo, quandoque, mutantur rhythmi, dum in accessionum principio, & augmento, contractio est distensione celerior, in statu vero ac declinatione distensio contractione. Hactenus de inaequalitate pulsuum vsus; Reliquum est, vt Gal. à contradictione vindicemus.

C A P V T L I I I.

De solutione contradictionis alias propositæ.

Hic parti, quæ de pulsibus vsus pertractat, coronidem iam imponemus, si Galenum ab ea apparenti contradictione vindicauerimus, quæ hactenus fuit proposita, & nunc breuiter iterum repetetur.

Dicebat Gale. 2. *de caus. puls. 1.* nullum fieri inæqualem pulsuum ex vsu tantum, sed omnem inaequalitatem ex vsu, eum facultate, aut instrumento simul laxis fieri, idcirco in benignis febribus nunquam observari, vt secundus pulsus à priore variet, quem admodum in illis contingit, quorum facultas aut instrumenta sunt læta. Idcirco addebat inæquales pulsus, qui ex ira, alii sue animi affectibus produuntur, simul eum vsu facultatem habere lætam. Præterea vero scripsit idem Gale. 3. *de præfig. ex puls. 3. 4. ac 5.* ex inæquali temperie, pulsus fieri non inæquales, vt nos docuimus, sed æquales, quandoque moderatos, nonnunquam immoderatos: Quæ si vera sunt, quomodo ergo hactenus conati sumus probare cum eodem Gal. ex inæquali temperie pulsus fieri inæquales? Hæc sunt contradictiones, Quæ sane, ex hactenus dictis sponte conciliantur.

Conciliatio autem tota in distinctione inæqualis temperaturæ est posita.

Duplex inaequalitas, quæ in corpore confideratur. Contradictionum solutio.

Diximus enim inæqualem temperiem dupliciter considerari: vel vt vniuersam, vel vt duplicem contrariam; vt vniuersam, sed inæqualis, semper facit inæquales: vt duplex contraria, adhuc subdividitur: vel enim est in ipso met corpore, vel inter cor, & cordi proxima: Prius modo semper facit inæquales, quos diximus: Secundo modo, adhuc subdividitur; aut enim æque possunt ambæ qualitates, aut vna aliam superat: Si æque possunt, sit pulsus æqualis, vel moderatus, vel immoderatus: Quod si vna aliam superet, sit inæqualitas varia, modo in vno istu, modo in æteruo, vt antea docuimus. Hæc ergo faciunt pro solutione contradictionis, nec loca Gal. quæ libris *de præfig. ex puls.* habentur.

Quod vero spectat ad locum 2. *de puls. caus. 1.* contradictio sic soluitur: Pulsus non fieri inæquales in æteruo ex vniuerso vsu, ita, vt secunda pulsatio à priore manifeste variet, potest tam inæqualitas quædam in secunda, ac tertia distentione obfcurè admodum procedens, senfim & cum proportionem, quandoque vero etiam sine proportionem ita augeri, vt tandem varietas post duodecim, ac plures pulsationes deprehendatur; An vero in ira, arquet

Atque animi affectionibus præter vsum, ad sit quoque facultas mutata, vt sentit ipse Gal. quãquam non esset vsque adeo necessarium examinare, attamen, ne quicquam in hac tractatione prætermisum sit, meam libere sententiam proferam.

Censet ergo ex animi affectu posse inæqualitatem induci, facultate neutriquam vitiata. Etenim animo concipere non possum, in pulsu inæquali, propter subitos animi affectus, villo modo facultatem esse mutatam. Docuit enim ipse et Gal. tunc mutatã esse facultatem, cum solidorum cordis naturale temperamentum vitiosum sit redditum. At vero ex subitis animi affectibus, non potest statim corrumpi temperies: Nam si tam breui mutaretur, qui fieri posset, vt breuissimo temporis intervallo, recedente ira & timore, pulsus pristinum recuperet robur, atque æqualitatem? Sane absque naturali temperie recuperare non posset. Dicemusne ergo temporis momento, cordis intemperiem fieri, & rursus eadem velocitate recedere, imo vero ex vna in aliam transire, & rursus hanc illam? Quis non intelligit, quam inæqualis fiat pulsus in Amantibus, cum præsens est res amata? Duo habentur clarissimorum huius rei Medicorum exempla, Erasistrati & Galen.

Accedente ne ergo re amata, destruitur cordis temperies? Illa vero recedente, ad se rediit? Neminem profecto ex simo hoc dicturum. Quod si hoc tanquam falsum reiciatur, non modo patet falsum esse, in affectibus animi mutatam esse cordis temperiem, sed statim aliud quoque Gal. placitum ruit, idem propositum, quo inquit pulsum inæqualitates, lenem excedere morbum, atque ideo, non esse vsum tantum, sed & facultatis, aur instrumentorum. Ruit, inquam, duplicem ob causam: Primo, quia si aliquando, vt iam diximus, sit inæqualis pulsus, ex animi perturbationibus cito transeuntibus, ergo non semper ex morbo leniorem excedit: Secundo, quia potest non raro contingere, vt morbus lenitatis limites excedat, nec tamen facultas, vel instrumenta sint affecta, sed vsum tantum, vt tota præcedens ostendit oratio. Ex his ergo constat, locum Galeni citatum nullo modo probare, quin ex solo vfu fieri possit pulsum inæqualitas.

Cuo autem res hæc clarius reddatur, pauca quædam sequenti capite de pulsibus affectionum animi, præcipue vero amoris, in medium adducemus.

CAPVT LIV.

De pulsibus affectionum animi, præcipue vero amoris.

D

Inæquales pulsus, qui ex animi affectionibus prodeunt, non necessario facultatis, instrumentorumue lêsione seque iam antea docuimus. Quales vero sint hi affectus, & quas patiantur inæqualitates, & propter quam causam, non explicauimus: Id ergo in præsentis capite præstare minime grauabimur.

In duobus potissimum præcipuis affectionibus, inuenio pulsus fieri inæquales: in ira scilicet, atque amore. Et de ira quidem, sic scribit Galen. 2. de caus. puls. 1. Adiciamus tamen & hoc, quod animaduertitur nonnunquam in ira, quando videtur & hæc innati caloris esse velutiferæ quidam: sane habet inæquales interdum hæc quoque pulsus, non illos quidem sua sponte (semper enim haberes tales) sed ubi adiungitur ad eam aliquis timor, iure ergo variis tunc, & inæqualis apparent, cum non tantum à diuersis causis alterentur sed etiam natura contrariis: nam propter vindictæ cupiditatem, alti, magni, celeres, vehementes: quia vero timor est maior accipiendi mali, quam spes dandi, parui, humiles, languidi, & tardi fiunt.

E De amore autem, quam inæquales pariat pulsus, docuit idem Gal. lib. de præcogn. ad Posth. ca. 2. ubi illos in explicabiles f. re, atque ideo nominis expertes esse existimat, semper tamen inordinatos. Cum enim pugnent inter se ira, timor, gaudium, atque tristitia: Ex inter ore quidem, parui, tardi, languidi ex lætitia, magni; Ex timore recentis, celeres: ex ira, celeres, & alti, atque inæquales fiunt. Hinc summa oritur inæqualitas, quæ non est amoris, vt amor, propria, sed variarum affectionum, quæ amantis animum, pro vario illius statu, atque cogitationum diuersitate, gubernant atque regunt.

F Amoris autem nomine eum nunc intelligimus, qui sit appetitus quidam irrationalis, proinde in illud feratur obiectum, quod multas parit difficultates, antequam amans coniequi, aut consecutum conseruare possit: Hunc enim iram, timor, moeror, spes, gaudium, denique inexplicabiles pulsus inæqualitas consequuntur, quæ in rationali amore nunquam reperitur, in quo præter spem & gaudium, nullus animi affectus, non ira, non timor, aut moeror locum habent. Si ergo pulsus amoris, tot, tamque varias sequitur animi

*Nullus est
pulsus vere
amatorius.*

perturbationes,iure optimo Gale.centuit lib. de praeogn. ad Posthumum 6.nullam esse pul-
sum vere amarorium,Id est huius tantum affectionis proprium, sed inaequalitatem omnem
in amantibus inuentam, illi similem quam reperit Erasistratus in Antiocho Seleuci filio,
& Gal.in lusu vxore, variarum affectionum, quae in honestum amorem consequitur esse
sobolem. Ex his ergo patent inaequales pulsus ex affectibus oriundi, patent quoque causae
ac generationis modus. Et haec de pulsibus vsus satis esse volo.

CAPVT LV.

De pulsibus instrumenti in genere.

INstrumenta quosdam habent pulsus proprios, quosdam familiares vel communes.

*Proprii pul-
sus instru-
menti,
Familiari
instrumenti
pulsus.*

Inter proprios inuenio Galenum aliquando alios non commemorasse praeter du-
tum & mollem: Nos tamen his quoque adiungimus plenum, vacuum: altum, humilem;
latum, angustum; longum, ac breuem.

Erunt autem durae arteriae familiares pulsus: paruus, tardus, creber: Mollis arteriae
vero, magnus, celer, rarus, cum suis quibusdam specificis differentiis.

Inaequalium autem, quidam pariter proprii sunt, familiares reliqui.

Proprios in eisdem inueniemus differentiis, in quibus aequales esse diximus, nempe,
in duritie & mollitie; plenitudine ac vacuitate; altitudine humilitate; longitudine breui-
tate; latitudine atque angustia, ac praeterea in arteriae sede, sursum scilicet vel deorsum, dex-
trorsum, ac sinistrorsum. Reliqui inaequales ad magnitudinem, celeritatem, atque fre-
quentiam spectantes, inter familiares connumerantur, de quibus suo dicemus loco:
Nunc enim primo simplicium, atque aequalium pulsuum ex instrumenti causae sunt re-
censendae.

CAPVT LVI.

De dura, ac molli pulsu causis immediatis ac mediatis.

*Arteria du-
rities quat
modo fuit.*

Immediata duri pulsu causa est arteriae durities: Fit autem haec durities a triplici causa, a
siccitate, refrigerationeque & impletione, quibus aliquando Gale. addit tensionem ex
convulsione. Sed haec vel ad impletionem, vel ad siccitatem, vel ad refrigerationem redi-
gi potest.

Sequitur autem frigiditas ac siccitas ex naturalibus causis, consimilem arteriae tem-
periem, frigidam scilicet, ac siccam, gracilem corporis habitum, senilemque etatem.

Ex causis non naturalibus, aerem frigidum, ac siccum, potiones, ac cibaria frigida,
praecipue intempestive assumpta; vt cum aestiuo tempore, super calefactus quispiam geli-
dam ebiberit, aut niue, glacieue refrigeratum hausent vinum: Aut frigido lauacro, vel
medicamento sit vsus.

De siccantibus idem dico: Etenim cibi, potus, medicamentaque, tam externa, quam
interna, vi exiccante donata: ad haec immodica exercitia, vigilie, inedia, superpurgationes,
animum curae, metus, atque timores, duros faciunt pulsus: Sicut ex causis praeternaturam,
intemperies omnes frigidae, vel siccae, vel ex utrisque constatae.

Repletio autem fit a quacunque materia staturosa, vaporosa, aut corpulenta, sed prae-
cipue frigida aut sicca, cum tumore, ac citra tumorem. Et si cum tumore, vel scirrhoso,
vel legitimo, vel spurio, erysipelate, aut inflammatione, abscessu in neruo, tendine, vena,
arteria, siue in alio membranoso corpore contentis.

*Molli pul-
sus, quatuor
quasi cau-
sas.*

Mollis autem pulsus humidam sequitur arteriae temperiem, mollemque corporis
habitum, ac puerilem, aetatem puerilem, sexum muliebre, tanquam causas naturales:
Aeris vero humiditatem, somnoque prolixo, otium, crapulam, humectantiumque cibo-
rum ac medicamentorum, & porum vsus, balnea, excrementorum suppressiones, tan-
quam causas non naturales; omnes denique piruitosos morbos, in mollibus potissimum
locis faustos, tanquam causas praeter naturam.

CAPVT LVII.

In quibusnam affectionibus reperitur pulsus durus ac molli.

Durus pulsus in pluribus sane reperitur affectionibus. Primum quidem, in omni quat-
tana, ac melancholia, ratione refrigerationis, ac siccitatis. Deinde vero in omni ma-
ratismo,

Arasmo, scilicet breque marasmode, & alia quacunque colliquatiua, diuturna, ac quouis modo consumptiua, ratione siccitatis, siue siccitas fuerit cordis primaria, siue secundaria, ex pulmonibus scilicet, vtriculo, iecore, intestinis, aliaque simili parte facta. Tertio in epilepsia, catoche, conuulsione, doloribusque omnibus, præcipue vero nervosarum, ac tendinorum partium; Quarto in omni tumore calido, frigido ac mixto, & impletione meningum cerebri, pleuræ, mediastini, septi, ventriculi, intestinorum, membranarumque omnium iecoris, lienis, renum, vesicæ, vteri, testium, peritonei, maxime autem tunicarum, quæ venas ipsas, & arterias cõstituant. Hinc patet ex duro pulsu, posse dignosci inflammationes, erysipelata, scitibos, abscessus varios, obstruçõesque ingentes, humorum copiam, crassitatem, lentorem, frigiditatem, siccitatemque, nec modo in locis iam prædictis, quos omnes esse duros nouit vnusquisque: sed & in illis, qui ex le molles faciunt pulsus, vt est cerebrum ac pulmo. In quibus siue adsit lethargus, siue peripneumonia, aliuseve con similis affectus, cum duro pulsu connexus, siue duritiei causam, non in ipsum proprium affectionis locum, sed in affectum, qui duritiem facit, referre debemus. In lethargo autem, pneumonia, duros quandoque esse pulsus, paulo inferius ostendemus. Nunc autem ad affectus declarandos, cum quibus sunt molles, nos conuertemus.

Qui esse hunc ex duro pulsu dignoscitur.

Sunt molles pulsus in peripneumonia, lethargo, sopore, paralyti, febre quotidiana, aliis; id genus humidis affectionibus. An vero in phthisi quoque mollis reperitur, vt docuit Gal. lib. de puls. ad Tyron. confirmauitque 4. de puls. caus. 10. lum anceps; quamuis enim ob humidos pulmones, ac putrelagine affectos, mollis esse debeat, attamen propter cordis, toriusque corporis tabem, durus cuadat oportet. Quid ergo sentiendum sit, & quid pro Gal. conciliando dicendum, mort aperiam, cum de pulsu inæqualiter duro, ac molli in aceruo verba faciemus.

In quibus affectibus sunt molles.

CAPVT LII.

Quomodo duritiei causa, & affectus inter se distinguuntur.

Cum durus fuerit pulsus ex causa naturali, gracili scilicet habitu, frigida ac sicca, vel calida intemperie, aliis non eger signis, nam ipsemet corporis habitus, ac temperies, causam ostendit.

D Qui vero sit ex non naturali causa, cõs accedit & recedit, & ex patientis, aut adstantium relatione comparatur. Si id consireri nolint, considerandi sunt pulsus. Etenim ex vt no ingesto, aliores: ex frigida aut potiorum vsu, humiliores erunt, dolorque ventris, & reliqua id genus, hæc docebunt.

Causæ autem, & affectus præter naturam à causis non naturalibus, diuturnitate ac magnitudine: à naturalibus vero, magnitudine tantum distinguuntur.

Inter se autem sic causæ, & affectus præter naturam seiungi possunt: Refrigeratio duos, simulque tardissimos, rarissimos, atque paruissimos profert: siccitas frigori connexa, eosdem habet; calori vero, crebros sed æquales. Impletio denique pariter duos, sed simul cum duritie, inæquales: Et siquidem impletio fiat à vapore ac flatu, cuius, breuiusque & inconstans erit durities: si ab humore, longior, grauior, ac pariter inconstans: si à tumore, vel obstruções, constans erit, ac grauissima. Et si tumor sit frigidus, durities erit cum tarditate ac raritate, si calidus, cum celeritate ac frequentia. Vtrum autem tumor sit phrenitis, pleuritis, vel alia con similis affectio, ex aliis signis ac locis petendum. Eadem methodo poterit prudens quisque, ac mediocriter etiam exercitatus mollis pulsus causas, & affectiones omnes distinguere: vt vanum sit hæc proposuisse:

CAPVT LIII.

De causis & affectionibus plenis ac vacui pulsus.

Plenus sit pulsus, vbi sit impleta omni ex parte vasis cauitas. Vacuus autem cum humore langueat. Humor autem abundat in corporis plenitudine quo ad vas, cuius causa, atque signa proposuit Gal. lib. de plenitudine longa oratione. Quare plura in præsentia dicenda non sunt. Contra vero deficit humor in omni atrophia, atque copiosa humorum euacuatione. Idcirco affectus præter naturam, quos hi pulsus sequantur, consequi non est difficile.

Pleni enim synochos habent tam putridas, quam non putridas: Vacui vero maras-

mos omnes, tam febriles, quādam non febriles, hz mortuagias, choleras, vñō verbo; excretiones omnes magni momenti, siue confectim, siue longo temporis tractu factas, quarū distinctio partim ex se constat, partim ex supradictis aperte colligitur, ideoque minime hoc in loco iterum repetenda.

CAPVT LX

An sola instrumentaria causa possit alios, latos, longos, & oppositos efficere pulsus.

Prostat iam locus iste, vt si expediendz sint omnes simplices, & æquales pulsus differentiz, quas ex vnico instrumento quandoq; prodire arbitramur, de alti, humilis, angustī, lati, longi, ac brevis pulsus causis instrumentariis agamus. Nos enim has ad sola pertinere instrumentaria existimamus, vt antea diximus, & infra ostendemus. Sed quia alii aliter hanc re sentiunt, ante omnia nodus hic erit dissoluendus.

*Quædam
de instrumentariis
pulsus causis
supra agunt.*

*Aliter
sentiri
possunt.*

Putant isti, illas, quas nos instrumentarias pulsus causas arbitramur, nempe corporis crassitiem, gracilitatem, locum circa arteriam, corporum circumiacentium grauitatem, & formationis proprietatem, non esse causas, sed concausas, propterea ex se nullum efficere pulsū, sed simul cum tribus illis contentiuis agere, ita vt contentiuæ excitent pulsū, hz vero non excitent, sint tamen causæ, sine quibus pulsus effici nequeant. Ego vero aliter sentio, existimoque altum, humilem, latum, angustum, longum ac breuem pulsū, quandoque ex sola crassitie, ac gracilitate, loco, grauitate, aut formatione prodire, contentiuas vero causas, tunc iuuantum locum tenere. Aliud enim est loqui de hisce differentibus, prout sunt motus localis, aliud vero, prout sine motu sunt, ac permanent.

Quatenus sunt motus, habent facultatem, vsum, duritiem, ac mollietiem tanquam contentiuas causas, arteriæ autem gracilitatem, vel crassitiem, tanquam concausas.

Quod si secundo modo considerentur, tunc arteriæ conformatio, gracilitas ac crassities, & reliquæ id genus causæ, pro contentiuis habentur facultas vero, vsum, durities, ac mollieties, concausarum obtinent locum.

Sed instant hi, d centes, nonnunquam apparere has altitudinis vel humilitatis, aut exterorum differentias, nisi ad sit facultas, vsum, durities, vel mollieties. Quibus hoc quidem concedo, sed iam responsū esse puto, has tres causas contentiuas vocatas, in relatione ad propositas differentias, non amplius contentiuarum causarum rationem obtinere, sed concausarum. Enim ipsæ altum, humilem, vel reliquos, de quibus nunc est sermo, non immediate pariunt, sine illis tamen altus, humilis, & reliqui similes, nunquam sentiri possent. Sed quo res clarior reddatur exemplo explicemus.

Ex tribus contentiuis causis, duæ sunt, quæ proprios habent pulsus, qui soli illi causæ & semper conueniunt, nempe facultas, cui conuenit vehemens, ac languidus, & instrumenta, quibus competit durus ac mollis.

Fitne ergo vehemens ac languidus absque instrumento, vel durus ac mollis absque facultate? Non equidem, semper enim istæ tres causæ simul ad motum conspiciunt, hoc tamen discrimine, quod vna tantum sit causā, aliz concausæ.

Eadem profecto erit ratio alti, humilis, & reliquorum, de quibus nunc loquimur. Nam sub hac formali consideratione, qua nunc à nobis proponitur, videlicet quatenus sine motu sunt, habent pro causa instrumenti statum, quo mutaro, statim mutantur & ipsi, nulla interim facta in facultate, vsum, instrumentisue molliibus, aut duris mutatione. Iure ergo altum, humilem, latum, angustum, longum, breuemque pulsū, inter proprios instrumenti referendos existimamus, cum propriam habeant causam, à reliquis tribus contentiuis separatam.

*Quædam
de instrumentariis
pulsus causis
supra agunt.*

Ei quamuis posset quispiam obicere, has non esse pulsus differentias, quia sine motu sunt: pulsū enim esse motum, Respondeo, duritiē pariter ac mollietiem non esse motus, & tamen inter præcipuas pulsus differentias connumerari, quatenus ex motu dignoscuntur: ira ergo & altus, & reliqui similes, quatenus ex motu deprehenduntur, etiam si non sint motus, pulsus tamē dici debent, & in toto hoc capite, quo de illis peragemus, sub nomine pulsus, de his mentionem faciemus. Neq; vero quispiam existimet nos in hac parte Gal.

A te Gal. aduersari, qui triplicem tantum proposuit contentiuam causam, facultatem scilicet, Vsum & Instrumenta. Fatemur enim & nos, tres esse causas in genere, in specie vero plures esse affirmamus. Itaque sicuti facultas vna est, & vsus pariter in genere vnus, multiplicantur tamen in specie, vt ex haecenus dictis patuit, ita & instrumenta in genere, vnicui videntur causae genus completi, eum tamen sit multiplex, prout non modo, vt dura aut mollia considerantur, sed vt hoc vel illo modo constituta, vt mox exponemus. His ergo sic determinatis, iam ad alti, humilis, lati, angusti, longi, breuique pulsus causas, prout ex solo prodeunt instrumento declarandas, orationem conuertamus.

CAPVT LXI.

De causis pulsus magni parui, alti, humilis, lati, angusti, longi, breui, ex instrumento.

CAusae differentiarum pulsus, quas hoc capite ex instrumentorum parte inquirimus, quandoque sunt naturales, aliquando acquisitivae.

Naturales sunt corporis crassities, aut gracilitas, arteriae locus, & formae proprietates; Acquisitivae patitur, sunt crassities ac gracilitas, & corporum arteriae adiacentium moles.

Ad crassitiem & gracilitatem quod attinet, vel aequales sunt, vel inaequales. Si aequales sit crassities, quia secundum omnes sui partes comprimitur arteria, aequaliter parvus sit

Cpulsus. Ex aequali vero gracilitate, sit aequaliter magnus. Quod si inaequalis sit crassities, ac gracilitas, tunc vnae orientur magnitudinis differentiae; alii non lati: lati non alti: interdum longi, minime vero lati. Si enim prematur arteria ad latera, non ad superiora, altus erit pulsus, sed angustus; Si prematur ad superiora, non circa latera, erit humilis, sed latus.

Longum vero, quia altus etiam non sit, ex sola corporis gracilitate nunquam reperies, nisi cum corporis gracilitate, arteriae quoque sit connexa durities. Etenim cum ideo longus appareat, quia gracile est in superficie corpus, ex superficie autem gracilitate, altum fieri dixerimus, ergo statim sequitur, eum, qui longus fuerit, simul quoque altum futurum, nisi durities obster.

Sic ergo gracilitas atque crassities pulsus mutant. Locus autem, in quo ponitur arteria, latitudinem tantum, vel angustiam efficere potest. Latus enim erit pulsus in amplo loco, angustus autem in angusto. Et quamuis coine dat magna ex parte locus

Damplius in gracilitate, & angustus in crassitie, aliquando tamen, opposito etiam modo feres habere potest, vt scilicet in causa hae naturali, cum crassitie adsit amplitudo, & in gracilitate angustia: Sed haec raro inveniuntur.

Ad tertiam nunc venio causam, formationem scilicet, quae sane varias infert proportionis magnitudinis, aut paruitatis differentias. Etenim angusta a natalitate, tereque arteria, nullum alium ex se pariet pulsus, quam longum, nunquam altum aut latum: Ex situ vero & altum, & humilem; profunde enim collocata, humilem, in superficie posita, al-

tum excitabit.

His ergo sic declaratis ad naturales causas spectantibus, iam minime arduum fuerit

Eintelligere, quoniam causae acquisitivae hos producant pulsus, & quo modo eodem efficiant. Potest enim corpus natura gracile fieri obesum, contra vero obesum, reddi gracile. Ex crassitie autem ac ponderis, sequitur loci angustia, ex gracilitate vero amplitudo. Non enim sicut in causa naturali, ita in acquisitiva potest cum crassitie esse modo amplitudo, modo autem angustia. Neque ex gracilitate potest modo vnum, modo aliud fieri, sed aequalitatem gracilitatem semper sequitur loci amplitudo: obestatem vero angustia. Ergo sicut hae crassities aequalis paruum, gracilitasque aequalis magnum faciunt, ita cum inaequaliter habuerint, varias magnitudinis, ac paruitatis differentias, antea descriptas excitabunt, quas non repetam, sed illud tantum subiungam, quod superfluo tenens ostensum, non tamen integre explicatum est: videlicet ex aequali gracilitate in superficie existente, sed absque arteriae duritie, fieri longum & altum; adiuncta vero aequali duritie acquisitiva, omnes arteriae partes eorundem, parum. Gracilitate vero locum vndique amplum teli inque etc, magnum, ita crassities atque gracilitas inaequalis in vna dimensione paruum, in alia magnum facient pulsus. Gracile enim corpus in superficie, non in latere, altum faciet, sed angustum: contra vero gracilitas circa latera, sed potius in superius partibus, vel ex eorum, vel ex alia quacunque causa, latum, sed humilem reddet, longum vero, qui altus etiam non sit,

*Conferunt
compositum
quomodo
sua pulsum
habet.*

nalla simplex causa aduentitia efficiet, sed adnexa duritie longum, humilem, atque angustum pariet. Erit enim longus, quia ex gracilitate multis occurrunt partibus; angustus & humilis, quia ex duritie, non potest in altum vel latum extendi.

Quod si inæqualis fuerit in artetia durities, tunc inæqualis quoque euadet longitudo, altitudo, ac latitudo. Etenim qua parte arteria fuerit durior, eadem minus, qua parte mollior, magis extendetur. Sic ergo dura in superficie arteria, non autem ad latera, humilem faciet pulsum, sed latum. Dura vero ad latera, non in superficie, altum pariet angustum; inæqualiter dura in superficie, breuem: æqualiter dura in superficie, pro vario situ, modo breuissimum & humilem, modo longum pariet; breuem & humilem, si fuerit in profundum, longum si in superficie.

*Differt de
idem pulsum
ex arteria
compressio
ne multum.*

*Et arteria
gracilis.*

Ceterum præter crassitiem, ac gracilitatem, duritiem, vel æqualem, vel inæqualem, mutantur quoque pulsus isti, ex arterie compressione. Si enim ad latera ad sit humor, aut tumor, aut caro, & adeps, aut callus arteriam comprimens, supra autem nequaquam, tunc altus fit pulsum, sed angustus. Quod si compressio sit in parte superiore tantum, erit humilis, sed latus. Et si quidem compressio in parte hac superiore, multas occupet arterie partes, brevis erit pulsum; si paucas, longus apparebit.

Grauat autem arteria, a parte superiore, non modo ab humore, ac tumore, sed & rugis multis, ac crassis, laxam & confidentem cutim consequentibus. Quid hi ostendant pulsum, quosue priuatos sequantur affectus, quatenus æquifit ut sequatur causas, partem ex dictis patet, partem vero adiciemus, cum methodum, qua simplices causæ a compositis distinguantur possint, proponemus. Hactenus de propriis pulsibus instrumenti præcipue æqualibus, nunc de familiaribus, atque inæqualibus ex professo.

CAPVT LXII.

De familiarium, & æqualium pulsum causis instrumenti.

FAMILIARES duri instrumenti pulsus, æquales esse diximus, paruos, tardos, ac crebros. Mollis vero magnos, celeres, tardos. Horum causæ cognitu difficiles non sunt, in dura enim arteria parui sunt, quia non potest multum extendi. Tardi, quia durities similiter velocitati reluctatur; Crebri, quia vsui moderato, nullo alio modo, quam crebritate satisfieri potest.

Molles vero sunt magni, ac celeres, quia mollis arteria, & multum extenditur, & ita to. Sunt vero tardi, quia vsui moderato lausfacit magnitudo, & celeritas. Et hactenus de differentibus, ac causis pulsum æqualium instrumenti, uisum est, succedat modo sermo de inæqualibus.

CAPVT LXIII.

Quales nam sint proprii pulsum inæquales instrumenti ex Galeno.

PROPRIOS & inæquales pulsum instrumenti, inuenio apud Galenū vndosos, decurtatos, eminusulos, inæquales in arterie sede, intermittentes, forte etiam alios in nominatos. Ego vero, quos reiciam, quosue addam, suo proponam loco. Nunc enim cum Galenus horum omnium causas, affectiones, locos & affectus aperire conabitur, sumpro ab vndosis exordio.

CAPVT LXIV.

De vndosi pulsum causis, quatenus ex solo sit instrumenti.

INTER pulsus inæquales, ob vnicam arterie affectionem, sunt vndosi, quos video Galenū quandoque voluisse fieri ex inæquali duritie ac mollitie, de qua causa dicam in parte, quæ agit de causis compositis. Quandoque vero ex mollitie tantum, de qua nunc dicemus. Quomodo ergo vndosi ex mollitie tantum prodeant, facultas interit, atque vsui moderato se habentibus, admodum apposite explicatur Gale, exemplo à mollibus virgis desumpto. Sicut enim mollis & tenella virgula, humi existens, dum ex vna parte eleuatur, incipit, non tota simul erigitur, sed pars tantum manui proxima, interim vero, quæ à manu distat, adhuc flexa iacet, ita etiam ait Gal. arteriam valde mollem totam simul non moueri, sed partem cordi proximiorē primū, mox remotiorē, & sic vicissim.

Hoc quidem sic fieri posse, ex eo redditur apertissimum, quod causa motus arteriarum non sit in corde tantum, sed per totum arteriarum corpus diffusa. Quo fit, ut dum vas extenditur,

*Quomodo
sua pulsum
habent.*

Atenditur, etiam si propter molliem subsistat, attamen perseverante vi mouente, successe siue mouetur, motu tamē priore desinente; At vero motus hic eleuationis, ac depressio- nis in variis arteriæ partibus, vndas maris æmulatur, iurē ergo vndosus dicitur: sitq; ex ar- teriæ mollietate, modo iam exposito. Vtrum hoc cum ratione conueniat, vel ne aliis iudi- candum relinquo. Hoc tamen silere nolo, probabilius videri mihi, vndotum fieri ex inæ- quali arteriæ duritie ac mollietate; vt mox explicabō, quā ex mollietate tantum, vt nunc di- ximus.

Pulsus pul- sus si en- arteria mol- lita.

Quod si aliquādo ex solā prodeat mollietate, & quispiam quærat, in quibusnam affe- ctibus talis reperiatuſ? Dico cum Gal. 2. de praesag. fieri illum in incipiente leucophlegmatia absque scirro, itaq; in proxime futura excretionē per sudores, aut lotium, reperiri posse, si- ue excretio fiat critico, siue symptomatice modo. Ex quibus patet, nullam demonstrare pulsus istos diuersam affectionem ab illa, quam molles æquales declarant. Sed vel magis intensam, vel vires non admodum validas, vel vtrumque. Quæcunque enim ex his causis accesserit, vndosum pa- tere poterit:

In quib. af- fectibus repe- riatur vnde- sus pulsus.

CAPVT LXV.

An detur inæqualis pulsus in vno ictu, ex arteria duritie ac mollietate.

Pulsus duritie ac mollietate inæqualem in vno ictu, ac sub vnicō digito, minime repe- riri, apertissime docuit Gal. 2. de praesag. ex puls. sic scribens: *Caterum duritie ac mollietati- ne, nunquam dissent duo arteria occurſus, eo quod maius spatium requirat ea mutatio, cum vel in col- lectis inæqualitatibus, raro in vna consideratione pulsus ostendat, duritie & mollietate inæqualem.* At vero de eodem in vno ictu, ac sub variis digitis inæquali, propter eandem causam, e- dem loco aliter sentit, sic scribens: *Caterum pulsuum inæqualitas in diuersis arteriæ partibus, co- mitatur proximè salem intemperiem, quod vbi humidior, simul & calidior sit arteriæ pars, maior il- lis citatiorque fiat pulsus, vbi vel frigidior vel durior ibidem, minor & tardior.*

Non repa- ri pulsus in vno ictu, & sub vni- co digito, cu- rrit ac mol- lis inæquali- tas.

Hæc cum ita sint, quæret in re quispiam, si ne aliquis ex pulsibus nominatis, qui ad hoc genus intemperatæ spectet? Quibus respondeo, me ex Gal. colligere, decurtatos quos- dam, eminulos quoque ac prominulos, dicrotos duos, vndosos, & inæquales in arteriæ sede, ex his causis fieri. De dicrotis duris & vndosis agemus in parte, quæ de compositis tractat causis. Ex decurtatis autem inuenio esse illos, qui in vnicō ictu, sub digito ad supe- riorem regionem, cubitum scilicet sunt imbecilliores, quā ad inferiorem nempe ad ma- num. Hos cum videret Gal. longe à ratione distare: (Etenim nihil esse, cur pulsus in parte à corde magis distaret, melius quā in proximiorē sentiatuſ) causam dixit esse magna ex parte naturalem, quando autem fuerit temporanea, esse inæqualem loci illius intempe- ratiem, ex qua mollior sit arteria ac leuior in parte inferna, durior autem ac grauior in supe- riore. Hæc docet Gal. 2. de caus. puls. Quæ sane à ratione non sunt aliena. Nil enim prohi- bet, quominus pars illa arteriæ ad superiorem regionem situata durior quandoq; sit effe- cta, ex cicatrice, callo, topico, vſione, refrigeratione in signi, atrophia, aliaue simili causa, inferiorem partē interim nil pariente. Quo in casu minus sanè eleuabitur pars illa ad cubi- tum, quā quæ erit ad manum, huncque pariet decurtatum: Sed tandem hic, nullum si- gnificabit internum affectum, verum illum tantum, qui in ea continēbitur arteriæ partē, idcirco nullius in re medica erit vsus.

Quod vero de eminulis, ac prominulis scribit e. 10. in eisdem lib. illos videret ex iisdem causis iam explicatis quandoque oriri, non facile possum consequi. Cum enim in nuētes, ac circumuētes pulsus illi sint, quos medius sentit digitus, nō autem extremi, qui quæ- so fieri potest, vt ex inæquali intemperie hoc contingat? Sunt enim vique adeo propinqui inter se digiti tangentes, vt vix possit animo concipi, vnā esse sub vno digito, aliam sub alio temperiem. Multo autem minus sub medio digito vnā, sub illis, qui vtrinque sunt, aliam. Adhuc multo minus cum duritie: Etenim si arteriæ partes hinc inde sunt duræ, quā fieri potest, vt in medio, ac breuissimo spatio, sint molles? Et dato, non ramen concessio, si in eo angustissimo loco esse molles, qui fieri posset, vt duræ hinc inde existentes, mediā eleuari permittant? Accedit, non facile proponi posse causā internā, vel externā, aut affe- ctum, qui inæqualem intemperiem in minimis arteriæ partibus efficiat. Has omnes ob cau- sas, satis esse existimo, causam hanc ab eminulis ablegare, imbecillitatemque facultatis, quā alias proposuimus accipere, siue languor exolutionem, siue suffocationem se- quatur, & siue suffocatio sit perpetua, vel circa putridarum febrium initia tantum.

Qui fieri pul- sus vnam- tes, & cin- currenti- ra.

Quando
sunt emi-
nuli.

Ex his causis, primumque ex suffocata circa accessionum initia facultate eminulos, ac A
prominulos fieri, docuit Galen. 2. de praesag. ex puls. 11. his verbis. *Fit etiam ob imbecillitatem facultatis, qua attollere onus nequeat: qui quando affectus ingrauescat, flexum in alio quodam pulsus representat, non circuli figuram: quem flexum, non male Archigenes appellauit γινωσκον (quasi angulositatem dixeris) nam altitudo arteria, non ut circuli iam figura, sed ut vertex trianguli mouet tactum. Et magis iam ei hoc accidit horrefcenti, & rigenti ex frigore, vel quomodo libet aliter indurata. Itaque huic subinde est cernere in isto grauium accessionum, cum refrigeratione inuadentium: non in his tamen omnibus, vel solus, ut quidam putant. Nam, febricitantium durities flebili agere queat, facultasque imbecilla grauetur utrinque, perdis circuli velut circumferentiam, refert autem verticem trianguli, quod propter duritiem arteria nequeat paulatim flecti, & ad profunditatem utrinque inclinari, sed vibretur potius, quam flectatur propter duritiem. Qui quidem illi affectus frequentes in B
accessionibus bene refrigerantibus sunt, accidunt tamen interdum sine inuasionem accessionis, ut contra in accessiones, qua non perfrigerant, pulsus talis prorsus non cadit. Hæc Gal. quæ voluit ad verbum huc transferre, etenim veram eminulorum causam temporaneam aperit: quæ tandem nulla est alia, quam facultatis imbecillitas eum duritie aliqua instrumenti, ob quam arteria dum extenditur, non facit circulum, sed potius angulum. In circulo enim tantum arteriæ extenditur, quantum possint plures digiti sentire, ut apparet in hac figura C. in angulo autem tantum extenditur, quantum sentiat vnus digitus, ut in hac secunda figura apparet A.*

Cum autem duritiei multiplex sit causa, refrigeratio, exiccatio, impletio, hinc fit, vt quatenus sunt ex refrigeratione, & impletione, inueniantur in in istis accessionum. C
quæ sunt cum rigore, horroreue refrigeratorio vehementi, qualis est Quartanarum, ac Quotidianarum, vel Ipnarum quarundam februm, vt iam offendimus. Quatenus vero sunt ex siccitate, repeririunt in tabidibus, vt docuit Galen. 2. de caus. puls. 10. Et quamquam ibi eminulorum in tabidis causam putet esse arteriæ maiorem in media sui parte laxitatem, eo quod ibi magis sit marcidæ, quam in partibus utrinque, ego tamen potius ad duritiem, ex siccitate factam hæc refero. Neque enim docet experientia, nec suadet ratio, vt in præm digitotum tangentium spatio, arteria sit magis tabida, sub digito medio, minus vero sub extremis. Magis conuenit cum ratione, duram ex marcore arteriam cum virium imbecillitate non posse circulum facere, sed potius angulum, vt etiam ex refrigeratione fieri diximus, statim enim sequetur eminulus ex siccitate. D

Et hæc quidem diximus de eminulis, ac decurtatis ex temporanea causa. Præter quam sunt quoque ex naturali; vt docuit Galen. 2. de praesag. ex puls. 11. vbi hunc modum de decurtatis scribit: *Equidem arbitror, illos homines, quos cum eiusmodi pulsibus se inuenisse aiunt, non ob temporaneam causam, sed propter naturam conformationem partium secundum carpum ipsos habuisse. Siquidem raro quidem talis conformatio, sed reperitur tamen, ut pari arteria, qua ad carpum est, collocata sub ipsam cutim sit: superna eius pars tota, qua superior est, maiore carnis mole tecta sit; inferior, qua ad ipsum carpum tendit, assatim in profunditatem demergatur. Et paulo post de eminulis, ac prominulis verba faciens, idem de illis putat esse iudicium, dicens: Aliorum item natura circumuoluens pulsus est, & innuens utrinque præter communem naturam: quem non morbus, aut ulla denique causa præter naturam, sed natura creat conformatio. E*

De eminulis, forte plura diximus, quam postulat hic locus, cum eorum causas compositas enumerauerimus, non autem solius instrumenti. Sed excusationem mereamur, quod vel inuiui ad alias accesserimus causis: Dumenim simplicem illam referamus, veram, quæ composita est, aperire hoc loco, educti fuimus. Venio iam ad inæquales in arteriæ sede,

CAPVT LXVI.

De inæqualibus in arteria sede.

Qui dicantur
virescunt
quales pul-
sus in arte-
ria sede.

Inæqualium pulsuum in arteriæ sede, quidam sunt facti, quidam fientes: Factos voco illos, in quibus arteria in vnam partem semel distorta, in eadem semper manet: Fientes F
autem appello illos, in quibus arteria modo in hanc, modo in illam conuelliunt partem. Ad priores quod attinet, prodeunt hi ex illis ipsis causis, ex quibus spasmi factus, atque durus pulsus, nempe refrigeratione, siccitate, impletione, vel æqualiter, vel inæqualiter arteriam tendentibus. Hæc voluit Galen. cum 2. de puls. caus. 11. hæc scriberet: *Inflammationes enim, scirrhi, abscessus, ac crudorum quorundam tuberculorum generatio, breuiter, omnes præter naturam*

Antem am tumores, vicinis partes ad se retrahere valens: praeerea si quibusdā flexis et frigidis in-
modum, quiddam faciat in modum gelae, & consilia in sentio. Ex his verbis manifeste patet, qua-
dam ex his cautis facere distillationem, etiamsi aequaliter arteriam tendant; quidam ve-
ro dum inaequaliter illam afficiunt. Modum vero, quo aequalis tensio, inaequalis faciat
pulsus, inpropositū Galen. a. de puls. caus. 12. cum inquit: Tendi enim ad utrumque terminum ar-
teriam putaueris, & statim corripis hominem consilia. Quibus verbis aperte innuit, hanc inae-
qualitatem fore ex comparatione partium arteriae extremarum, cum media: Dum enim
partes extremæ flexæ, media vero curua apparet, quæ sunt flexæ humilioris, curua autem
altior existit, siquæ inaequalitas adeit. Id quod clarius exposuit idem Galen. a. de puls. ex
puls. cum inquit: Verum potius inaequalitatem habebis, quæ consistit in prima, & vltima arteria
parte, quæ mouetur iuncta. Hoc modo igitur fit inaequalis pulsus consualis, ex aequali ar-
terie tensione.

Quod si inæqualiter tendatur, multo sane facilius potest à suo distrahi loco: Et enim in eam trahetur pars, in qua tumor, siccitas, ac refrigeratio congelans fuerit. Et de tumore quidem, ac callo, nulla est dubitatio, quin inæqualiter arteriam trahere possit: Tumor enim, aut callos, facile potest vnam obfiderè partem, alia omnino intacta. Sed de inæquali intemperie id non videtur adeo manifestum esse videtur: Quæ enim, quæque, et causæ istæ, in quo eadem arteria, in dextra, aut sinistra, superna aut inferna tantum parte sit siccior, vel frigidiore, in alia humidior aut calidior? Ego sane nullam puto reperiri intemperiem similem, quæ vniuersalis sit, & ex interno aliquo principio oritur. Idcirco vniuersalem spasum ex cerebri, aut spinalis medullæ æquali, vel inæquali, siccitate, non admitto: Vniuersalem ex congelatione equidem concedo, sed potius æqualem, quam inæqualem. Si quæ ergo est inæqualis refrigeratio, aut siccitas, quæ artentam distorqueat, ea est determinata, & ex causâ externa ducit originem, nempe igne, vel glaci corpori occurrente: Possè enim causas istas vni parti magis, alteri minus esse infensas, in dubium non reuoco, quanquam existimem, has quoque potius totum vas eiusdem partis æqualiter, quam inæqualiter affecturas. Quod si inæqualem faciunt intemperiem, non erit pro illa dignoscenda laborandum. Et enim nil indicabit aliud, præter inæqualem illam, determinatamque siccitatem, aut refrigerationem, quam externa illa exsiccans, aut refrigerans causâ perperit. Non est ergo in his diutius immorandum, sed ad scientem conuulsionem esse properandum: Cum vtroque hæc causâ potius compositas, quam simplices sequatur: Idcirco de ea, in parte de compositis causis loquemur.

CAPVT LXVII.

De inaequalitate collectina ex duritie, & mollitie.

E X inæquali arterie duritie ac mollietie, pulsus fieri aliquando inæquales in ætate, & parte docuit Galen. *de præf. ex. puls. 8.* Quales vero sint hi, & quomodo fiant, ibi non explicat. Nos vero id nunc pro virili præstabimus.

Sunt ergo ex his quidam nominati, alii vero in nominati; in nominati quidem sunt illi, qui quidam habent distentiones molles, quidam autem duras.

E Nominati vero sunt intermittentes, ac vibrati, de quibus mox dicam. Nunc autem de prioribus edifficam.

Fit ergo in aqualis pulsus secundum duritiem, ac molliem in ætuo, ob quinque præcipuas causas, quarum prima est inflammatio adhuc ficiens. Quo enim tempore fluit materia, pulsus est durus, vel durior; Quo veto tẽpore digeritur, est mollis, vel minus durus. Fluit autem materia ad locum inflammationem circa accessionum initia, & in crementis, ut docuit Gal., 2. de feb. diff. 12, itaque eodem tempore pulsus fit durus, digeritur autem in statu & declinatione, deinceps aut minus durus fit, aut quandoque mollis.

Secundo fit hæc mutatio ex loci permutatione; Si enim transeat materia à mem-
branis ad carnem, locuetur inania, aut extra corpus mittatur, pulsus ex duro molli reddi-
tur: fit uero contra, fit durus. Mittitur autem materia à membranarum ad exta membranas,
in contentiis quibusdam febribus periodicis, quas Gal. lib. de morb. temp. s. 7. inquit in de-
clinatione duritiem deponere. Non enim aliam ob causam duritiem deponunt, quã diges-
ta, transmissæ materia à loco, ubi duritiem inducebat, ad alium, vel intra, vel extra cor-
pus, ut nullam amplius duritiem efficiat. Sic ergo permutat materia à cerebri mēb-
ana ad substantiam, vel à pulmonis membrana ad carnem, pulsus ex duritie induit in molliem,
ex mol-

உலகில்
முன் லீட்
புதிய மன
தூய்மை
அனைத்து
மனம்
உலகம்

ex mollitie autem duritiem resumit, petmu: ara materia, à cerebri, & pulmonum substantia ad membranas.

Fit tertio inæqualitas ista ex inæquali siccitate, & humiditate, aut inæquali frigiditate, ac calore. Fluant enim quandoque ad affectum locum materiz biliosæ, atque melancholicæ, ex quibus durus fit pulsus, qui paulo post mollior reddi potest, si illis recedentibus, humidæ, atque aquosæ fluxerint.

Fit & aliquando insignis arteriarum refrigeratio circa accessuum initia, ex qua pulsus oritur durus, qui tunc demum mollescit, cum primum arteriz incaluerint.

Fiunt denique inæquales pulsus duritie, ac mollitie in phthisicis, quam ob causam visus est Gal. aliquando sibi ipsi contradixisse. Etenim lib. de puls. ad Tyron. 11. & 4. de caus. puls. 17. phthisicorum pulsus inquit esse molles; 3. autem de præsig. ex puls. vlt. inquit esse du-
phthisicorum
est affectus.
que tempo-
re putride
phthisi a-
rum febris
monatur.
 rios. Apertissima sane esset hæc contradictio, nisi diceremus, inæqualiter se habere phthisicorum pulsus, & quandoque duros, aliquando autem molles esse. Etenim phthisici non modo pulmonum vicere laborant, sed & fluxione pituitæ, quandoque empyemate, & non raro substantiæ putrilagine, cuius meminit Galen. 4. de loc. affect. vltimo, ob quas omnes causas, putrida quædam febris connexa est, maiori ex parte horis vespertinis exaritata, in cuius initio mouetur materia humida à capite ad pulmones, à pulmonibus & Thorace ad arterias, quæ dum illas diluit, irrorat, & humidat, molles reddit pulsus, accedente vero febre ad statum, excussaque materia, durities succedit, relictis arteriis ex tabida febre exaratis. Si ergo patet, quomodo in phthisicis possunt esse pulsus molles, ac duri, quomodo Gal. à contradictione vindicetur: & quomodo possit fieri inæqualitas duritiæ, ac mollitiæ in acuto, multas ob causas, & affectiones. Præter quas, errores etiam in sex rebus non naturalibus commissi possent adiungi. Etenim in pulsu molli frigida potio, aut quid tale, duritiem statim efficere valent.

CAPVT LXVIII.

De causis inæqualitatis pulsus pleni ac vacui.

Humorum
impuritas

IN vacuis ac plenis sibus inæqualitatem esse, apertissimè docet ipsa humorum recti-
Quando, &
ubi hæc pla-
ni ac vacui
pulsus inæ-
qualitas.
 procatio; Tam facile siquidem intro, forsique feruntur humores, vt quas tangimus arterias, modo turgidas, modo exanitas repetamus. Flacidas quidem, cum intro fluxerint, turgidas autem, eam ad corporis ambitum expanduntur.

Fiunt hæc omnia in cunctis putridis proportionatis, cum refrigeratione incipientibus. Fiunt & crisis tempore, cum enim huc, atque illuc ferantur humores, à venis, inquam, extra venas; & ab his, ab intra, quis non videt pulsuum vacuitatem, atque plenitudinem mutari?

Cæterum & ex animi affectibus inter se contrariis, potest hæc eadem fieri inæqualitas: Ex timore enim, ac anxietate cum intro feruntur humores, vacuus apparebit pulsus, ex gaudio autem, cum exteriora per an. impleri arterias oportet. Vno verbo, omnes causas, hoc ipsum præstant, propter quas vicissim arteriz impleri, atque euacuari possint, de quibus Galen. 4. de sympt. tuend. 5. in hunc tenent modum: Summa autem eorum, quorum occasione foras ferantur, hæc sunt exercitatio, frictio, balneum, & fumenta calida, & inunctiones calidæ, & vno verbo, omnia, quæ succos, qui alie in animantis corpore sunt immersi, ad motum quoque versum irritant. Quorum vero occasione intro ferantur, ea sunt, quæ foras ferri prohibent, quæ sunt ex tæ, quæ cum propinquius frigida sunt, & adstringunt, & quæ succos intro attrahunt, aut alio quouis modo vltro ipsorum motum excitant, quorum sunt tristitia, horror, quæcumque de causa oritur.

causa præ-
cipua quæ
humorem so-
runt, vno
verbo, omnia,
quæ succos,
qui alie in
animantis
corpore sunt
immersi, ad
motum quo-
que versum
irritant.

CAPVT LXIX.

De compositorum pulsuum differentia in genere.

quæ differe-
ntia pulsus
dum fit.

COMpositorum pulsuum quidam sunt nominati, quidam innominati; & horum
 alii sunt æquales, alii inæquales. De æqualibus innominatis primum agemus, mox & de reliquis, tam inæqualibus nomine carentibus quam nominatis.

In his ergo, quos æquales vocamus, considerantur causa vel magnitudinis, & paritatis; celeritatis, ac tarditatis; crebritatis, ac raritatis; vel alto, humilis, longi, brevis latitudinis, & angustæ. Versabimur primo in pr. o.ibus, mox & in reliquis.

Priorum

A Priorum itaque tot sunt differentiz, quot sunt continentium causarum inter se compositiones; deinceps ad causas statim me conuertam: propositis enim causis, vno & eodem tempore, pulsum quoque differentiz ex illis procedentes, innotescunt.

CAPVT LXX.

Quot modis continentes causa inter se componantur.

Cum tres sint causa continentes, quatuor modis inter se componuntur, vel enim connectitur facultas cum vsu; vel facultas cum instrumento; vel vsus cum instrumento; vel denique vsus, facultas, & instrumenta.

quatuor modi continentes causa componuntur.

B Quia vero consideratur facultas, vt valida & languida; languida autem duplex sit, vel suffocata, vel exoluta, moneo in hac complexione, languidam semper intelligi exolutam, non autem suffocatam. Pari ratione, cum instrumenta considerentur vt dura, aut obstrueta, vel compressa, moneo similiter, nos in hac compositione instrumenta considerare, vt dura vel mollia, non vt obstrueta vel compressa. Illud etiam præterire nolo, in hac tam multiplici complicatione quosdam pulsus fore naturales, quos, tanquam nihil edocentes, ab hac disputatione excludemus. Quid vero reliqui, à causis præter naturam emergentes, nobis significant, quam breuissime fieri poterit, ostendemus.

CAPVT LXXI.

De pulsum ex facultatis cum vsu complicatione.

Quatuor sunt præcipui modi, quibus facultas cum vsu copulari potest, vt ex adscripta tabella videre est:

quatuor modi facultas cum vsu copulari.

<i>Facultas firma,</i>	<i>Vsus auctus.</i>
<i>Facultas firma,</i>	<i>Vsus imminutus.</i>
<i>Facultas infirma,</i>	<i>Vsus auctus.</i>
<i>Facultas infirma,</i>	<i>Vsus imminutus.</i>

Prima combinatio in ephemeris, tam legitimis, quam spuris, in putridisque benignis reperitur. Secunda non est morboſa. Tertia sequitur heclicas, putridasque omnes malignas, proſentas, & quasdam ephemeris corporis robur dissoluentes. Quarta vero marasinos scilicet, syn copas, bulimus, vteri præfocationes, venenumque omne frigidum. Ex prioribus, pulsus sunt vehementes, valde magni, ac celeres, non ita crebri. Ex secunda vehementes, magnitudine moderati, rari & tardi.

Tertia complicatio in duas diuiditur: aut enim facultas valde languet, vsus vero valde est auctus, & tunc languidissimi sunt pulsus, paruissimi, tardissimi, sed creberrimi, quos Formicantes vocat Gal. falsam celeritatis speciem præbentes. Arque ha, vt dicebam, sunt in febribus malignis.

Tertia complicatio duplex.

Aut neque facultas in summo languet, neque vsus in summo est auctus, & tunc pulsus parum excedet in celeritate, aut magnitudine, sed languidior, ac crebrior euadet, vt in ephemeris, quæ ad heclicas tendunt, heclicisque ipsis.

Quarta quoque complicatio in tres subdiuiditur; vel enim facultatis infirmitas superpetat vsus diminutionem, & tunc pulsus erit imbecillissimus, paruissimus, ac tardissimus, vt in deficientem, atque intermittemtem transeat: Aut contra, vsus decretio plus potest, quam facultatis imbecillitas, & tunc pulsus erunt parui, tardi, rari, non tamen summe debiles. Vel tertio, tantum potest vna, quantum altera causa, vt quo vsus magis deficit, eo sit infirmior facultas, sicque pulsus euadunt parui, tardi, moderate rari, ac languidi.

Quarta complicatio triplicis.

CAPVT LXXII.

De pulsibus instrumenti, & vsus.

Ex vsu atque instrumento, quatuor quoque sunt præcipue pulsum coniugationes, vt ex subiecto schemate videre licet:

<i>Vsus auctus,</i>	<i>Instrumenta dura,</i>
<i>Vsus auctus,</i>	<i>Instrumenta mollia,</i>
<i>Vsus imminutus,</i>	<i>Instrumenta dura,</i>
<i>Vsus imminutus,</i>	<i>Instrumenta mollia,</i>

Quot modi vsus & instrumentum coniungantur.

Singu-

*Quid sit
compositio
visus cum
instrumentis.*

Singulæ vero ex his in tres alias subdividuntur, vt tandem duodecim numero euadant. A priori exordiamur: Cum simul neſtuntur vſus auſtus, & dura inſtrumenta, adest febris vel tabida, vel quatuor, vel ex inflammatione membranz alicuius, vt pleuræ, oborta, ſiue ſit legitima, aut ſpuria, aut cum valida obſtuctione, vel ſymptomate conuulſi-
uo, aut doloroſo connexa. Secunda combinatio erit in febre pariter, ſed pituitroſa, ex pul-
monis, aut cerebri affectu oriunda, vt pneumonia, ac lethargo. Tertia in catoche, ſpaſmo
frigido, aliſque id genus affectibus reperietur. Quarta in comate, paralyſi, ſtupore, torpo-
re, hydropo, leucophlegmatia, & id genus humidis affectionibus.

Ex his combinationibus ergo & affectibus, emergunt pulſus iſti. Primo modo erunt
celeres, crebri, iuſto maiores; Secundo modo, crebriores, minus celeres, iuſto minores:
Tertio modo, celerissimi, creberrimi, iuſto minores.

Cum vero vſus eſt auſtus, inſtrumenta autem mollia, vel vſus ſuperat, vel ſuperatur,
vel æque poteſt. Cum ſuperat, pulſus magni, celeres, non admodum crebri erunt: Cum
ſuperatur, pulſus maiores, quam celeriores: Si æque poſſint, eo maiores, quo celeriores,
atque ſi vſus non impleatur, crebriores.

Quod ſi vſus ſit imminutus, cum duro inſtrumento, aut defectio ſuperat duritiem,
aut ſuperatur, aut æque poteſt; Si primo modo, pulſus ſunt tardiores, quam minores, &
rariore. Si ſecundo modo, pulſus ſunt minores, quam tardiores & crebriores: Tertio mo-
do, pulſus eo ſunt minores, quo tardiores, moderati in tarditate, & raritate, ac crebritate.
Denique ſi vſus ſit imminutus, inſtrumenta mollia, vel defectio ſuperat molliem, vel
ſuperatur, vel æque poteſt: ſi ſuperat, pulſus parui: ſi ſuperatur, magni: ſi æque poſſint, mo-
derati ſunt. Omnes vero hi tardi, ac rari ſunt (ad quartam hanc complicationem ſpecta-
tes) & tanto magis, quanto magis deſecerit vſus.

CAPVT LXXIII

De pulſibus facultatis, & inſtrumenti.

Cum facultas, atque inſtrumenta ſimul agunt, quadruplex præcipua oritur complica-
tio, vt præſens docet typus:

*Quid opus
compositio
ex facultate
& inſtrumen-
to con-
ſurgens.*

<i>Facultas firma,</i>	<i>Inſtrumentum durum.</i>
<i>Facultas firma,</i>	<i>Inſtrumentum molle.</i>
<i>Facultas debilis,</i>	<i>Inſtrumentum durum.</i>
<i>Facultas debilis,</i>	<i>Inſtrumentum molle.</i>

Affectus, qui in his combinationibus reperiuntur, a prioribus non ſunt diuerſi. Etenim ſemper cum duris inſtrumentis, erit vel ſiccitas, vel frigidity, vel impletio. Cum molli-
tate vero humiditas. Idcirco in prima combinatione, erunt ſcirrhi, conuulſiones, & ſimi-
lia: in tertia vero maraſmi, heſticæque ventriculi, in ſecunda & quarta comata, ſtupores,
torpores, paralyſes, & reliqua id genus. Ex prima oritur pulſus validus, paruus, non tardus,
ſed creber. Ex ſecunda, pulſus validi, minores, rariore. Ex tertia, pulſus languidi, parui, tar-
di, crebri. Quarta ſubdijnditur in tres, nam vel facultatis excellit in firmitate, & tunc pulſus
parui, tardi, crebri, omnino languidi; vel excellit inſtrumenti mollietas, & tunc pulſus ma-
gnitudine, ac celeritate erit moderatus, ſed debilis: vel pari incedunt paſſu, & tunc vel im-
modica eſt vtriuſque exceſſus, ſicque ſit pulſus paruus, tardus, creber tamen; Si vero mo-
deratus magnitudine, & celeritate, moderati erunt pulſus. Horum cauſas Gal. attulit 1. de
pulſ. cauſ. 10.

*Quarta co-
mplicatio
ſubdiſciſa.*

CAPVT LXXIV.

De trium continentium cauſarum complexu.

Sicut ex duarum continentium cauſarum complexu, quatuor primæ ſunt cõiugatio-
nes, ita tribus inuicem concurrentibus, euadunt octo, vt ex ſubſcripto paradigma-
te conſtat.

*Trium con-
tinentium cau-
ſarum com-
plexio.*

1.	Facultas infirma,	Vſus diminutus,	Inſtrumenta dura.
2.	Facultas infirma,	Vſus diminutus,	Inſtrumenta mollia.
3.	Facultas infirma,	Vſus auſtus,	Inſtrumenta dura.
4.	Facultas infirma,	Vſus auſtus,	Inſtrumenta mollia.
5.	Facultas firma,	Vſus diminutus,	Inſtrumenta dura.

6. Facul-

A	6.	Facultas firma,	Vfus diminutus,	Instrumenta mollia.
	7.	Facultas firma,	Vfus auctus,	Instrumenta dura.
	8.	Facultas firma,	Vfus auctus,	Instrumenta mollia.

Affectus harum combinationum patent ex dictis. Pulsus vero sunt hi: Ex prima combinatione, cum vñs sit imminutus, vel longe alias superat causas, vel superatur: si illud, sunt pulsus tardissimi, rarissimi, parvissimi, debiles, si inferior sit, emanant reliquæ diffinitiones, crebritate quadam accedente. In secunda coniugatione, pulsus parui, rardi, rari, languidi. Tertia in tres subdividi potest: Vel enim omnes causæ insigniter offensa sunt, vel oēs parum, vel vnica tantum. Si omnes gratuite pariantur, pulsus languidi, minimi, rardi, creberrimi, si parum, pulsus parui, crebri; Si vñs immoderate excedat, magni, celeriores, crebriores erunt. In quarta coniugatione vel facultatis laxio superat reliquas, vel vñs, vel instrumenta: Primo modo pulsus languidi, parui, rardi, crebri: Secundo modo, pulsus maiores, quam celeriores, aliquando crebri: Tercio modo, pulsus moderati euadunt. In quinta complicatione, vel vñs destructio superat instrumentorum duritiem, vel superatur: Primo modo, pulsus minores, rardiore, rariore: Secundo modo, pulsus minores, minus rardi, crebri fiunt. In sexta coniugatione, vel vñs est valde diminutus, vel parum: Si multum, pulsus minores, rardiore, rariore: Si parum, non ita aperte minores, rardiore, rariore. In septima complexionē, pulsus maximi, celerissimi, creberrimi erunt. In vltima denique coniugatione, vel durities est parua, vñs auctio magna; vel durities, & vñs auctio parua; vel vrraque magna: Primo modo, pulsus iusto maiores, celeriores, crebriores: Secundo modo, pulsus magnitudine moderate celeriores, rardiore: Tercio modo celeriores, minores, crebriores euadunt. Et haec omnia ex Galen. 2. de puls. caus. 8. 9. 10. 11. apud quem non modo proposuit pulsuum combinationes inveniuntur, sed & ratio, propter quam sic componantur, facile inueniri poterit. Nos quia in clarioribus non libeuit gradum sistimus, ad vtiliora properabimus.

CAPVT LXXV.

De alii, humilis; lati, angustii; longi, brevis; aliarumque differentiarum compositionu causis.

EX viginti septem pulsibus, qui secundum quantitatem externis constat dimensionibus, quosque recenset Gal. 1. de puls. diff. 4. & quorum omnium compositas causas proponit 1. de presag. exp. puls. 3. ego tres primum ab hoc capite expungo, quorum causas antea sub titulo magni, parui ac moderati pulsus exposuimus: Etenim longus, latus, altus, est magnus; brevis vero angustus & humilis, paruus. Moderatus autem, ex his omnibus moderatis constituitur. In aliis vero 24. qui supersunt, explicandis, multus non ero, sed propositis singulatim, alti, & humilis; lati, & angustii; longi, & brevis compositis causis, deinde cuique permittam, vt sponte sua reliquas componat differentias, causasque inueniat, vel ad Gal. confugiat. c. 11. 3. 1. de presag. abunde hac de re dissetentem. Ego enim ab hoc labore libenter abstinere, tum quod me non multum vtilitatis allaturum mihi persuadeam, tum vero quod Gale. satis superque locum citato, hac de re loquentem, intelligam. Ante omnia vero, monendus est lector, ne in inquirendis alii pulsus causas aberrer, vt scilicet naturalem, consuetamque pulsuum, pro innaturali, & inassueto accipiat, id quod & Gal. monet 1. de puls. caus. 13. Accidit enim tam in valetibus, quam ægris, vt alior videatur pulsus, quam latus, non ex alia sane causa, quam quod supernam arteriæ superficiem, multo clarius sentiamus, quam partes obliquas; cum nostro tactui sit propior, & minus coepertur multis interpositis corporibus, quam partes, ex vtroque latere. Hunc ergo, qui naturalis est, cui iam assueuimus, cum eo viuimus, ac sepe in sanis inuenimus, non proprie alrum, sed moderatum vocamus: In cuius collatione illum dicimus altum, qui hunc excedit. Hic sic præmissis, altum pulsuum inuenio Galen. voluisse aliquando ex duplici, quandoque ex triplici causa fieri: ex duplici quidem, vñs aucto, & facultate valida; Ex triplici, cum additur instrumenti angustia circa laterales partes. Augetur autem vñs ex causa & non naturali, & praternaturali; vt ita; Ex praternaturali, febre scilicet. Vitrum autem reuera pulsus ex ira, aut febre, alius euadat, minime latus, quanquam ad latera non coarctetur arteria, summo pere dubito, & tandem eam venio sententiam, id nequaquam fieri posse. Etenim altitudinem semper æquat latitudo, nisi impediatur.

L

Quod

*Semper esse
triplex ali-
quod sit cau-
sa.*

*In quibus affe-
ctibus, reperi-
tur pulsum la-
tum.*

*Ex angustis pul-
sibus canisfe-
rum non
Galen.
Quod sit lau-
sum pulsum.*

Quod si in ira pulsus altior, quam latus videatur, id non aliam ob causam contin-
git, quam quod superior pars nobis sit magis conspicua. Alii ergo pulsus composita causa
est semper triplex, non duplex tantum. Lati vero pariter triplex est: Vt si auctus, facultas
& instrumenta. Vt si auctus in febribus, facultas quandoque valida est, quandoque lan-
guida: instrumentum ideo latum facit, quod vel in superiori parte compressum est, vel in
amplo admodum loco moueatur. Amplicus autem est locus, cum corpora vndique gra-
uifcent. Itaque latus fit quandoque pulsus, non altus, in febre tabida, in hac enim adit v-
sus auctus, facultas debilis, corporum lateralium gracilitas, consequenter loci, in quo ar-
teriae mouetur amplitudo. Quandoque vero talis euadit, in febre puri da, ex vfu aucto, fa-
cultate valida, instrumento ad superiora compresso, eo modo quem alias exposuimus.
Hæc breuiter de alti, humilis, lati, & angusti compositis causis, ex quibus & moderati cau-
se colliguntur. Longum autem pulsum vult Galen. fieri ex vfu pariter aucto, arterie du-
ritie, facultate debili, corporumque arteriarum incumbentium gracilitate. Vt enim facultas
languet, durumque est instrumentum, dilatarı minime poterit; quatenus autem gracile-
scunt vndique corpora, vfuque est auctus, pluribus occurrit arteriarum partibus; longus autē
ille dicitur pulsus, qui pluribus occurrit partibus. Breuitas autem, ex simplici potius, quam
composita prodire causa videtur. Nam sola arteriarum situatio, breuem facit pulsum. Cum
scilicet vna eius pars, cui statim sit obiecta, reliquæ vero in profundum demersæ. Hæc
deus de compositis omnium æqualium pulsum causis, nunc de compositis omnium in-
æqualium pertractandum. Et quia horum quosdam innominatos diximus, alios vero no-
minatos, ab innominatis exordiemur, mox ad nominatos transibimus, & in vno quoque
non modo causas, locos affectos, sed & affectiones inquiremus. Primum autem erit ca-
pur interponendum, in quo doceamus, qua ratione, iam propoliti pulsus distinguantur
ab illis, quos sola pariunt instrumenta, abique vfu aucto.

CAPVT LXXVI.

*Quomodo hi pulsus, ex causa composita, ab illis distinguantur, qui ex solo sunt
instrumento.*

DVplex est modus, quo dignoscere possumus, nunquid pulsus alti, humiles, lati, angu-
sti, longi ac breues fiant ex solo instrumento, an potius ex composita causa. Primus
in vnicuique, secundus in duplici saltem aut triplici differentia locum habet. Qui ergo ad vnus
e. a. n. spectat differentiam, ex proportionem, quam habent species magni aut parui pulsus,
cum causis instrumentariis easdem magnitudinis aut paruitatis differentias constituen-
tibus, exoritur. Nam si g. e. altitudo, aut latitudo tanta sit, quantum requirit causa instru-
mentaria, siue sit gracilitas, siue loci amplitudo, tunc fit ex solo instrumento. Quod si ma-
ior sit latitudo, aut altitudo, quam postulet causa illa instrumentaria, vsum quoque au-
ctum esse oportet. Eodem modo humilem & angustum ex simplici, vel composita causa
oriundum venabimur. Etenim si tanta sit profunditas, aut angustia, quanta est obiecta,
ac corporum vel incumbentium, vel adiacentium crassities, magnitudo, ac pondus; tunc
sola aderit causa instrumentaria: Quod si longe excedat profunditas & angustia, causam
ipsam comprimentem & angustantem; tunc vsum quoque erit imminutus. Et hæc
de primo modo. Secundus autem, qui in duplici saltem differentia locum habet, oritur
ex collatione vnius differentie, quæ fit ex causa instrumentaria, cum aliis, quæ carēt cau-
sa instrumentaria: Nam si g. e. altitudo fiat ex leuitate corporum, quæ arteriæ sunt super-
positæ, comparanda erit hæc altitudo cum latitudine, quæ nullam habeat causam instru-
mentariam videlicet, nec gracilitatem, nec locum ad latera apprimere vacuum: si ergo tan-
ta sit latitudo, quanta altitudo, vel paulo minor, tunc vsum est auctus, si vero latitudo sit
altitudine longe minor, vsum minime auctum esse cõfendum. Paruitatis causas pari mo-
do inquiremus. Si enim humilis sit pulsus ex compressione ad superiora; neque adit cau-
sa angustans circa latera, & tamen pulsus sit angustus, vsum oportet esse imminutum: si
vero non sit angustus, Causam humilis existimabimus esse simplicem instrumentariam.
Quæ vero de vfu aucto diximus, eadem de facultate valida, & quæ de vfu imminuto, de
imbecilla, intelligi volumus. Et hæc de compositis æqualium pulsum causis.

De inæqualibus modo agendum, singulorumque causæ com-
positæ proponendæ.

C A.

CAPVT LXXVII.

De inæqualium pulsuum ex causis compositis procedentium differentia in genere.

Inæquales pulsus ex compositis causis procedentes, sunt in omni inæqualitatis genere, & specie. Primum disparēs in vno ictu, tam æqualiter, quam inæqualiter; interrupti, tamen sub vno, quam sub pluribus digitis ieroti. Disparēs præterea in æteruo, tam æqualiter, quam inæqualiter, intermittentes, atque intereunt res, atque alii plurimi, quorum omnium causas composuit, primum quidem ex Gale. sententia sunt proponendæ: deinde vero sigillatim à nobis examinandæ, sumpto à disparibus vnius ictus exordio, ac sub vnicō digito mox ad alios continuata serie transitu factō.

CAPVT LXXVIII.

De compositis causis inæqualium in vnicō ictu.

Disparēs pulsus, tam æqualiter, quam inæqualiter, interruptos præterea in vnicō ictu, sub vnoque digito, tres aliquando sequi continentes causas, aliquando autem duas tantum, ratio, & Gale. docent. Quomodo autem ex hæc triū diuinae causarum complicatione, disparitas hæc vel interruptio fiat, non vsque adeo apertum est. Quid tamē voluerit Gale. aperiam, mox quid ipse sentiam, statim subnectam.

Gale. itaque 2. *illo de caus. puls.* horum omnium causas sic inter se distingui putauit, vt siue adsit v. is auctus, siue non, dum modo facultas oneretur tantum, tunc fiat dispar 2. qualiter, si vero non modo oneretur, verum etiam obstruantur, aut premantur instrumenta, sicut disparēs inæqualiter, aut interrupti. Disparēs quidē inæqualiter, si obstruuntur vel compressio sit levis, interruptio autem si valida. Hæc Gale. 2. *de puls. caus.* his verbis expressit. *At qui iam inde ab initio ad finem vsq; in celeritatem insurgunt, minus onerari facultatem annunciant, qui contra, magis: Verum tamen oppressa quidē facultate, nullius horum existit, si quidem omnes; magni sunt, præsertim qui tenus in tria interualla, tria; tempora, aut quatuor, quæ sentiri possunt, motus valet extendi. Est autem proprium illi, qui in contraria affatim mutantur, non solum grauari facultatem sed & obstrui, & premi instrumenta. In contraria affatim mutantur illi, si cum mouentur celeriter subito sicut tardi, aut qui ex tardo primo motu euadunt celeres. Oriuntur autem hi, cum ex obstructionibus quibusdam, & constrictionibus, sed minus difficilibus, quam in intermittentibus, tum ex facilitate ipsa copiosis humoribus onerata, minus illa tamen, quam in intermittentibus, et enim non aque magnum est in modum, mutari motum, ac impediri.*

Modum vero, quo hæc inæqualitas succedat, eodem libro cap. 4. sic expressit: *At vnde quod immodici humores, vel instrumentorum compressio, aut oppilatio motum impediunt: primum hinc quod valeat facultas, & vsus insitet, neque enim extra illa, quod noxam inducat, reliquum quicquam sit.* Hæc est Gale. sententia, quæ vtrum sit accipienda, & quomodo, explicabimus in sequenti capite.

CAPVT LXXIX.

De causis inæqualium pulsuum disparium vnius ictus, ex propria sententia.

In explicandis causis, locis affectis, & affectionibus inæqualium pulsuum vnius ictus, breuissimi erimus, omnia enim fere ex hæcenus dictis mutuabimur. Disparēs pulsus proportionabiliter, & æqualiter, quicquid Gale. censet, nunquam ex materia grauantē fieri putamus, duplicem ob causam: Primo quia materia ex se admodum inconstans, atque siue vlla proportionē incedens, utpote quæ nec substantia, nec quantitate, nec qualitate, nec motu semper sit eadem, talem non admittit proportionem. Secundo nec ipsa grauatā facultas vnam pro noxiā expellēdo Arithmetica hac vtetur proportionē, vt scilicet sensum, & pederentim, quæ sibi infensa sunt, detrudat; sicut enim baiulus, vel quinis alius à pondere pressus, omnes adhibet oneratus. vt statim, quod grauat, expellat, nō autem numeros expectat Arithmeticos, ita sane & facultas cordis, statim, ac confertim materiam sibi noxiā excutere tentabit, non proportionabiliter. Disparēs ergo æqualiter, si quidem fuerint celeres, sequuntur calidam intemperiem sensum sentiem, vel recedentem: &

L 2 quadi-

quando fuerit sensim fiens, paulatim celeritas distentionis augetur, vt in ephemerarum principio, & augmentos cum vero fuerit sensim recedens, sensim quoque minuitur, vt in statu ac declinatione. Quod si fuerint tardi, refrigerationem significant vel scientem, vel recedentem; scientem, quando tardior sit distentionis finis principio: recedentem, cum finis sit minus tardus principio.

A quibz partibz intertempus non dist. communicatur.

Et hæc quidē cordi cūueniunt, communicata illi intemperie à cerebro, pulmonibus, hepato, pleura, vtero, ventriculo, iecore, liene, intestinis, renibz, vesica, testibus, alijsue similibus, quæ vt docuit Galen. *l. 2. capite quarto de præsag. ex puls. usque ad x. magis ad citius*, vel minus, ac serius id faciunt, prout maior, ac proximior, minor aut remotior fuerit intemperies.

Affectus pulsum dist. vti inæqualiter.

Quod si disparium inæqualiter causas, & aff. cōiones petamus, hæc profectio non id. *l. 2. capite quarto de præsag. ex puls. usque ad x. magis ad citius*, absunt, sunt enim illæ ipsæ febres nothæ, compositz, pituitosæ, epizicæ, melancholicæ, in quibus totus humor nō putrescit; sunt omnes putridæ, quæ symptomata refrigerationem inducentia habent connexa, de quibus diximus in parte, quæ de disparibus ex vñ tantum, pertraçauit. Quomodo ergo hi ab illis differunt? In eorū tantum differunt, quod illos ex inæquali tantum calore, aut frigore, disparitatē habuisse docemus, hos vero præter qualitates, matriciam quoque habere aliqua ex parte grauante arbitramur, propter quam tarditas augeatur. Itaque tanto hi erunt prioribus tardiores, quanto plus possunt duæ causæ, quam vnica.

Obiectio.

Sed instabit quispiam, qui fieri possit, vt eadem febris putrida, quæ semper est cum materia, aliquando faciat dispare non grauato corde, quandoq; vero eodem etiam grauato? Si idem est morbus, eadem sunt symptomata: sane ratio iudat eisdem semper fieri debere pulsus, non autem quandoque dispare ex vñ tantum, & facultate grauata, quædoque vero ex vñ.

Solutio.

Huic obiectioni respondeo, rone posse vnicam esse causam, nempe inæqualem intemperiem absque matricia grauante, eum vel febris focus non sit ita proximius, vel materia non sit multa, aut sit nimis crassa, aut membranis impacta inclusa, aut facultatem habeat expultricem parit, in qua est admodum sopita, & ad expellendum p.gram: In his enim casibus potest communicari qualitas, non materia. Erunt autem duæ, intemperies scilicet, & materia, cū locus affectus vel cordi fuerit proximior, aut sit ipsum metcor, vel materia sit multa, vel mobilior, ac minime impacta, nec densa inuolucro obducta, vel facultas expultrix sit validior. Pater itaque, quomodo idem morbus eadem febris possit dispare inæqualiter excitare, tam ex simplici vñ inæquali, quam ex duplici causa, accedente scilicet ipsi qualitati, materia quoque facultatem grauante, sed absque obstructione, ac compressione; Etenim quid deinde faciat obstructio & compressio, mox exponam.

CAPVT LXXX.

De causis interruptorum, ac præcipue Caprizantis.

DE interruptorum causis & affectionibus, plurima quidem diximus in parte, quæ de pulsibus vsus pertraçauit, aliqua tamen sunt nunc repetenda, quædam vero addenda.

c. 1. de causis interruptorum, ac præcipue Caprizantis.

Quæ repetimus, hæc sunt, interrumpi distentionem, vel à frigiditate, vel à fuligine, vel à facultate sensitua noxia fugiente, vel ab expultrice eadem noxia detrudere, eomodo quem suo explicauimus loco. Nunc autem illud adinngimus, quod valde proprium instrumentariz causæ videatur esse, nempe interrumpi quandoque motum ex nimia compressione, vel valida obstructione cordis, aut saltem partium cordi apprimere propinquarum: Cuius rei fidem facit Gal. *2. de caus. puls. 3. 2. de præsag. 7. & 1. 3. de præsag. 4.* Compressionem vero ex tumoribus fieri, nemo vertit in dubium. Vtrum tumores isti calidi esse possint, vel non, inflammatorii scilicet, maximum sane est dubium. Ex vna enim parte, inflammatorii videntur quandoq; construendi, quia dantur interrupti, quorum postrema distentionis pars celerior est priore, caprizantes vocati, quorum ratio iudat, ex nulla fere alia causa, quam ex inflammatione esse oriundos. Cnm n. robur facultatis obrincat, vt ex distentionis magnitudine, vehementiaque, præcipue vero circa postremam distentionis partem, colligitur, eum præterea insignem quoq; celeritatem habeant, quæ ex celeritate maiore post interruptionem succedente facile comparatur, non potest profecto valida

A valida facultas ab vlla causa premi magis, quam à tumore, nec potest vllus tumor vltim immodice in corde augere, nisi valde sit calidus: videtur ergo ex his sequi, caprizantes ex inflammatione produci.

*Facultas à
tumoribus
magis, quàm
à tumore
promouetur.*

Ex alia tamen parte, cum scribat Gal. *de loc. affect. 2.* ex cordis inflammationibus ita cito robur exolui, vt patientes syncope superueniente affatim moriantur: nulla videtur ratio, cur dicamus, caprizantē, qui magnitudinem ac vehementiam continet, ex inflammatione cordis esse oriundum.

In hac difficultate, resolute dicendum puto, aut caprizantem nunquam fieri ex cordis inflammatione, aut si quandoque fiat, illam leuem admodum, atque in vnica illius particula, forte in auriculis tantum cordis futuram. Hoc sane aliquando fieri posse, non

Inficior, illud tamen multo libentius accipio, caprizantes, quando inflammationes sequantur, ex pericardio potius, quam ex alia quauis parte ortum suum habituros: Etenim pars hæc inflammatione affecta, & calefacere, & comprimere cor porcit, manēte tamen illius robore, quo post interruptionem, fortius ac celerius mouere valeat.

*À quo non
dicitur
resolui
tumoribus
sed à
pericardio.*

Cæterum non ex his tantum tumoribus comprimentibus, sed & ex humoribus caprizantes quandoque fieri, docuit Galen. *loci citati.* Quomodo autem humores tantum valeant, vt perinde atque tumores motum impendant, difficile sane intellectioni videtur,

*Quomodo
humores
dicitur
motum
impedire
valere.*

Attamen dupliciter id contingere posse arbitror; vel quod multi ac crassi in pericardio contineantur, sicque pondere premant; vel quod multi quidem non sint, nec premant, sed siue pericardium repleant, siue aliunde fluant, facultatem modo contrahentem, modo expellentem naturalem irritent, vt ex contractione sequatur interruptio, ex motu autem expultrice, vltima distentionis pars, sit prior maior & celerior: Quod quamam ratione fiat, & in quibus morbis, alias exposuimus.

Ced & tertio quodam modo caprizantem fieri puto, ex conuulsione scilicet, cum phrenitide conuexa. Hoc colligo ex Galeno *de caus. puls. 1. p.* dum scribit in phreniticis, motum cum quadam conuulsione abruppi, & eandem subito, atque affatim incipere, quasi exiliant arteriæ, non paulatim distendantur. Hæc profecto caprizantem mihi videtur ad vnguem depingere. In quo sane conuulsio potest arteriam in media distentione intro trahere, vt interruptio sequatur: ex alia vero parte facultas valida ab vsu aucto impulsu, quasi exiliens, affatim ad perficiendum motum insurget, sicque fiet caprizans pulsus, nedum ex inæquali cordis intemperie, aut ex grauata & irritata à iam dictis causis facultate, sed & à conuulsuo affectu, cum febre tamen valida, qualis est in phrenitide.

*Caprizans
dicitur
conuulsione.*

CAPVT LXXXI.

De decretis duri causis ex Galeno.

Decreti duri duas facit Gal. differentias, vnā vibrati, non vibrati alteram. Vtriusque causas, *de caus. puls. 1. p. de præsag. ex puls. 1. p. de diff. puls. 16.* proponit: Quæ partim sunt vtriq; communes, partim vero propriæ.

Communes, quatenus ambo bis pulsant: propriæ, quatenus alter eotum vibrat, alter non.

*Communes
dicitur
tandem
vibrati
quod
non vibrati
causæ.*

Communes causæ ex Galeno sunt inæqualis durities ac mollities, vel ex inæquali refrigeratione, vel ex inæquali siccitate, vel ex inæquali impletione, vel ex inæquali tensione ob conuulsorium affectum. Propriæ non vibrati, sunt facultas inualida, vsusq; minime auctus.

Propriæ vibrati sunt, vsus valde auctus, facultasq; valida.

Modus, quo vterque ex proposito inæqualitate producit, ex Galeno *loci iam citati.* patet. Etenim dum mollior sit arteria in media sui parte, quam in lateralibus, media primo, laterales dein seps mouentur, secumque mediam secundo rapiunt, vt hinc bina exsurgat pulsatio, quandoque vibrata, cum molliorem illam partem vsus, ac facultas valide

*Modus, quo
generatur
vibratio.*

Impulerit, non vibrata vero, cum vsus sit non auctus, ac facultas non admodum valida. Hinc colligit Galen. in dicto non vibrato, inæqualitatem apparere in maximis arteriarum partibus, in vibrato autem, in minimis. Etenim in non vibrato, omnes arteriarum partes, quas tangunt digiti in secundo saltem ictu, æqualiter attolluntur, illæ vero, quas digiti non tangunt, vt pote duriore, minime; idcirco inæqualitas est secundo in maximas arteriarum partes. In vibrato autem pars vna ex illis, quas tangunt digiti, tanquam minus dura, magis eleua-

L 2

tur, quam aliz ab aliis digitis tactæ, ergo in priore, inæqualitas fit secundum maximas, in secundo autem, vibratio scilicet, secundum minimas arteriz partes.

Ex quo patet etiam distinctio vibrati dicroti, à vibrato non dicroto. Etenim vibratus hic dicrotus vibrationem habet, vt diximus in minimis, vibratus autem nō dicrotus, in maximis arteriz partibus. Etenim prior inæqualem habet duritiem, idcirco vibrat in parte tantum molliore: secundus, æqualem habet duritiem, propterea secundum omnes arteriz partes vibrat. Hæc omnia voluisse Galen. ex illiusmet verbis confirmare possem, ea tamen hoc in loco tantum adducam, quæ non nulla continēt, longo, ac diligenti examine digna, de quibus in sequenti capite.

CAPVT LXXXII

Galenī opinio de dicroto pulsū examinatur.

TRia sunt in Gal. ad dicrotos duos spectantia, quæ examine indigent: Inter quæ illud primum est, quod de carclerorum fieri ex tali inæquali arteriz duritie, ac molliore, vt pars quædam arteriz tacta sit mollis, aut minus dura, laterales vero duræ sint, aut saltem duriores.

Secundum est illud, in dicroto, facultatem esse languidam.

Tertium est, dicrotum durum non vibratum, esse tardum.

Hæc omnia voluisse Gale. ex eius verbis colligemus, mox vero quomodo sibi inuicem consentiant, examinabimus.

Ad primum ergo quod attinet, sensisse Galen. in dicroto illam ineniri duritiem, ac mollietie inæqualitatem, quam antea descripsimus, aperte illius verba docent, quæ variis in locis scribit. Primum enim de inæqualitate, quæ ex refrigeratione ac calore est oriunda, verba faciens *2. de puls. caus. 6.* hæc habet: *Vbi partes arteria, quam attingimus duriores sunt frigidioresque, ita difficilior etiam moueantur partes utrinque, quas non attingimus, ac deinde partem mediam præ ipsi in distentione concitatam retrahant intro, iterumque secum attollant, sibi necesse est, feriatque tactus. Et de eadem inæqualitate ex morbo instrumentario, hæc subiungit. Vbi cum vibratione sublata arteria, pari ea, quæ sola cuncta tella est, facile attollatur: alia autem utrinque partes trahit: utine, numeroque onerentur corporum incumbensium, adeo ut non minus quidem earum, tangentibus occurrat: necesse est tum ex parte hac, quæ aperta est, omni iam sublata, partes illas non manifestas, quæ utrinque sunt, adhuc attolli. Hæc igitur aperte docent, dicrotum fieri ex inæquali duritie, vel inæqualem intemperiem, vel morbos instrumentarios sequente.*

Quæ vero habet *2. de præfag. ex puls. 8.* & hoc ipsum docent, & præterea facultatem in dicrotis esse languidam: sic enim scribit: *Aliam in qua non vibratur est pulsus, sed arteria dura, adeoque facilius imbecilla, ut à corporibus incumbensibus degravetur, tamen aliqua parte sita ad eam, libere attollatur: hanc enim cum solo sensu percipiant tangentibus, erit aliquando pulsus dicrotus, ubi præ oneris leuitate, existerentem illam, partes utrinque confidentes, nec consequētes retrahant à corporibus impositis grauata. Tardum vero esse dicrotum non durum, aperte docuit Gale. *3. de præfag. ex puls. 4.* vt fusius infra declarabo.*

Hæc cum ita sint, videamus quæso, nunquid simul stare possint, vel ne.

Si dicrotus pulsus hoc modo fieret, profecto non in omnibus arteriis appareret. Consequentia probatur: Etenim, si quæ est affectio, propter quam leuior in media parte sit arteria, in lateralibus grauior, sane opus est illam in eadem arteriz parte, quam tægimus, reperiri. Qui ergo fieri potest, vt omnes corporis arteriz, motum hunc inæqualem, à parte illa determinata, ignobili, ac remotissima, obrineant?

Accedit, quod si in loco illo determinato, in quo arteriam tangimus, ad ista ipsa inæqualis affectio, ex qua fit dicrotus, sequetur tunc statim posse amitti dicrotum, cū alia atque alia fuerit digitorum ad arteriam positio. Fingamus enim ex tactu partis arteriz leuioris fieri dicrotum, quid erit si in loco laterali duro tangatur arteria? Sane media, ac leuioris partis, quæ primo distenditur, motus non sentietur: At si ille non sentietur, profecto amplius dicrotus non erit, quia ex Gal. idcirco dicrotus fit, quod media pars leuior sola sentitur, mox vero omnes simul, at si mediam non rangent digiti, prior motus non sentietur, et tunc nec dicrotus, quia vnicus sentietur grauata partis ictus.

Addo me (vt ante, dum de eminulis loquerer, dicebam) non posse aut modum cōsequi, aut affectionem, in qua vnica arteriz pars media à nobis tacta, sit mollis ac leuis, reliquæ vero utrinque positæ sint duræ ac grauæ.

*Distinctio
dicroti
leui à non
vibrato.*

*Dicrotus in
omni corp.
arteria re-
periri etiam
rationem
Gal.*

*Dicrotus ex
varia ma-
nu applica-
tione vari-
modo mu-
tatur.*

- A** Sed & quæ de imbecilla facultate scribit Gal. difficultatem augent: Etenim si visque adeo debilis est in dietro facultas, ut à corporibus in eum bentibus degrauctur, ergo non poterit tantam arteriæ duitiem superare, illamque attollere: Nam si moderata sit: durities, si quæque mediam partem intro trahet; si vero vehemens, ut attrahere possit, ab imbecilla non superabitur facultate. Hæc sane ex ipiomet Gal. colliguntur: Dum enim emiculi, atque prominuli pulsus causam proferi, hanc inter reliquas recenser, inæqualem arteriæ statum, propter quem leuior pars media attollitur, extremæ autem grauior, atque duriores minime. Qui ergo fieri potest, ut eadem imbecillitas, eadem instrumentorum affectio, modo innuentem, & e-reumnuentem, modo dirotum pariat? Dura profecto hæc mihi videntur, & in eam me trahunt sententiam, nullum dirotum durum, siue vibratum, siue non vibratum, hoc fieri modo.

Confirmatur, nam ut ad vibratum quoque me eouertam, si hic sit ex duritie instrumenti, ut *2. de caus. puls.* docuit Gal. quomodo inquit, diroti vibrationem in parte arteriæ molliore apparere? Deberet profecto in duriore, non in molliore fieri.

Accedit quod *1. de diff. puls.* scribit vibratum fieri ex impetu facultatis arteriæ mouentis, eodemque modo illam conuenientis, quo rami vi tracti & dimissi conueniuntur: At vero, rami vi tracti & dimissi, non ideo pluries mouentur, quod inæqualem habeant duritiem, imo vero, quo duriores æqualiter sint, eo facilius pluries mouebuntur, ergo & arteria vi impulsæ, quo magis æqualiter dura fuerit, eo plures moueri debet. non ergo opus est hæc in æquali duritie.

- C** Accedit neque omnino sibi constare Galenum in iis, quæ de facultate vibratorum causa scribit: Etenim omnem vibratum ex valida facultate fieri docuit *2. de puls. caus. 4.* Ex imbecilli tamen aliquando fieri censet *2. de prasag. expul. 3.* & confirmat *3. de prasag. 4.* diu hæc teribit: *Ac commemorat: 'um quidem primum est, quod causæ absolute vibratus succedat, quas ante omnes recensimus, mox causam eius, quasi continentem, sit enim, ubi amplius cogitur dyspnoia durum corpus arteria, vel tensum: ad hoc tertium, quod, cum facultas imbecilla sit hinc accersit, aut conformatio natua, vibratum pulsus oriri demonstrauimus. Hæc ergo manifeste pugnant cum 2. de caus. puls. 6. & mihi sane negotium facessunt: Quid vero de iarditate, quam Gal. dirotis tribuit, censendum sit, mox aperiam.*

CAPVT LXXXIII.

- D** De diroti duri causis & affectionibus, ex propria sententia.

DE dirotis duris ex propria sententia acturi, primo causas & affectus, mox autem productionis modum explicabimus.

Igitur ad causas, & affectus quod attinet, huius doctrinæ principia à Gal. desumemus, qui *2. de prasag. expul. 4.* ut modum doceret, quo dirotus ex inæquali cordis intemperie prodiret, & minime durus est, à duro distinguatur, præcipit, ut accurate ad modum, omnes considerentur causæ & affectiones, quæ dirotum durum parere possint, & eum nullam ex his adesse nouerimus, tunc inferamus dirotum fieri ex inæquali intemperie. Affectiones vero, & causæ, quas vult Gal. dirotum parere durum, his coneluduntur verbis. *Uti si*

- E** denique sunt reliqua animaduertenda, præsentia præcedentia, & externa. Nam, cum peripneumonia, suppuratio, pleuritis, phthisis, denique aliquis illis exortus sit, vel asthma, vel morbus quispam ex de stillatione, vel cruentum spiritum, aut resicatio partu alicuius pulmonis, vel breuiter quoduis, vniue redundancia, vel crassitudo, vel lentor humorum obideat pulmonem, accurate considerandum est, ecquid ex arteriarum obstructione pulsus inæqualis fiat. In his verbis omnes continentur causæ & affectus, ad Thoracem spectantes, & quibus fit dirotus durus. Post quæ, subiungit Galenus affectiones quoque cordis, ex quibus fit idem pulsus, dicens: *Sin horum nihil sit, ipsum Corde aff. est visum explorandum, præsertim si ante cæca agroti visia, nec crassus succus, nec lentus videatur corpus* *Corde aff. est visum explorandum, præsertim si ante cæca agroti visia, nec crassus succus, nec lentus videatur corpus*
- F** fluentia humorum graues facultates, in eadem pulsus in inæqualitatem. Hæc enim Galen. ex quo facile desumimus, dirotos duros fieri tam ex corde, quam ex partibus cordi proximis; nempe arteria magna, vena arteriali, consequenter ex pulmonibus, ac pleura: Affectionem vero esse, aut tumores, aut obstructiones, aut compressiones, aut substantiæ putrilaginem. Tumores autem esse, calidos, frigidosque varios: obstructiones autem fieri ab humoribus crassis, viscidis, lentis; compressiones denique ab iisdem humoribus;

aut in pericardio contentis, aut in cavitate thoracis, ideo posse non modo esse pituitosos, sed & sanguineos, ut in sputo sanguinis contingit, & purulentos, ut in supuratione. Hæc omnia ex Galeno facillime colliguntur.

*Quæstio de
vibrato.*

Circa quæ quatuor veniunt declaranda. Primum est, an omnes istæ causæ & affectus, faciant dicrotos duos. Secundum nunquid isti omnes affectus dicrotum pariant durum non vibratum. Tertium an isti ipsi affectus pariant vibratum. Quartum an præter hos, alii quoque reperiantur, qui duos dicrotos faciant.

Ad primum quod attinet, non videtur sane, humidæ pulmonum affectiones, ut asthma, destillationes, & reliqua id genus, dicrotum durum facere, si vera sunt, quæ docet Galen. 4. de præfag. ex puls. 2. humidus pulmones & ex se, & ex materia imbuente, humidus quoque reddere ipsum cor, & arterias: Ex alia tamen parte cum Galen. 3. de præfag. ex puls. 4. inter dicrotorum duorum causas, destillationem quoque & asthma repositur, ne contradixisse sibi videatur, pro contradictionis solutione dicendum purò, destillationem, & asthma, quatenus ad pulmonis substantiam referantur, minime duritiem parere, sed quatenus tantum sint cum arteriarum impletionem: ex materia quoque non fluida, sed crassa ac viscida. Confirmatur, quia materiam crassam ac viscidam quamquam pituitosam, duritiæ esse causam, docuit Galen. 4. de præfag. capite octavo. Hæc igitur de primo quæ-

Ad secundum & tertium quod attinet, dubium est, nunquid omnes istæ causæ, & affectus dicrotum durum pariant non vibratum, & eadem quoque vibratum. Non enim videtur hoc posse fieri. Quia non vibratus ex Galeno tardus est, ergo ex inflammatione alioque calido, ac febrili affectu non prodibit. Vibratus contra semper febrilis est, ergo ex frigidis causis, & affectibus nunquam orietur. Quid ergo dicendum? Cogitabit forte quispiam, rem sic facile componi, dicendo ex frigidis causis, & affectibus fieri dicrotum non vibratum, ex calidis vero vibratum: Sed res non sic habet: Fingamus enim aliquam esse in corde, aut pulmonibus affectionem calidam, nempe inflammationem, ex qua possit, debeatque fieri vibratus dicrotus: desit vero facultatis robur: sane amplius non poterit esse vibratus, quia una deest vibrati causa, nempe virium robur, remanebit ergo dicrotus durus, siquæ fieri poterit etiam pulsus iste in calidis affectionibus. Quod si verum est, quomodo ergo Gal. 3. illo de præfag. ex puls. cap. 4. inquit, dicrotos non vibratos, propter tarditatem tales esse? Profecto si inflammationem, calidamque cordis & pulmonum affectionem consequantur, tardi esse non possunt: & tamen Gale. apertissime hoc docet. Breuiter pro rei veritate, & Galeni defensione dicendum, dicrotum durum non vibratum, posse fieri tam ex calida, quam ex frigida affectione, & causa, sed hoc discrimine, quod ex frigida eris tardissimus: ex calida vero eris quidem minus tardus, non tamen apprimè celer, quia ne inuálida facultas potest celere facere: neque dura instrumenta permittent. Et hæc tenus de dicrote non vibrato. Qui tunc statim in vibratum transit, cum in calida affectione, duroque instrumento virtus consistet: atque ideo illas tantum sequetur affectiones calidas, quæ minus facultatis robur destruant, nempe pleuritides, & alias id genus.

Venio modo ad quartum quæsitum; An fiat dicrotus durus ex aliis affectionibus ac locis, præter iam enumeratos? Si de non vibratis mentio fiat, inuenio Gal. etiam lethargicis dicrotos tribuisse, quamquam 4. de puls. caus. 13. rarius dicat in his fieri dicrotos, quam ex pulmonum affectionibus. Et sane iure optimo: Cum enim dicroti duri non vibrati, vix mox explicabo, vicissim intermittentibus succedant, nullaque sit pars, corde excepto, quæ facilius intermittentes pariat, quam pulmo: idcirco omnium maxime dicrotos excitabit post pulmonem vero, & cerebrum, & os ventriculi, tanquam partes, quæ magnas habent arterias, quibus compressis, vel obstructis, intermissio fieri potest.

Ad vibratos autem dicrotos quod attinet, ut omnes illas affectiones, locique affectionis notescant, consultum est de vibrati non dicroti causis primum differere. Dicebat enim Gal. 3. de præfag. ex puls. 4. vibratum dicrotum generari, ubi pulsus, qui absolute est vibratus, diminuta sit longitudo. Itaque si dicrotus vibratus differat a vibrato non dicrote, eo quod ille sit breuior, hic autem longior, querenda est primum causa vibrationis, mox & longitudinis diminutæ: sic enim utriusque naturam consequemur.

Vibratum ergo non dicrotum: docuimus alias fieri ex triplici causa, facultate valida, vtu aucto, instrumento duro. Quatenus ergo facultas valet, non potest cor primo & per se insigni morbo laborare: Prout vero vtu est valde auctus, oportet affectionem esse calidam,

*Quæstio de
vibrato
dicrote non
vibrato.*

*Vibrati
dicrote
causæ.*

Adam, magnam, aut cordi proximam, aut saltem per magna vasa illi facile communicabilem. Denique quatenus instrumenta sunt dura, opus est corpus arteriz esse valde impletum, aut saltem valde tensum, ob membranas, nervos, tendonesque affectos. Ex quo statim colligitur, posse vibratum fieri ex inflammatis, vel à calida materia impletis arteriis sanibus, aut iis, quæ ex aorta ducunt originem (dummodo tamen affectio facultati non exoluat) vel ex eadem inflammatione, aut impletione septi, pleuræ, meningum, oris ventriculi, vesicæ, vteri, intestinorum, aliarumque id genus membranarum vt peritonici, iecoris, lienis, renum, testium, ac consimilium: Denique vero ex nervorum ac tendonum affectione, præcipue vero pedum, ac brachiorum, qui cæteris sensibiliores, ac duriores sunt. Ex his omnibus locis fieri duros pulsus, & accedente causâ calorifica, vt in inflammatione, erysipellate, impletione à materia calida, vibratos, nemini iam ignotum est.

In quib. feb. febrib. feb. vibrat. m.

Atque hinc colligitur, vibrationem quandoque fore continuam, aliquando periodicam, vel saltem intermittentem. Erit enim continua, quæ ex facta inflammatione ducitur ortum: Periodica vero, quæ fit ex sientia; aut fluxione materiz absq; in inflammatione. Etenim eodem modo, quo diximus fieri pulsus durum, ac mollem, vel saltem magis, ac minus durum in acervo, eodem quoque affirmamus posse fieri vibratum, & non vibratum. Cum enim causa aliqua vel indurans, vel calorem augens, vel vtrumque efficias, duro corpori accesserit, vibrationem vel faciet, vel augebit. Cum recesserit, recedet quoq; aut minuetur vibratio. Sunt autem causæ, quæ accedunt, ac recedunt, nedum humores, aut vapores, sed & errores quidam externi, quorum meminit Galenus, *de præsag. ex puls. cap. 4.* nempe vinum, aut frigidæ potus, pomorum usus, balneumque frigidum; & si quæ alia sunt huiusmodi. Hinc scribit Gal. *3. de præsag. ex puls. 4.* vibratum, & non vibratum, mutua se vicissitudine excipere.

Quæ sit continua vibratio, & quando periodica.

Explicatis ergo causis & affectionibus vibrati non dicroti, ad dicrotum concedamus; qui, vt optime docet Galenus non alia ratione differt ab alio iam exposito, quam longitudine diminuta: inuenta causa huius diminutionis causa, statim patebit dicroti vibrati natura.

Diminuitur ergo longitudo pulsus (omissa conformationis proprietate) vel ex arteriz distortionem, vel ex incumbentibus arteriz corporibus: Fit vero distinctio ex conuul. *Arteriz distinctio conuul. de.* suis affectionibus; incumbunt autem arteriz corpora, cum foris adsint tumores, aut saltem humores multi ac crassi, secundum arteriæ longitudinem positi: itaque dicrotus vibratus fiet vno ex duobus propositis modis, & ex vna iam adducta ratione causarum. Hinc ergo sequitur vibratio in minimis arteriæ partibus, ad differentiam vibrationis non dicroti, quæ fit in maximis: Quod scilicet vt docuit Gal. *2. de præsag. cap. 2.* & confirmavit *3. de præsag. cap. 4.* in illis abbreviata sit longitudo, in his autem minime. Hactenus arbitror cuque apertas esse vtrinque dicroti duri causas, & affectus: Non tamen adhuc patet generationis modus, aut binæ pulsationis causæ: Quæ duo in sequenti capite proponemus.

CAPVT LXXXIV.

Quomodo in dicroto duro pulsus tam non vibrato, quam vibrato binus fiat pulsatio.

Dicroti duri non vibrati quatenus bis pulsant, nullam puto aliam esse causam, quam vsum in corde valde autu: Augetur autem vsum hic in corde, quia nec purgatur fuligo, neque attrahitur aer: neutrum autem horum fit, quia vt paulo ante dicebamus, dicroti omnes duri sunt parui, tardi, intermittentesque sequuntur. Dum ergo sit intermissio, cum neque attrahatur aer, qui refrigeret, neque expellatur fuligo, hinc post intermissionem opus est naturam, aut celerius, & magis, aut saltem crebrius ad refrigerandum, expellendūque moueri: celerius & magis id efficere nequit, eo quod facultas est inualida; facit ergo frequentius, & inæqualiter; summa autem crebritas in duro instrumento inæqualiter facta, dicrotum constituit, itaque à primo ad vltimum, dicrotus bis pulsant, quia durus existens, inæqualiter creberrimus euadit, obretentus fuligines, autumque calorem in corde, ex præcedente pulsus intermissione.

Cur vsum augetur in dicroto duri vibrato.

Neque vero quis dicat, hanc sententiam minime accipiendam esse, eo quod plerique dicroti sint absque febribus, atque sine vsum aucto. Etenim tametsi illos concedam esse sine febribus, nunquam tamen admittam, esse absque vsum aucto: Ratio quippe est clarissima. Quis enim quæso negabit in quocunque corpore etiam non febrentem, calorem, & fuli-

& fuliginem adesse, & continui egere diastole ac systole? Nemo ut arbitror: Si ergo aliquando intermissio fiat vnus, vel plurium pulsationum, vsus augeri necesse est, quibus dum cogitur facultas post intermissionem satisfacere, binam, ternamue pulsationem eretram, atque inaequalem molitur, quae dicrorum durum constituit.

*Intermissio
tamen oppositum
docet experientia.*

Sed adhuc instabit quispiam, ergo omnis intermittens habet etiam dicrorum; cuius tamen oppositum docet experientia. Ad hoc argumentum nego consequentiam. Et ratio negationis est, quia intermittentium duplex est differentia: quidam enim post intermissionem sunt magni, ac celeres, quidam vero parui, ac tardi. Qui sunt magni & celeres, non sunt dicroti: natura enim satisfacit vsui aucto magnitudine, ac celeritate, sed parui ac tardi euadunt dicroti, quia facultas sola erebescit inaequali cogitur vsui aucto satisfacere. Hanc veritatem proxime expertus sum in Reu. quodam monacho S. Iustinae, & in Doctore Blanco Florentino, eandemque in aliis pluribus non febrientibus obseruavi. Nam de febribus res multo est clarior, cum in his ex intermissione vsus augeri nemo non concedat, intermissitres vero esse dicrotis eorum docet ratio: Etenim si dicroti duri affectio est graua, comprimensque eor, vel magnas arterias, oportet sane facultatem ita defatigari, ut aliquando intermitat, id quod docuit Gale. 2. de puls. caus. 2. cui suffragatur experientia: Etenim ex tot patientibus, quos praesenti anno cum dicrotis pulsibus inueni, neminem habui, qui intermissionem non pateretur. Hanc obferatui nedum in his duobus febrientibus proxime relatis, sed & in tribus antea propofitis, & in aliis tribus mulienibus, quae proxime obiit, vna Veneta, ex nobilissima familia Priola; duabus vero monialibus S. Petri, vna annorum 60, altera autem 80, quae omnes vel pneumonia quadam spuria laborantes, vel pulmonum, arteriarumque laeuum calida intemperie, cum materia multa & crassa, bili commixta, inibi putrescente, obstruente ac comprimente corpore, ut dixi, vitam cum morte commutauerunt.

*Bina pulsa-
tionum causa
in dicrotis
habetur.*

Et haec enus constat, quomodo dicrotis durus non vibratus, bis pulset. Ex quibus colligitur binæ quoque pulsationis causa in dicroto vibrato: Etenim id, quod praestat in priore intermissio, paruitas, ac tarditas, praestat in hoc vibrato abbreviata longitudo, ac compressio. Non enim potest facultas vsui satisfacere, ubi valde sit auctus, & arterie longitudo abbrevietur. Recte ergo fuligo, auctusque calor, crebriorem illam inaequalem parunt, quam dicrorum propriam esse diximus. De dicrotis satis, venio ad vndosos.

C A P V T L X X V.

De vndosi pulsus compositione causis.

Quomodo ex sola instrumenti mollitie vndosi fiant pulsus, haec enus docuimus. Quam autem ratione fiant aliquando ex inaequali mollitie, vel sola, vel cum aliis duabus contentiuis causis, nunc demonstrabimus. Arteriam ergo ex se mollem, posse in aliqua sui parte duritiem obtinere, quotue modis id fieri possit, mox ostendam: ex hac vero inaequalitate vndosos fieri, nunc ratione, & Gal. auctoritate demonstrabo. Ratione quidem: Etenim si vndosus ideo sit, quod tota arteria sub omnibus digitis eodem tempore attolli non possit, sed vna pars eleuetur sub primo digito, altera vero subsistat aliquotulum, mox eleuetur sequens, donec pariter subsistat, & iterum eleuetur vndarum instar; quid quæso prohibet, quominus dicamus, arteriam in ea parte, quae subsistit, esse duriorē, in ea vero quae facile attollitur, molliorem? Nihil profecto: imo vero hoc mihi videtur voluisse Galen. 2. de praesag. cap. 9. dum inquit, *Quo cum robur, quod excitat, & distendit, claudices alicubi illis locis decidat, atque velut vnde formam accipiat.* Perpendo illud verbum claudicare, quod sane idem sonat, quod ex impedimento aliquantulum morari. Si ergo moram ducit facultas ex impedimento, non potest esse hoc impedimentum in arteria equaliter molli: ergo erit in molli quidem, sed alicubi compressa, si in compressa, ergo in eadem sub dura. Quo fit, ut facultate atque vsu moderate se habentibus, ex inaequali tantū mollitie vndosus quandoque exciteretur pulsus. Ut vero pateant affectus, in quibus sic fiant; omnes primum expedit modos proponere, quibus aliqua leuis durities, cum multa arterie equaliter molli coniecti possit. Inuenio igitur hoc fieri, vel ex loco, vel ex affectu, vel ex materia, vel ex pluribus, vel ex his omnibus simul.

*Modi quibus
leuis durities
et a multa
arteria molli
vnde molli-
tas.*

Ex loco primum, quando pars, quae praecipue, magisque afficitur, sit ex se mollis, vel cerebri, ac pulmonis substantia, quae vero deinceps, ac minus, duritiem pariat, ut vena, arteria, nervus vel membrana aliqua, tendo,

Ex affe-

A Ex affectu veto, cum præcipuus affectus mollitiem faciens, sit, exempli gratia, cedema, alter vero leuior duritiem patiens, sit icterus parvus, aut quid tale.

Ex materia autem, cum, qui prædominatur in corpore humor, sit humidus, liquidus, nec admodum frigidus, qui vero subdominatur, sit frigidior, crassior, ac vitiosior, qualis est pituita vitrea, vel sic or, vt bilis, ac melancholia. In his ergo partium, affectionum, atque materię confusionibus, in quibus mollities longe superat duritiem, poterit esse vndosus; contra vero durus, siue terratus, siue alius, si pars, affectio, materiaque duritiem faciens, superaverit. His sic constitutis, iam vnicuique patere poterit, vndosos istos inueniri in cerebri, ac pulmonum affectibus spariis, subinde & in spuris quotidianis, quandoque in hydropse, & in ventriculi suffocationibus. Et sane de pulmonum & cerebri affectibus, possum hoc facile ex Gale. confirmare 4. de puls. caus. 12. & 13.

B Cum enim ibi scribat, pneumonorum & lethargicorum pulsus esse vndosos, simulque dicrotos duos, quis quæso est, quia audeat affirmare, vndosos tunc ex sola fieri mollitie, eum dicrotos duos habere comites? Au non pater duritiem, ac mollitiem esse contraria? quomodo ergo poterit stare dicrotus cum vndoso, nisi fiant, vt diximus, vndosi, in affectibus non tatum legitimis, sed & spuris, in quibus scilicet, vel materia, vel locus, vel affectio dura alteri relictur materię, loco, & affectio ni mollitiem facient. Nullo equidem modo hæc fieri possent. Hinc Galen. nedum ex loci citatis, veritatem hanc nouit, sed & huius inæqualitatis causas aperuit. Etenim 4. de puls. caus. 12. inquit, in pneumonia hoc coniungere, ob sicce bilis permixtionem. Quod vero de pneumonia exempli loco adducit, id ipsum de omni pulmonum

C affectu vult intelligi. Quarto autem de presag. ex puls. 1. de lethargo verba faciens, cum diceret lethargi pulsus mollem esse, sed cum tensione, sane eundem insinuat, quem 4. de puls. caus. 13. vndosum dixerat, & dicrotum durum. Huius vero tensionis causam, aliam non existimo à Galen. proponi, quam spuriam inflammationem, ab eo tunc putredinis nomine explicatam. Cum enim paulo ante dixisset, ex humida cerebri intemperie molles fieri pulsus, deinde addidisset, accedente calore febrili, lethargum morbum oriri, pulsusque esse molles, & magnos; postea subdit, accedente putredine fieri molles cum tensione, & tunc pariter morbum dici lethargum. Quid quæso sibi vult hic loquendi modus? Cerebrum humidum facit pulsus molles, atque homines comatosos, accedente febre fit lethargus, pulsusque est mollis, & magnus: accedente vero putredine, morbus panter est lethargus, sed pulsus sunt molles, cum tensione. Nil aliud significare voluit Gal. quam duplicem esse lethargum, proprium & improprium: proprius est cum cerebri inflammatione, cuius etiam meminit 13. meth. 12. Improprius fit ex intemperie cum materia absque tumore. Ille ergo facit pulsus molles cum tensione, quia tumor ne dum cerebrum, sed membranas coarctat. Neque ex sola humida materia, sed & ex valde frigida, crassa, ac lenta, propterea indurante ortum ducit. Hic vero improprius ex sola humida materia, nec admodum frigida, soli que cerebro imbibita factus est, absque vlla tensione: Sic ergo pater, quomodo in lethargo sit vndosus cum tensione.

Ceterum non modo in lethargo, sed & in aliis plerisque cerebri affectibus, vt comate soporifero, atque aliis id genus, poterit vndosus esse, cum tensione: id quod aperte docet idem Gal. 4. de presag. 1. his verbis: Si confusa pituita, & mixta ex utroque illarum genere fuerit, simul mollior erit, & nonnihil intentior. De phrenitide res est clarissima, apud Gale. Etenim lib. de puls. ad Tyron. 12. inquit illam vndosi quandoque nonnihil habere. Et quarto. de puls. caus. 14. inquit lethargicus magnis, phreniticis minus fieri vndosos. At si non admittamus hanc inæqualem mollitiem, ac duritiem, qui quæso fieri poterit, vt in phrenitide fiat pulsus vndosus? In legitima, in qua membranz vel solæ, vel maxime afficiantur, nunquā fiet, ergo in illa tantum, in qua cerebri substantia magis est affecta, quam membranz. Talis est hecica vocata, cuius meminit Hipp. 1. prorrh. 33. in qua inquit Gale. cerebri substantiam, esse lanarum instar, humore persusam; quod doceret, tunc magis affici cerebrum, quam membranas, & plus esse materię humidæ, quam sicce, vt hinc modus colligatur, quo & in phrenitide, vndosi reperiri possint. Quod si ex hac particularum cerebri varietate, ex hac materię, & affectionis inæqualitate, sunt vndosi pulsus, quid quæso prohibebit, quominus in pulmonum affectibus. In quotidianis, in leucophlegmatia, & stomachicis quibusdam fieri possint? Res profecto est in pulmonum affectibus, & quotidiana spuria, omnibus certissima, atque Gal. verbis comprobata. De leucophlegmatia, & ventriculi affectibus aliqua videtur dubitatio. Etenim ad leucophlegmatiam quod attinet, cum Galen. 2. de presag.

Lethargi pul-
sus mollior
& intentior.

Quæ sit tem-
porum causa

Galenus eni
placuit.

de presag. ex puls. 9. tunc putet vndosum fore pulsus, cum desit viscerum scirrhus, ex scirrhus autem fieri duros, statim nostram hanc evertit sententiam, qua asserimus, ex scirrhus arteriam mollem comprimente, fieri in leucophlegmatia vndosus.

Hoc tamen non obstante, ego propositam adhuc tunc or opinionem, vndosus fieri in leucophlegmatia cum scirrhus, dummodo tamen scirrhus non sit magnus, nec multum tendat arterias, sed longe maius sit mollires, quam durities. Hanc veritatem colligo ex Galen. *2. de caus. puls. 1. in fine*, ubi scribit, fieri vndosus pulsus in hydrope, cum adhuc resistat contentio. Loquitur ibi de leucophlegmatia, quia nulla est hydrope, quæ vndosus habeat, præter leucophlegmatiam: Testis huius rei est Galen. *4. de caus. puls. 2. 4.* ubi de tympanitide, & ascite verba faciens, vtrique duros tribuit pulsus: si duros, ergo minime vndosus. Vndosi ergo leucophlegmatiam consequuntur, sed sic est, quod *2. de puls. caus. 1.* dicat hos fieri cum contentione, id est, impetu quodam in arteria molli, ergo aut non erunt vndosi, aut si erunt, simul cum mollietate aderit subtenasio. Vtramque probō sequelam, & primam quidem hoc modo: *Si arteria est mollis, & adhuc adeo facultatis morientis impetus, ergo tota simul elevatur*: probatur, quia & facultas id præstare, & nihil obistere potest, ergo non erit vndosus.

Video quid dixerit Gal. arteriam scilicet esse visque adeo mollem, ut flectatur virgæ tenellæ instar. Sed quis hoc crediderit, arteriam ex nimia mollietate exiendi, primo sub vno digito, mox subsistere, tum moveri sub alio, & sic deinceps? Dura profecto hæc sunt. Mihi ergo magis rationi consentaneum videtur affirmare, mollietati aliquid obistere, ut quamquam facultas sit satis valida, non possit tamen semel totum vas attollere; obstitit autem scirrhus, sed neque magnus, neque valde comprimens: Itaque vndosus pulsus in leucophlegmatia ex inæquali mollietate fiet.

Ad ventriculi vero affectum quod spectat, Galen. *4. de puls. caus. ult.* in ventriculi suffocatione, quandoque vndosus fieri cum tensione affirmavit. Quod tamen pariter dubio non vacat. Quæ enim est ratio, cur ex ventriculo nervo, membranoso. ac duro fiat vndosus pulsus? nonne iam lippis. & tonforibus constat, ventriculum ex le duos facere pulsus? profecto. Quomodo ergo Gale. quandoque illi vndosus concedit? Concedit vndosus cum tensione, in suffocatione, in suffocatione vero duo reperiri possunt, mollietas ex mareria valde humida membranæ implente, & durities ex propria membranæ naturæ: aut impletione, omnem enim impletionem sequitur tensio, tamen si humiditatem sequatur mollietas.

Ut ergo tandem hac in parte receptui eamamus, constat vndosum fieri ex inæquali arteriæ mollietate, inæqualem hanc mollietatem sequi locorum affectionum, & materię inæqualitatem: Locos tamen præcipuos, ex quibus fiunt, esse cerebrum ac palmones: Affectiones esse lethargos spurios, comata, phrenitides hæc cas, peripneumonias, suppurationes, asthma, quandoque febres quotidianas pariter spurias, hydro pes, leucophlegmatias, cum exiguo scirrhus, vel alia causa leviter indurante, ventriculi suffocationes ex materia humida, non admodum frigente, nec tumore faciente, vno verbo, omnes alios affectus, qui cum his comparari possint.

Vtrum autem ex his, vermiculosi caule, & affectus colligi valeant, summo opere ambigo: Nam ex vna parte, si Gale. respiciamus *2. de presag. 9.* videtur voluisse verumtensum eoidem sequi affectus, quos vndosus, distareque ab eo, sola facultatis imbecillitate; Ex alia tamen parte idem Gal. *3. de puls. caus. ult. in fine*, dum querit, cur immodicas evacuationes sequantur vndosi pulsus, febres autem magnas, formicantes comitentur, inquit hæc esse causam, quod vermiculosi semper sint tardi, ac rari; Si semper tardi, ac rari, ergo semper sine febre, non ergo sola facultatis imbecillitate ab vndosis distant, sed & affectionibus: vndosi enim non raro sunt eum febriles. Quid ergo dicendum? profecto aliæ sunt vndosi, aliæ vermiculosi cause, nec tamen falsa sunt, quæ Galen. *2. de presag. 9.* scripsit, vermiculosos scilicet ab vndosis sola distingui paruitate. ibi enim Galen. non affectiones, sed vtriusque pulsus formam tantum consideravit: Cum enim vterque sit inæqualis in vno ictu, sub variis digitis, vterque etiam sit mollis, hocque tantum distat ab invicem, quod vndosus sit maior, vermiculosus minor, iure Galen. ad hanc vnicam respiciens morus formam, dixit vermiculosos sola paruitate ab vndosis distare. At si de affectionibus, & causis vermiculosorum incidat sermo, sunt plane ab vndosis diversæ, de quibus ab òde discernimus in parte, quæ de facultatis pulsibus tantum pertrahitur. ibi enim eum Galen. docui-

mus,

*Vndosi pul-
sationes
sunt in
omnibus*

*Alia sunt
causæ
vermiculosi
pulsus*

Amus, vermiculosos fieri ex immo diſci cuiuſcunq; generis excretionibus, idcirco de his hoc loco plura non diſſeremus, ſed tantum rationem quandam proponemus, qua variis vndosorum affectionibus propoſitz, inter ſe diſtingui poſſint.

CAPVT LXXXVI.

Quomodo propoſita vndosorum affectiones inter ſe diſtinguantur.

Vndosorum pulſum quidam ſiunt, vt diximus, in febribus, alij vero circa febres. Qui in febribus ſiunt, præter cætera ex quibus à reliquis diſtinguantur hoc habent poſitiſſimum, quod vndas faciant altiorem. Vt ſicuti in duris pulſibus, vibrati vſum magis autem eſſe docent, quam non vibrati, ita & in molliſibus, vel æqualiter, vel inæqualiter, qui altiorem faciunt vndas, ſunt febriles, qui vero humiliorem, minime.

Neque vero dicat quiſpiam, poſſe febrem ad eſſe, vndas tamen humiles fieri ex facultatis imbecillitate. Reſpondeo enim nullum vndosum facultatem habere vſque adeo imbecillam, vt ſi vſus impellat, vndas altiorem efficere non poſſit. Hoc igitur modo diſtinguitur vndosus febrilis, à non febrili.

Sed quia inter febriles, quidam ſequuntur lethargos, ac peripneumonias, alij vero febres putridas abſque inflammatione; priores habent comites etiam dicrotos duros, reliqui minime. Aderunt præterea propria ac pathognomonica cuiuſque inflammationis ſigna, per quæ nedom ab affectionibus abſque inflammatione, ſed etiam inter ſe diſtingui poſſunt. Et quanquam reliqua hoc loci inſerere noliſſim, illud tamen quod pulſus conſiderat, ſilite non poſſum, lethargicorum nempe pulſus fore tardiorem, minus crebos, minusque inæquales, quam pneumonicorum; idcirco potius intermitentes, quam intercurrentes: eo quod dicebat, Gale. 4. de cauſ. pulſ. 13. longius diſtet cerebrum à corde, quam pulmo, idcirco ipſum minus poſſe à corde caleſcere, quam pulmo. Quod vero ibidẽ ſcribit Gal, magis lethalem eſſe lethargum pneumonia, falſum eſt: niſi recte intelligatur. Et enim multo citius, ac frequentius interficit peripneumonia, quam lethargus. Hoc igitur tantum voluit Galen, lethargicorum faciem eſſe magis cadaueroſam, quam pneumonicorum, vt ſonat vox Græca, *νεκρὸς ὡς νεκρός*, id eſt cadaueri ſimilior. Sic ergo diſtinguuntur affectus iſti & inter ſe, & ab aliis non febrilibus.

D Quia veto tam febriliſſimum, quam non febriliſſimum quorſdam diximus ex ſimpliſſi affectu fieri, proinde ex ſola mollitie, alios vero ex compoſitis, idcirco ſic diſtinguentur inter ſe, quod vbi ſola aſſit mollities, nulla repertiatur breuitas, nullus dicrotus durus, vbi vero aſſit inæqualitas mollitiei, erit pulſus cum tenſione, & quandoque dicrotus cum vndoso mixtus. Haftenus de vndosis, ac vermiculoſis.

CAPVT LXXXVII.

De pulſu ſerrati cauſis & affectionibus.

Serratus, vel ſerrinus pulſus, quem inæqualem diximus eſſe in vnicò iſtu, ſed ſub variis digitis, idque alternatim, habet quaſdam cauſas & affectiones, vt datus eſt, alias vero

E vt inæqualis.

Quatenus durus, fit ex impletione membranofa, aut neruoſi corporis, à materia calida inflammationem faciente: Idcirco in omnibus propoſitarum partium inflammationibus reperitur: quatenus autem inæqualis eſt ad modum ſerræ, aut eandẽ inflammationem magnitudinem, aut indurationem ſequitur.

Quod partium propoſitarum inflammationes ſequatur, teſtis eſt Galen. in lib. iſto 1. ſagægiæ cap. xi. Et 4. de præſag. ex pulſ. 9. Etenim in lib. iſagægiæ, inquit, inflammationem omnem habere communem pulſum veluti ſerrantem; & 4. de præſag. 9. ſcribit, meningi pulſus eſſe coldem cum pulſibus ſepti, membranæ coſtas ſuecingentis. At vero pulſus pleuræ inflammatione ſerrinus eſſe, vſque adco apud Galenum apertum, & ab omnibus receptum eſt, vt ex ſtimant pletique Medici, nullius alterius inflammationis. quam pleuritidis proprium eſſe ſignum; quod quidem & falſum eſt, & Galeno apertiſſime contrarium, qui nec ſoli nec omni pleuritidi pulſum hunc concedit. Non ſoli, vt iam diximus nec omni, non enim parua, & incipienti, ſed magnæ duntaxat, ac durioti: Quod ſi incipienti, atque non duræ illum tribuit, apprimè inſenſibilem, & valde obſcurum eſſe vult. Hinc lib. de pulſ. ad Tyron. 11. de natiuitate inflammatione verba faciens, non dicit illam pul-

*ſerrina ſua
qualitas
ſolius, nec
omni pleuri-
tidi eſſe ſi-
gnum.*

M ſum

sum habere serratum, sed vehementem, celeritorem, ac crebriorem. Et quamuis paulo post A dicat, in æqualitatem, quæ serrantis imaginem præbet, imprimis pleuritidos esse signum, non tamen sequitur vniuersi cuiusque esse signum, & quocunque tempore, sed factæ tantum, magnæ, atque ad duritiem tendentis. Hoc docent Gal. verba, quibus scribit, mollē pleuritidem quæ ad resolutionem tendat, exillem habere in æqualitatem serrinam. Tunc sic arguo: facta pleuritis (et si mollis & non maturanda) remissum habet serrinum pulsum, ergo siem, & minor nullum habebit serrinum pulsum. Id ipsum Galen. verba confirmant 4. de puls. caus. 2. ubi scribit serrati pulsus occurrit speciem, euidētius duris pulsibus consecuturam; Duritiem vero dicebat maiorem, minoremue futuram, prout inflammatio maior, aut minor, ex hoc aut illo siccō vel humido humore fuerit producta. Ex dictis itaque constat, serratum pulsum nedum in pleuritide, sed aliis quoque sepi, & meningum inflammationibus reperiri, non tamen in paruis, ac sientibus, sed in magnis, factis, atque duris manifestissimum; in mollibus vero, paruis, & factis, apprimē obscurum. Ex quibus statim quoque patet affectio, quam locus affectus: Affectio enim est inflammatio; locus autem potest esse in genere omnis membrana, netuus, tendo; In specie vero, omnium maxime, pleura, septum, atque meninges.

Serrina in æqualitatem factam, & magnam arguit pleuritidem.

Serrina in æqualitatem causa.

Potest quoque serrinæ in æqualitatis causa colligi: Etenim si serrinus pulsum, maximum omnium in magna, atque dura inflammatione reperitur, in siente vero atque parua nullo modo; in facta sed molli, obscure admodum, sequitur necessario inflammationis magnitudinem atque duritiem esse serrinæ in æqualitatis causas.

Quod si quis modum querat; respondeo, modum esse hunc, quod scilicet inflammationis magnitudo, aut durities, nedum sint causa æqualis cuiusdam tensionis in arteria, sed & compressionis in aliqua illius parte: At vero compressa arteriæ pars minus eleuatur, non compressa magis; hinc sub quibusdam digitis durior, ac vibratus, sub aliis minus durus, ac minime vibratus apparebit; Sub quibusdam vero digitis, vibratū ex maiori duritie apparere pulsum, docent Gal. verba quæ in lib. 1. de feb. 1. hoc ipsum quod nuper scribit: *Habet etiam vibrationis aliquid pulsus iste, ac celer quidem, & crebre est, non perpetuo tamen magnus.* Ex his verbis patet serratum esse vibratū. Porro de crisi, 10. hoc ipsum quod nuper docuimus colligi potest, serrinæ in æqualitatis causam esse duræ arteriæ compressionem. Etenim ibi inquit serratum ex membrana indurata, tendi arteriarum fibras, fierique durum pulsum, ex inflammatione autem vas ipsum comprimente, partem arteriæ effici humiliorem, & non vibrari, partem vero fieri altiorē, ac vibrari, huncque serratum reddi. Hactenus de serrato, venio ad conuulsium.

CAPVT LXXXIIX.

De compressu conuulsui pulsu causis.

De pulsibus, qui ex facta prodeunt conuulsione, egimus hactenus in parte, quæ de pulsibus instrumenti pertractauit. Nunc autem de illis peragemus, qui conuulsione consequuntur sientem. Horum causæ, non sunt alie quā illæ, quæ neruorū conuulsione pariunt: quanquam enim nec cor sit neruorum principium, ut sensus Arist. neque nerui sint attectis continui, ut sensus Reusnerus, & alii cum eo; attamen per fibras ex neruis in arterias insertas, tanta est neruorum cū arteriis societas, vt conuulsus morus, quanquā neruorum propius, in arteriis quoque sentiat. Imo vero dicebat Galen. 2. de caus. puls. 12. in hoc affectu, sentiri primo arteriæ tensionem in vtroque termino, mox vero conuulsionem superuenire.

Cor non est neruorum principium, nec nerui arteriis continui.

Pulsus conuulsus vel est neruorum, vel vniuersi arteriarum proprius.

Hæc cum ita sint, ad conuulsionis causas confugiemus, vt conuulsui pulsu causas intelligamus. Primum autem monendus est lector, conuulsium pulsum vel esse vniuersalem, vel vnius tantum arteriæ proprium.

Si de vniuersali fiat sermo, locus affectus est vel cerebrum, vel spinalis medullæ initium. Causa autem est vnicæ, nempe facultatis irritamentum. Refrigeratio enim siccitas, impletio, in vniuersali spatio siente locum non habent, quidquid tota fere Medicorum scola cum Hippo. & Gal. in oppositum sentiat. Nos alias de hac re satis abunde disputauimus, neque ad præsentem de pulsibus tractationem videtur mihi hæc speculatio admodum accommodata, idcirco ab ea abstinere, & causas facultatē irritantes recensere.

Sugg

A Sunt vero isti in cerebro, aut per essentiam, aut per consensum. Per essentiam quidem, Epilepsie, Phrenitides, ac coma vigil. Quæ vero per consensum afficiunt, in duas subdividuntur classes, in illas scilicet, quæ affectum, & in alias, quæ causam cerebro communicant.

Causa facultatum cerebri instant.

Affectum cerebro conferunt omnes nervosæ partes determinatæ punctæ, vel alio quovis modo dolentes, & convulsæ.

Causam autem & hæc, & aliæ, quotquot in corpore sunt, ventriculus scilicet, intestina, iecur, lien, vterus, vesica, renes, vñ o verbo, omnes corporis partes.

Partes consensum conferunt.

Causa vero communicata, vel est qualitas, vel materia.

B Qualitas quidem, vel occulta, vel manifesta: Et manifesta, vel acris, vel falsa, vel acida, vel amara, vel putrida, vel alia similis. Materia vero erit vel vaporosa, vel flatulenta, vel corporulenta, biliosa potissimum, ac melancholica.

Quod si spinalis medullæ principium convulsionem patiat, tunc pariter causæ erunt per essentiam, & consensum, sed nedum à locis iam propositis, imo vero etiam à cerebro, vñ hanc ob causam phrenitis, coma vigil, melancholia, aliæque id genus affectus, à convulsionem quandoque totius corporis desinant, capite excepto.

Pulsus convulsivus est cum febre, & extra febrem.

C His sic declaratis, parèt iam convulsivus pulvis causæ, & affectus; Non enim à prædictis vñlo differunt modo. Idcirco statim colligimus, pulsus convulsivum esse cum febre, & extra febrem: cum inflammatione, & circa inflammationem: ex cerebro ac spinali medulla per essentiam, vel per consensum affectis. Parent quincram causæ, & affectiones sane multæ ac varæ, quas partim pulsibus quidem: Nam omnium febricitantium convulsorum pulsus, vibrationem obtinebunt, reliqui minime.

Omnium febricitantium convulsorum pulsus sunt etiam convulsivi.

Ad hæc inflammationum convulsivus pulsus, nedum vibrari, sed & apprimè inæquales erunt, caprizzantes scilicet, dicroti, serrati, inintermittentes, intercurrentes, vel alio quocunque modo inæquales, reliqui vero vel non erunt vibrati (vt cum febris non adit), vel non erunt vibrati: quæ adeo inæquales, si desit inflammatio, ac tumor. De pathognomonicis cuiusque affectus signis nil dico, quia nemo est, qui ex aliis locis hæc petere non possit. Vñ ergo ad determinatum spasmus sientem. Qui sit irritata parte illa determinata nervosa, ac tendinosa, ab iisdemmet causis, quas iam recensuimus. Idcirco nihilo differat à priorè, quam quod ille in omnibus arteriis, hic vero in determinatis tantum apparebit.

Spasmus determinati causæ.

CAPVT LXXXIX.

De tremulo pulvis causis.

Tremulum pulsum, inquit Gal. 2. de præag. ex puls. 12. ex triplici fieri causâ, facultate nō omnino invalida, artenæ mollior, & corporis gracilitate.

Facultatem non esse invalidam, ex eo probat, quod in valde languida, magna non possit adesse dissentio, qualis pro deprehendendo pulsu tremulo requiritur. Quomodo enim elevari, ac deprimi arteriam novceris, si magna non sit illius dilatio? ergo facultas

E non omnino languet. Nec tamen est valida. Etenim nullibi sit tremor, quin corpus quod monetur, sit grave facultati mouenti; At si cor, & arteriæ facultati graues euadunt, ergo facultas non est valida. Quod si non valet, quomodo ergo magnam facit dissentionem?

Nequaquam esse debet facultatem

Gal. hanc videns instantiam, alias subiungit causas, propter quas cum facultate etiam nō valida possit fieri pulsus tremulus; vñ est arteriæ mollior, altera vero corporis gracilitas.

Et quidem ex mollior vas multum extendi, iam sæpius docuimus, ad hoc vero magis dilatarî, si corpus sit gracile, vt nullibi comprimatur, pariter explicatum est: Idcirco tremuli pulsus satis probabiles inueniunt videntur apud Galen. causæ, quæ tamen aliquo mihi non videntur carere dubio.

Gal. sententia est inordinata.

F Primum quidem mollem esse arteriam, ac gravaram, simul stare non posse videntur. Etenim vbi gravatur, durior etiam tedditur: Sed hoc concedamus, gravitatem esse quo ad vires, non quo ad molem, vel pondus; vltèrius progrediamur.

Si corpus est gracile, ergo arteria sicciore esse debet: At ex siccitate sit dura; quomodo ergo dicit Gal. esse mollem.

Præterea ex eodem Gale. 4. de puls. caus. 14. in phreneticis, pulsus subterremere videtur; at phreneticis duri sunt pulsus, quomodo ergo inquit Galen. molles esse? Hæc, cum mihi

M 2 aliquod

aliquod intulerint dubium, impulerunt quoque ad tremulum pulsam exactius declarandum, quod statim lubens facio.

*Quomodo
tremulus &
palpitans
sui sui differ-
rent.
Tremulus
pulsam grande
habens mo-
mentum.*

Primum autem illud non ignorandum, aliud esse pulsam tremulam, aliud vero palpitantem. Nam tremulus est ille, cuius vnica diffentio tremore afficitur, palpitans autem, cuius plures diffentiones sunt maiores, celeriores, crebriores atque inæquales. Itaque tremulus tremorem ostendit in vnico ictu, ac sub vnico etiam digito; palpitans vero in pluribus tantum ictibus. Tremulus enim dicitur, eo quod illi tremori sit similis, qui est facultatis animalis symptoma: itaque sicuti in illo, dum pars per electionem mouetur, fit sum, ac deorsum vicissim agitur: sic & in tremore, dum cor facit diffentionem in eo ipso diffentionis motu, sursum, ac deorsum moueri videtur, motu tamè apprimè paruo, qui cū in arteriis quoque sentitur, & ratione motus, & ratione causæ sit à quib. fit, vere tremulus pulsus dici potest. Ratione motus quidem: Nam, vt diximus, cor sursum, ac deorsum videtur in ipsa diffentione moueri. Ratione vero causarum, quia reuera motus hic tremulus nunquam fit, quin cor facultati mouenti redditum sit grauius. Vt sicuti fit tremor in functione voluntaria ex facultate debili, & grauitate membri: ita fiat tremor functionis pulsificæ: à facultate debili, & grauitate cordis. Hunc fateor me experientia inuenisse, idcirco ad causarum inquisitionem libentius accessisse. Sunt autem causæ istæ, illæ quæ vel facultatem destrunt tantum, vel simul quoque cor efficiunt grauius. Destruunt facultatem tantum omnes magnæ cordis intemperantiæ, & vlcera quædam: efficiunt vero etiam grauius, abscessus, calli, calculi, scirrhi, caro adnata aliaque id genus, de quibus alias mentionem feci; quæ tamen nõ debent esse effatu digna, alioquin facultas è motu omnino prohiberent. Hæc igitur pulsus vere tremuli constituent. In quo vt inquit Auicenna videtur facultas tentare alicuius noxi expulsiõnem, cum tamè id minime explere possit. Ex quo patet, ad hunc edendum, non opus esse; quemadmodum Gal. voluit, arteriæ mollitiæ, nec robore facultatis, quia in parua etiam diffentione, poterit motus hic tremulus deprehendi. Etenim valde parua est illa eleuatio, aut depressio, quæ in tremuli pulsus diffentionem incidit. Et hætenus de Tremulo.

*Quomodo fit
et tremulus
arteriarum
motus.*

Palpitans autem pulsus fit ex palpitatione vel cordis, & arteriarum, vel artetiarum tantum: idque dupliciter, vel ex statu, aut vapore partem eleuante ac deprimente; aut ex causa expultrice irritante. Et siquidem fiat priore modo, aut status eleuat membranam pericardii, vel cordis, sicque arteriarum pulsus nihil à naturali statu mutatur; aut eleuat cordis ventriculos, arteriarum tunicas, & hoc modo maior, celerior, atque inæqualis euadit. Maior, quia status ille aut vapor plus distendit cor, ac tunicas quam expediat; celerior etiam, quia facultati naturaliter distendenti, accedit quoque status impellens: Inæqualis demum, quia status iste naturæ leges non seruat, nec tunc tantum eleuationem facit, cum facultas distendit, aut depressionem, cum contrahit, sed potius è contra tunc plerumque eleuat cum sit contractio, aut deprimat, cum sit diffensio; hinc maxima sequitur in pulsibus inæqualitas creberrimæ, intermissionis, interruptionis, aliaue cõsimilis. Porro hæc omnes, imo & longe maiores sunt, ex facultatis irritamento. Ob quod fieri dicrotos, & interruptos antea ostendimus; Nunc vero, cum de palpitante pulsu ex professo agimus, illud adiungimus, in palpitatione hæc ex irritamento expultricis facta, aliquando cordis motum vsque adeo vehementem esse redditum, vt etiam costas loco mouisse, ac confregisse, an: hoc sit Fernel. Quo fit vt ad cordis proportionem, arteriæ quoque omnes mirandum in modum distendantur, adiuncta quoque insigni quadam inæqualitate. Ex quo statim colligitur, non esse motum hunc, veram, ac propriam illam naturalem palpitationem, quæ nihil aliud est, quam eleuatio ac depressio, sed esse motum quendam sursum, ac deorsum: Etenim in eleuatione ac depressione, pars priore loco immutata, maius tantum vel minus occupat spatium: in motu autem sursum, ac deorsum, tota pars priorem mutat locum, dum sursum tendit, & rursus descendit: Cum ergo cor tam violenter moueatur motu, vt etiam costas frangat, sane mutat priorem locum, non autem eleuatur tantum ac deprimitur.

Quid sit prius & naturalis palpitatio.

Accedit, quod cum ex omni cordis dilatatione, & constrictione etiam naturali, cor locum mutet, sequitur necessario etiam in motu palpitationis debere sursum, ac deorsum, sed præter naturam moueri.

Verum tunc statim instabit quisquam, ex hoc nostro fundamento sequi, cordis palpitacionem non esse naturalem, sed voluntariam: Etenim in naturali palpitacione pars,

A vt antea diximus, peiorem non murat locum, sed dentat ac eleuatur, ac deprimitur: In palpitatione vero hae cordis, dicimus fieri motum sursum, ac deorsum, ergo non erit hae palpitatione naturalis, sed motus animalis: Et enim talis constituitur, videbitur sane posse dici tremor; Nam tremor inter functionis animalis symptomata est motus sursum, ac deorsum: Hoc tamen est contra nos, qui profiteamur, nunc de ea cordis palpitatione pertractare, quae sit motus ab eo diuersus, quae sub tremoris nomine, antea explicauimus.

Pro hisce dubiis soluendis, primum quidem eoneedo, cordis palpitationem tunc tantum esse motum naturalem, cum sit ex flatu pericardio, in membranaq; cordis & arteriarum incluso. Vbi autem in ventriculis cordis reperitur, non amplius naturalem esse,

B sed aliam facere palpitationem eenseo, quae vere animalis non est, eum animali tamen maximam habet similitudinem. Neque vero, vt plerique censent, tremorem dicendum esse eor, sed palpitationem. Etenim tremorem antea docuimus fieri ex facultate debili, & grauitate membri: hunc vero motum, qui animalem simulatur, dicimus fieri quandoque ex solo flatu, idcirco palpitationem diet affirmamus.

Sed quomodo dicitur quipiam, hae duo stare possunt, vt motus iste sit similis alicui prauo motui functionis animalis, & tamen sit palpitatio ex flatu? Nonne aperte docuit Galen. 2. de caus. sympt. 2. palpitationem ex flatu nullo modo ad instrumenta facultatis animalis spectare? Si ergo nullus datur prauus motus in functione animali, qui dicatur palpitatio, neque dabitur motus hic in corde, qui ad similitudinem illius dicatur palpitatio; ergo cordis palpitatio ex flatu nil aliud erit, quam eleuatio ac depressio praeter naturam, non autem motus sursum ac deorsum. Profecto si nulla palpitatio esset symptoma facultatis animalis, neque vlla talis per similitudinem dari posset in corde: sed sic est,

C quod datur palpitatio in functione animali, ergo dabitur etiam per similitudinem in corde.

Quod detur palpitatio in functione animali, patet ex Galen. 2. de caus. sympt. 2. c. lib. Palpitatio de palp. cap. 5. qui palpitationem ex flatu factam vult esse duplicem, vnam quidem ex eo, membranarum tantum incluso; alteram ex eodem, corpus aliquod musculosum, vel saltem musculo proportionatum implente: Prima facit eleuationem, ac depressionem tantum: Secunda mouet sursum ac deorsum. Hinc prior est motus naturalis, secunda vero animalis.

D Hoc stante, deo palpitationem cordis, in qua cor sursum, & deorsum mouetur, esse similem motui animali, non autem naturali: Cum enim eor sit organum quoddam ex carne constitutum, quae musculo proportionem respondet, vbi status hanc impleat partem, ac distendat, statim sursum, ac deorsum mouebit, sicque palpitationem efficiet illi similem, quae fit ex flatu musculos mouente, idcirco poterit omnes iam propositas pulsuum inaequalitates efficere.

Ex hae vero proposita distinctione, patet solutio cuiusdam apparentis in Gal. contradictionis, quam alii plurimi Excellentissimi viri soluere nesciuerunt. Contradictio est talis: Gal. lib. de sympt. diff. 3. proficitur se enumeratum symptomata facultatis animalis

E motricis deprauatae, & cum aliqua iam proposuisset, vt conuulsionem, & alia, inter haec quoque palpitationem recenset; Idem veto 2. de sympt. caus. 2. apertissime docet, palpitationem esse motum quandam naturalem, & instrumentis motui voluntario dicatis minime conuenire. Quomodo ergo erit symptoma facultatis animalis motricis, si deorum instrumenta non spectet? Quid alii dicant, non referam, vera solutio ex dictis colligitur: duplicem scilicet esse palpitationem, vnam partis similis membranosae; alteram organicae, musculosae, vel musculo proportionatae: Prior est motus facultatis tantum naturalis: Secunda est prauus motus facultatis animalis motricis. Iure ergo lib. de sympt. diff. inter reliquos prauos motus enumeratur; iure etiam, quandoque ab his excluditur: Sed haec obiter.

F Ad rem igitur nostram redeuntes, dicamus pulsus fieri palpitationes, id est magnos, celeres, vehementes, inaequales tamen, ex eordis arteriarumque palpitatione, ex flatu distendente, vel in ventriculis depressionem faciente; quinetiam ex flatu vel vapore cordis expultricem irritante: De qua re, quia plurima diximus in capite de dirotis non duris, idcirco hoc in loco siletio hae praeteribimus, & ad illam locum lectorem dimittimus: Huic itaque capitulum imponentes, ad strepentem pulsuum calamum conuertamus.

De strepente pulſu cauſis, & aliorum ſententia.

STREPENTEM pulſum eo modo, quo à reliquis proponitur, eſſe ſomnium potius, quam quid reale, nunc, dum illius cauſas exprimimus, facile demonſtrabimus. In his proponendis, qui hunc amplectuntur, inter ſe non protuſus conuenire videntur. Etenim Iolephus Struthius hæc habet: *Strepens pulſus ſemper durus eſt, inanitionem demonſtrat, & vacua vaſa; Hunc ſapius deprehendimus in magnis ſenium febribus: & in qui totius corporis ſpaſmo contrahantur* in macilentis corporibus, quæ renuſſione indigent. Ex his patet ſtrepentem pulſum non poſſe validam habere facultatem: etenim cum inanitione, vaſiſque vacuis, in ætate ſenili, in macilentis corporibus, facultas valere non poteſt. Ex alia ramen parte, Fuchſius de ſtrepente hæc ſcribit: *Strepentis pulſus cauſa, eſt durities arteriarum, vacuitas eiuſ, & facultas valida. Cauſa vero eſt ſpatium, in quo mouetur arteria, ære, non humore reſertum.* Hæc Fuchſius, cui ad vnguem ſubiicitur Guinterius Andemacus: Sicuti Struthio Ludouicus Mercatus, qui hoc tantum addit, ſtrepentem ad compoſitas pertinere inæqualitates, eo quod conſtet ex inæquali duritie, & inæquali vehementia, quæ magis viget in vna parte, quam in alia. Hos auctores hæc in re neque inter ſe conuenire, neque ſibiipſis conſentire, nemo non videt. Non conueniunt primum Fuchſ. & Andernacus, cum Struthio, poſteaquam hic nec validæ facultatis meminit, nec meminiffe potuit, propter iam dictas cauſas; contra vero illam apprimè neceſſariam, alii exiſtimarunt.

Neque vero ſibiipſis conſentiunt; Etenim ſi vaeuæ ſunt arteriæ, nemini non conſtat inanitis vaſis facultatem conſidere, ac vermiculofos edere pulſus, quomodo ergo ſtrepentes?

Sed quæſo intimius rem penetremus. Tres à Fuchſio ponuntur contentiæ ſtrepentis pulſus cauſæ, quæ tamen ex propria natura nūquam talem efficiunt pulſum. Nam ex valida facultate, vſu aucto, & inſtrumento duro, fit vibratus, & cum ſenſu acceſſerit, conuulſiuus, non autem ſtrepens.

Quod ſi dixerimus, ſtrepentis cauſam eſſe locum vacuum: primum quidem nõ deberent hi, ad hanc conſurgere cauſam. Etenim ipſi cum Gal. vacuum reliquunt pulſum, ergo ſtrepentem ex vacuitate emergentem admittete non poſſunt.

Addo hanc vacuitatem ab illis duplicem conſtitui, vnã intra, aliam extra vaſa, in ſpatio ſcilicet inani, quod eſt inter corpus arteriæ, & carnem, atque eutem. Sed offendaſi neutram horum poſſe ſtrepentem efficere, ergo nullam.

Quod non prior, vaſorum ſcilicet, probò: Dicunt enim tunc fieri in arteriis ſtreptum, cum arteriæ plus abundant ſpiritu, quam ſanguine, tunc enim facultatem validam quantentem ſpiritum, ſtreptum excitare. At ſi res ita ſe habeat, omnis pulſus eſſet ſtrepens, qui a nemo non nouit, arterias ſemper plus habere ſpiritus, quam ſanguinis, vt iure antiquitus dubitatum ſit, vtrum aliquid ſanguinis continerent, vel non. Ergo nulla eſt ratio, cur hæc facultas ſpiritum vel ærem in cauitate exiſtentem coneuſiat, vel eſcutiens, ſtreptum faciat, & talem, qui digitis ſentiat.

Addo facultatem eſſe in mēbranis, non in cauitate; at ſpiritus hic, quem vult Fuchſius concuti, eſt in cauitate, ergo non poterit à membranarum facultate conquaſſari.

Sed neque ſecundo modo poterit fieri ſtrepens pulſus: Etenim omnis arteria naturaliter conſtituta, mouetur in loco vacuo. Nam ſi hoc ſpatium non obtinuiſſet, diſtendi ad latera nonquam potuiſſet. Si ergo hanc ob cauſam fieret pulſus ſtrepens, ergo omnis pulſus, qui fiat in arteria minime ad latera compreſſa, ſed in loco amplo agitata, eſſet ſtrepens, quod tamen eſt contra Gale. & experientiam, quæ docet, arteriam in amplo loco agitaram, latum ſacere pulſum, non ſtrepentem.

Denique vt huius pulſus vanitas appareat, queramus affectum, in quo reperitur. Inquit Struthius in magnis ſenium febribus. Figentum eſt Struthii, quo perſuaderet dari hunc pulſum, qui animo concepit, cauſas à ſe propoſitas, facilius in his affectibus, quam in aliis reperiri poſſe, eo quod in ætate ſenili arteriæ ſint magis vacuæ ac duriores, accedente autem febre, vſus fit auctus.

Sed diſpercam, ſi nec ille, nec Mercatus, qui ab eo verba mutuatur, vnquam in ſenili febribus, vel aliis caſibus ſimilibus, hunc ſenſerint pulſum. Idcirco non ſibiipſis, vt dixi-

*Aliorum de
ſtrepente pul
ſu cauſis o-
piniones ex-
ponit, & rati-
onatur.*

*Arterias ſem-
per plus ha-
bere ſpiritus,
quam ſan-
guinem.*

Amus, constant; Sed in emaciatis illum reperiri inquirunt, in quibus nec facultas valet, nec vñs necessario est auctus. Strepens ergo pulsus sic explicatus dimittatur, & non ulla interm de hac re sententia candido aliorum iudicio subiciatur.

CAPVT XCI.

De pulsus strepentis causis ex propria sententia.

DVm iam opus hoc sub prælogeretur, nec aliter de strepente pulsu censendum esse existimarem, quam proximo hoc capite docuissim: Ecce strepens pulsus mihi occurrit, qui ad causarum cõtemplationem me impulit. Formam illius describam, mox & causas. Ager in quo talem inveni pulsum, erat perillustis, & Reuerendus Canonicus Ioann. Belloius, philosophiæ, atque S. Theologiæ Doctor eximius, & Morali philosophiæ in almo hoc Patavino Gymnasio publicus, omnibusque numeris absolutus Professor, nemini propter morum suavitatem, aliaque præclaras animi dotes ignotus, & nulli non acceptissimus. Hic simplici tertiana laborans, semel tantum talem habuit pulsum: hora quadam pomeridiana, in qua accessio expectabatur, quæ tamen non superuenit, etiam si à priori nondum esset immunis. Pulsus iste sic procedebat: dum distendcretur arteria, nihil strepitus sentiebatur, sed duntaxat interualli, seu contractiõis tempore, motus quidam sub digitis percipiebatur, qualis sentitur, cum quis ossa eruris, aut brachii fracta simul cõponit, & partes altiores cum depressis accommodat. Sicut enim in hoc motu, asperam quandam depressionem secundum ossis fracti longitudinem sentiunt digiti, ita in hoc pulsu per interualla quadam occurrebat motus iste, cuius sonum Auditores mei præ se sequentes, se auribus quoque percipere arbitrabantur, quod tamen ego à ratione alienum existimaui. Dicebam enim nullam esse causam, cur, si auribus sentiretur, dum iugitur arteria, non etiam sentiantur absque arteriæ tactu: At citra tactum non sentiebatur, ergo neque in tactu. Sed cum reuera mihi quoque hoc ipsum in animum venisset, quod & studiosos concepissem dixi, auditu scilicet sonum sentiri, ratio tamen id non concederet, idcirco rem sic processisse reor: vt cum pulsus ille præ se ferret sub digitis motum, illi similem, qui in ligno sicco, osse, vel simili corpore percipitur, dum frangitur, mens sitim ex obiecto sensato, concipiens non sensatum, quod hæc fractionem sequi consuevit, sonum scilicet, vel strepitum, siueque nobis persuaderet, auribus quoque sentiri sonum. Sed quicquid sit de sono, auditus obiecto, certum est, morum illum in huius nobilissimi patientis arteria fuisse inuentum, ex quo sonus emitti consuevit, vt iure strepens à me sit vocatus. Cuius causam existimo fuisse validam facultatem excrettricem naturalem, non autem pulificam, quæ dum crassum quendam statum, vel vaporem simul cum fulgine mixtum, atteriatum membranarum inclusum expellere veller, nec facile propter atteriæ durtitatem id præstare posset, hinc asperam illam ederet motionem. Hunc vero motum non fuisse distendens facultatis opus, sed expultricis, ex eo competissimum euadit, quod non distentionis, sed interualli tempore adesset. Fuisse vero facultatis expellentis opus, non tamen pulificæ, ex eo etiam constat, quod pulsifica dum expellit, contrahit, & arteriam à digitis recedere facit: hæc vero, motus distentionem æmulabatur, quia lætus ad digitos rãgentes accedebat, iure ergo diximus ad facultatem expellentem naturalem spectare, cuius officium est, noxios humores expellere, vt ex eodem Gale. colligitur 4. de prasag. ex puls. 12. Cuius sane loci veritate, nisi fallor, maxime hoc ipsum comprobatur exemplum; quia cum hic pulsus tunc apparuerit, quando a natura sic cū morbo pugnaui, vt etiam superior extiterit, sane consistere oportet, eodem die facultatem expultricem de noxis expellendis fuisse sollicitam, idcirco hunc crassum vaporem, vel statum, duris membranarum inclusum detrudere voluisse, qui tamen cum antequam expelletur, per illas inæqualiter percreparet, motum illum strepentem vocatum, excitauit.

Materiam vero, quam natura propellere tentabat, fuisse vaporem, non humorem, ex eo constat, quod breui admodum recesset hic pulsus. Ita sentio de hoc strepente, quem ex eo consistit in aliis quoque affectibus reperiri posse, in quibus natura ab aliqua recente sit irritata. Sic enim scribit Gal. 4. de caus. puls. 17. in conuulsuo pulsu strepitum quendam in arteria sentiri, non ob aliam, vt puto causam, quam quod in omni conuulsione sentit, sentiri irratatur facultas sentiens, & expultrix neruorum, ita quoque possit eiusdem vaporis, aut status irritantis portio, in arteriarum membranarum includi, vt strepentem

Causa strepitus pulsus.

pulsu eo efficiat modo, quem iam exposui, De strepente, & de omni inæquali vniuersi-
 A ctus, hæc satis. Venio modo ad collectius inæqualitates.

CAPVT XCII.

De intermittentiū compositione causis.

*quæ causæ
si quæ
pulsus inter-
mittit.*

Intermittentem pulsus (quatenus intermitte) vnicam aliquando diximus sequi cau-
 sam, nempe facultatem languidam. Nunc vero demonstrabimus quandoque vnicam
 sequi ex parte instrumenti; aliquando duas, nempe facultatem & instrumenta, nonnun-
 quam tres, eum vsus quoque vel auctus, vel diminutus accedat.

Instrumenta tantum intermittentes efficere, docet ratio, & Galen. Ratio quidem;
 Etenim sicuti ex arteria moderate coarctata ac compressa, fit paruus pulsus, ita ex aucta
 coarctatione potest fieri intermittens. Si enim nullus relinquitur vacuum locus, in quo
 vas dilaretur, sane nec vllus in ea parte relinquitur motus, quod nil aliud est, quam inter-
 mittere. At vero non coarctatur arteria, nisi ex morbo instrumentario, ergo sola instru-
 menta quandoque intermittentem efficere poterunt. Hoc quoque docet Gale. 2. de caus.
 puls. 2. his verbis: *Instrumentorum autem vitia in hunc modum: vbi circumscissæ arteriæ regiones,
 quæ ad hoc creata sunt, ut eam distensam accipiant, aliud corpus infuderit, non possunt per illud coar-
 ctata arteria satis distendi.*

Et hæcenus patet, quomodo instrumenta coarctata intermissionem facere possint,
 etiam si facultas, atque vsus moderate se habeant.

Quod si præter instrumenti vitium facultas langueat, multo facilius succedet inter-
 missio, eo quod propter imbecillitatem, coarctans causa superari nõ possit. Et si vsus quo-
 que sit imminutus, augebitur magis in emissionis occasio, quia nihil erit, quod facultate
 tem excitet ad magnam, aut vehementem efficiendam distentionem, qualis requiritur,
 pro superanda angustia causa.

Hæc igitur ob causas fit pulsus intermittens, quatenus intermitte.

Dixi quatenus intermitte, quia pulsus iste præter intermissionem, alias quoque habet
 inæqualitates, vsq; adeo multas ac varias, ut ausim affirmare, nullam esse, quæ intermis-
 sioni succedere non possit.

*Intermitten-
tes pulsus,
quæ ob
vitium in-
strumenti.*

Ratio autem est clara: Cum enim vbi intermitte pulsus, nec quicquam attrahatur
 in cor, & raro quicquam ab eodem expellatur, quis non videt ex his angere calorem, fuli-
 gines, illaque excrementa, quæ pluries diximus ab expultrice naturali excerni? Quæ cum
 apprimè varia sint, nempe vel sola qualitate aut manifesta, aut occulta, cordi insensa, vel
 etiam copia maiore, minore, tenuiore, ac crassiore; pro robore, & imbecillitate facultatis
 pulsficæ, & expellentis; pro maiori, longiorique, aut breuiori intermissione, post inter-
 missionem pulsus euadent aliquando prioribus celeriores, maiores, ac vehementiores,
 quandoque autem crebriores, intercurrentes, diicroti, caprizantes, interruptique & id ge-
 nus reliqui.

Hos omnes cum intermittētib; copulari, patet ex Galen. 4. de puls. caus. vbi varia-
 rum affectionum pulsus describens, intermittētib; fere semper alios quoque inæqua-
 les connectit, ut infra nos quoque declarabimus. Quanquam autem 2. de caus. puls. 2. qua-
 rundam tantum meminerit, attamen ex illis reliquæ à nobis propolita facile colligi pos-
 sunt. Sic etiam scribit Gal. loco citato: *Ibi iam violenter agere, & vehementer cogitar reuocare fa-
 cultas, & propellere illa studens, quæ sua instrumenta offendunt, & motu prohibent, vbi prioribus
 maiorem, & vehementiorem, & celeritorem necesse est pulsus euadere.*

*Cur inter-
mittentes pul-
sus non sem-
per, sed præ
intermissione
intermittant.*

Sed quæret quispiam, si intermissionis causa est arteriæ angustia, cur sicuti semel au-
 bis intermitte, non etiam prorsus intermitte, sed per quædam tantum intervalla? Huic
 quæsitio duobus modis respondeo; primo causam coarctantem non semper esse cõtinu-
 am, sed quandoque intermittentem, imò nec in vno loco permanentem, sed apprimè
 mobilem, atque inconstantem, hincque fieri intermissionem nec continuam, nec ordi-
 natam, sed per quosdam circuitus accedentem, recedentemque, modo maiorem, modo
 minorem. Donec enim manet in corpus, atque in arteriis angustiam facit, intermissionē
 nec continuam nec ordinatam, sed per quosdam circuitus accedentem, recedentemque
 modo maiorem, modo minorem. Donec enim manet in corpore atq; in arteriis angus-
 tiam facit, intermissionem quoque producit, propulsa vero, aut digesta, arterias ab inter-
 missionē

A miffione relinquit immanes. Hoc explicat Gal. 2. de puls. cauf. 2. d. cenz. Ac fi humor aliquis fit offenfus arteriis, vehementibus, & moleftu motibus propulfus, de loco ad locum cogitur defluere, dum in meatum impingit, qui educere ipsum poffit, itaque emanet ex corpore, vel etiam tempore attenuatur, aut totus refoletur, in balistum digeratur, ubi diuerfa, & continens inaequalitas neceffario fit.

Sed quid dicemus de intermiffione facta, ob caufam stabilem, firmam, ac permanentem? Alio fanè modo respondendum, nec quidem alio, quam eo, quem docet Gal. loc. citat. nempe anguftiam hanc non effe talem, quæ facultatem mouentem ab omni diftentione prohibere poffit: illam tamen paulatim efficere imbecillio rem, vt fel mel tandem fuceumbat. Cum enim in omni diftentione impedimentum inueniat, atq; pro eo excuriendo dia in cafum laboreat, tandem paulatim languefcens, cogitur fel mel faltem, **B** vel quandoq; etiam pluries, à quocunq; motu defiftere, ita tamen, vt poft intermiffionem, recuperantiam viribus, ad motum priore etiam, vt diximus, maiorem, vehementiorem, crebriorem, ac celeriorem redeat, & in eo tam diu perfiftat, donec iterum languidior facta, de nouo quoq; in motu claudicat, idque quodufq; impedimentum excutere poffit. His fic explicatis, reliquum modo eft, vt cum dictum fit, intermiffionem iftam fieri à materia mobili, & ab affectu ftabili, videamus quæ fit hæc materia mobilis, quifue fit affectus ftabilis, & cuius loci tam in genere, quam in fpecie, quæ in fequentib; præftabimus.

CAPVT XCIII.

De materia, loco, & affectionibus intermittentium in acervo.

C **M** A T E R I A, quæ intermittentes pulfus excitat, poteft effe calida, frigida, nunquã tamen tenuis, fed femper multa. Hinc fanguis plerunq; vt docet Gal. intermiffionẽ pulfum excitat, non tamen quatenus calidus, fed prout mulrus ac craffius. Propterea 2. de puls. cauf. 2. fic fcribit: *Accidit etiam pulfum inaequalitatem ex fanguinis copia, qui aut in venas, aut in arterias fit infufus.* De crassa autem ac frigida, non eft, quod hoc probemus; Res enim eft clariffima.

Ad affectum quod attinet, poteft effe naturalis, & temporaneus: Naturalis erit vnus ex illis, qui arteriam vndique comprimunt in fuperiori quidẽ parte, carnis pondus; ad latera vero nimia obafitas, vel locus appime anguftus. Cuius quidẽ naturalis intermittentis, meminit Gal. lib. de præcogn. ad Pofthumum, cap. vltimo. Temporaneus affectus **D** erit pariter vnus ex illis, qui arteriam coarctant: vel acquifititia corpulentia, vel callus, topus, fcirrus, abfcelfus cuiufcunq; fpeciei, inflammatio, atque obftructio. Idcirco intermittens poterit effe eum febre, & citra febrem: Et quando adfit febris, non nunquam erit continua, quandoq; intermittens: Et ex continuis, erit vel fynochus benigna, quam ob caufam ex fanguine multo ac eraffo intermittẽtes fieri diximus, vel maligna, in qua nedũ ob craffitiem, ac copiam pranorum humorum intermiffio fequetur, fed ex facultatis imbecillitate: Vel erit periodica; Et hæc vel præcipua, vel fymptomatica; præcipua quidẽ, ex putredine humorum multorum, ac erafforum comprimẽtium; Symptomatica vero, ex obftructione, inflammatione, abfcelfu, aliufue id genus affectibus. Veniamus modo ad locum.

E Hic dupliciter proponi poteft, vel in genere, vel in fpecie. In genere funt arteriæ: neque enim fiet vnquam intermiffio, quin arteriæ ipfæ anguftentur.

Sed fi quis querat, quænam fint arteriæ in fpecie, ex quibus anguftatis fequatur intermiffio: Refpondeo, hæc effe vel communes, vel determinatas.

Sunt communes, in fynochis vel benignis, vel malignis: In his enim, fiue ipfæ met fint obftructæ, fiue à materia in fpatio inanibus, vel in proximis venis contenta, comprimantur, intermiffionem fequi neceffe eft.

Sunt autem determinatæ aut cordis, aut pulmonum, cerebri, ventriculi, atque vteri. De quibus omnibus generatim video fubfcripiffe Gal. 2. de cauf. puls. 2. his verbis: *Præcipue, fi vel propeipsum cor, vel præcui quidẽ, fed in mobiles partes impingent, obftruantque succi illi,*

F Nomine partium prope cor, intelligit aortam, arteriam venalem, & pulmones. Ex quibus affectis, omnium maxime funt intermittentes: Nomine autem remotarum, fed nobiliũ partium, amplectitur cerebrum, ventriculum, vterum. Et de cerebro quidẽ res eft clariffima: Etenim 4. de cauf. puls. 2. lethargicorum pulfus inquit effe intermittentes: imo vero in illius textum cum fcribit, potius intermittentes, quam intercurrẽtes effe. De ventriculo autem, & vtero, tamen fi Gal. non vique adeo aperte hoc dixerit, attamen cũ inæquales

Intermittens
cum, & co-
tra febrim.

Locum quoque
fuit pulfus
intermittens.

illis tribuat, doceatque quotidiana experientia, ex ore potissimum ventriculi affectio, atque ^A in hysterici affectionibus, pulsus nedum semel intermittere, sed & quandoque prorsus aboleri. idcirco iure optimo decernendum est, Gale. quoque nomine inæqualium pulsuum, utro, ac ventriculo tributorum, etiam intermittentes comprehendisse.

De pulmonibus non laborabo. Etenim nulla est pars, ut docuit Galen. 4. de *praesag. ex puls.* 2. quæ promptius intermittentes efficere possit. Et quamvis 4. de *caus. puls.* 13. lethargicis inquiri fieri potius intermittentes, quam intercurrentes, non tamen infert, hanc intermissionem frequentius, facilius, ac magis fieri ex cerebro, quam ex pulmonibus, sed hoc tantum docet, ex hisce duabus inæqualitatibus, quas parit cerebrum affectum, intercurrentia, inquam, & intermissione, intermissionem facilius subsequituram, quam intercurrentiam, quia cum intermissio fiat ex valorum compressione, intercurrentia vero ex ^B caloris incremento, facilius est lethargum, qui est affectus frigidus, & longe à corde distat, arterias comprimere, quam cordi tantam communicare caliditatem, quæ intercurrentem pariat.

De intermittentium causis, affectibus, locisque patientibus, productionis modo, satis dictum esse puto. Reliquum est, ut de causarum affectionumque distinctione quædam breuiter dicam, mox ad alios pulsus compositos me conuertam.

CAPVT XCIV.

Quomodo distinguantur pulsuum intermittentium causa inter se.

^C Dictum est hæcenus, intermittentes fieri quandoque ex naturali causa, ut plurimum vero ex temporanea; æquum est itaque vnum ab alio distinguere, ne in illum incidamus errorem, in quem quosdam sui temporis Medicos incidisse, scribit Gale. lib. de *praesag. ad Posthumum, ca. vii.* qui malignam quandam affectionem in cuiusdam adolecentis corpore subesse putabant, quod pulsuum intermittentem inuenissent; quem tamen Gal. naturalem esse deprehendit.

Modum vero distinctionis, ab eodem Gal. citato loco accipimus, qui scribit, pulsuum, qui nihil aliud præter naturam contineat, quam quod intermitat, siue intermissio sit vnius, siue plurium istum, naturalem esse. Quod si intermissioni alie quoque accedant inæqualitates, celeritatis scilicet, vel alterius differentie, tunc causam esse temporaneam. ^D Quia vero temporanea hæc causa, vel est mobilis materia, vel affectio firma ac stabilis. Ex materia mobili fit inordinatus intermitteres; ex affectione stabili, ordinatus. Adhæc ex mobili accedit, ac recedit, in aliumque, mutatur, modo intercurrentem, modo simpliciter disparem. Ex stabili vero, nec recedit, nec mutatur, nisi quatenus intermissio augeatur.

Materiam vero cognoscemus esse calidam, ex celeritate, frequentia, magnitudine, atque alitis signis, sanguinem, vel bilem docentibus; frigidam vero ex signis oppositis.

Affectiones pariter stabiles, sed calidas, ut inflammationes, cognoscemus ex intermissione cum duritie, sebre valida, calore magno, ac dolore; Frigidas vero, ex intermissione quidem cum duritie, sed absque febre, aut cum exigua, nulloque aut modico calore, ac dolore. ^E

Locos autem affectos sic distinguemus; Si affectus locus longe distet à corde, brevis, raraque est intermissio, cum læui quoque aliarum differentiarum inæqualitate. Si vero sit cordi proximior, quo proximior fuerit, eo plures, longioræque habebit intermissiones, cum maiori aliarum differentiarum inæqualitate; aderunt enim dicroti, & alii similes. Habebit præterea vnaquæque affectio, ac locus, propria symptomata.

Quod si aliquando affectus fuerit in corde, non modo maximam ac multiplicem habebit pulsuum inæqualitatem, sed & tremorem, palpitationem ac syncope. Et si quidem syncope ac palpitatio sit grauis, frequens, & absque causa, vitium erit in corde primo ac per se si vero leuis, rara, atque cum manifesta aliqua causa, per consensum tantum cor patietur. Hinc Galen. 2. de *praesag. ex puls.* 4. de cordis inflammatione verba faciens, ex qua ^F intermittit pulsus, inquit, hos subito corripit syncope; & post multa verba, ait: Porro autem mori à pulsibus intermittentibus repentina corripit, non aliter, quam ab Apoplexia: utrobique enim cordis calor extinguitur, respiratio desinitur. Ut ostenderet ex causis in cordis corpore existentibus lethalem esse intermissionem, sed de hac re plura in prognostico. Ad intercurrentem transeamus.

De causis & affectionibus intercurrentium.

Intercurrens pulsus eandem quandoq; habet causas, locos & affectus, quos & intermittens, quandoque vero diuersos.

Habere eosdem, docuit Gal. 2. de praesag. s. sic scribens: *Alique ab intercurrentibus, quod peripneumonicis interim, qui in statu sunt periculoso, accedant, nonnunquam item in febribus, in quibus oppiletur, vel compressa sunt principes arteriae.* Et paulo post de isdem hæc facit: *Sunt idipsum fit, ubi ab humorum copia oneratum cor sit, aut instrumenta obstructa, aut coarcta: quæ quidem cau-*

*Partes quæ
intercurrunt
eandem affec-
tionem possunt.*

*Intercurren-
tes non quod
causæ sunt,*

*Omnia in-
tercurrentia
est in mente
arbor.*

Bis erant et intermittentiis. Ex his facile colligi potest, cor, pulmones, cerebrum, os ventriculi, atque vterum ex partibus determinatis; omnes autem venas, & arterias præcipue maiores, quæ sunt inter alas, & inguina, ex communibus posse intereurentes efficere, quia ex his ipsis locis intermittentes diximus quandoque fieri, ex materia frigida, ex scirrhis, aliisque causis, & affectibus absque febre: Intereurentes vero, cum sint creberrimi, nunquam ex frigidis causis & affectibus fiunt, nec vnquam circa febrem inueniuntur. Cum autem febres, quas consequuntur, possint esse vel synochi putridæ, vel periodicæ: & hæc quidem vel principales, vel symptomatice, ex peripneumonia scilicet, lethargo, vel simili inflammatione oriundæ: Rursum vero harum omnium quædam sint legitime, quædam spurge; hinc non vnicus erit intereurentium modus, sed multiplex, dum quidam ex his crebriores, alii minus crebri, quidam nec omnino crebri inueniantur.

Neque vero putet quispiam esse à ratione alienum, intercurrentem, qui est summe creber, à me dici non admodum crebrum; etenim omnis intercurrentis est summe creber, ratione illius distentionis, quæ intercurrit, ratione vero aliarum, non omnis creber est. Sed ad rem nostram redeamus.

Fir intercurrentes, vt diximus, in illismet affectibus, in quibus & intermittens, dummodo tamen, aut compressio sit minor, quàm in intermittente, vel saltim virtus sit validior. Cum enim in intercurrente pugnet, certetque cum noxiis causis facultas, in intermittens tibus autem hoc pignat facere, sane ob vnam ex duabus propositis causis, certabit facultas in intercurrentibus, in intermittens nequaquam, vel quod in illis facultas inferior sit, vel quod minus sit impedimentum.

Est vero facultas fortior, eo quod intermittens febres, vel non sunt malignæ, vel malignitas cordis facultatem nondum superauit: minus vero est impedimentum, quia obstructio vel compressio, aut minor, aut mobiliore est, quam in intermittensibus. Et hæc genus de intercurrentibus, quatenus easdem habent causas, & affectiones, quas etiam intermittentes, sed aliquanto mitiores.

Venio nunc ad eundem, prout ex duplici sit causa, vsu scilicet aucto, & facultate non inualida, quemadmodum in futura crisi. Tunc enim sit intercurrentes, quia præter calorem, & fuligines auctas, adsunt alia quoque noxia excrementa, quæ expultrix naturalis detrudere studet. Itaque cum distentiones omnes crebræ, ex calore & fuligine sint crebræ, hæc si expultrix facultatis motus accedat, sane crebriorem augebit, augendo autem intercurrentia efficiet. Hanc ob causam Gal. intercurrentem à proxime futura crisi eotingere docuit 2. de praesag. s. his verbis: *Sane indicationem sepe pulsus intercurrentes attulerunt; est enim & reclusi conatus quidam natura ad pugnam parata.*

Si ergo intercurrentes pulsus, non minus prauarum affectionum, quam bonæ cuiusdam crisis est prænuncius; distinguere opus est signis, quibus criticus à symptomatice distinguitur.

Sic vero seiungetur, quod criticus, intercurrentia excepta, alias non habebit inæ qualitates effectus dignas; suasque obtinebit distentiones magnas, validas, celeres nec admodum crebras; apparebitque in statu, ac eodionis tempore. Contra vero symptomatice plures habebit inæ qualitates connexas, præcipue intermissionem: distentiones effectus paruas, languidas, nec admodum celeres; apparebitque potius circa morbi initia, quæ statum, vel saltim ab initio, vsque ad statum perseverabit.

Proxime in Nicolaum Barbatum Ciuem Parauinum annorum lxxxi. incidimus febrem continenti maligna laborantem, cui statim ab initio pulsus fuit intercurrentis, raris- sime in intermittente, tandem in paruam, languidum, neque appetit celerem, nec crebrum deflexit

*Intercurren-
tes.*

*Intercurren-
tes sunt
symptomati-
ce.*

Mitioria.

deſit cum quo obiit. De intercurrentibus & intermittentibus hæc ſatis, ad diſpares in æceruo iam conſugiamus.

CAPVT XCVL

De cauſis diſparium in æceruo, & quomodo ex vnicâ affectione tam variis prædicant pulſus.

Intermittentes pulſus, æc. & intercurrentes.

INter pulſus inæquales in æceruo, qui ex compoſitis prodent cauſis, diſpares adhuc remanent vehementia, imbecillitate, celeritate, tarditate, magnitudine, paruitate, frequentia, & raritate, quos ex iisdem cauſis, & affectionibus fieri cenſemus, ex quibus intermittentes, vel intercurrentes, læuioribus tamen. Idcirco, quatenus eaſdem ſequitur cauſas, quas etiam intermittentes, poſſunt eſſe cum febre, & extra febrem: Et cum febre vel continente, vel periodica, continua atque intermittente, legitima, ac ſpuria, præcipua, ac ſymptomatæa, id eſt, ex obſtructione, inflammatione, abſceſſu, aliaue ſimili cauſa oriunda. Citra febrim autem ex multis, craſſis, viſcidis, lentisq; humoribus granatibus, comprimentibus, obſtruentibus oriuntur. Quatenus vero ſequuntur cauſas intercurrentium ſunt ſemper cum febre, & ſiunt pariter vel ex triplici illa cauſa, ex qua intermittentes, vel ex duplici tantum, nempe viſu auditu, & facultate: idcirco hi quoque non minus, quam intercurrentes, criſium ſunt prænuntii. Etenim cum ex minoribus, ac lægidiſſioribus, in maiores, ac validiores murantur, ſururam annuntiant eoditionem, naturæ victoriam, ac criſin. Contra vero eruditatem, facultatis imbecillitatem, atque diſficilem iudicationem, li ex magnis ac validis, in minores ac languidiores conuertitur: aut ſaltem plures habeant pulſationes minores, ac languidas, quam magnas ac validas. Et hæc ſenus abunde, ni talior, omnium pulſuum cauſas perſequeri ſuimus. Nunc autem ad abſolutam huiusce partis, quæ de cauſis & affectionibus pertractat contemplationem, illud tantum relinquatur, vt quibuſdam quæ ſitis ad modum neceſſarii occurramus, quæ incertam, perplexamq; ac dubiam hinc redderent doctrinam, niſi illis ſatis faceremus.

Poſſe enim iure optimo quis quæſcere, qui fieri poſſit, vt diſpar in æceruo intermittens, & intercurrentes ex iisdem fiant affectionibus, cum tamen valde diuerſi videantur? Cui reſpondeo, id fieri poſſe ex affectionis magnitudine. Etenim maximus affectus faciet intermiſſionem; minor, intercurrentiam; minimus, diſparitatem.

Affectus magnitudinem tribus conſiſtit.

Magnitudo autem affectus, in tribus poſſimum conſiſtit, in magnitudine propriæ eſſentiz, in præſtantia partis affectæ, & in facultate, quæ leſitur.

Ratione propriæ eſſentiz dicitur magnus affectus, verbi gratia, magna inflammatio, aut quid tale.

Ratione partis affectæ, dicitur magnus, qui cor, pulmones, cerebrum, os ventriculi, iecur, atq; vterum occupat: Denique ratione facultatis magnus dicitur, qui cordis facultatem deſtruit. His ergo ſic conſtitutis, vna & eadem inflammatio, aut tumor, pro horum trium varietate, poteſt modo intermittentes, modo intercurrentes, modo diſpares reddere.

Intermittentes, ſi magna ſit inflammatio, ratione propriæ eſſentiz.

Intercurrentes, ratione partis præſtantis, & facultatis vitalis læzæ, ſi aliquanto minor in his omnibus extiterit.

Diſpares denique, ſi non modo minor fuerit ratione propriæ eſſentiz, ſed neque partes nobiles occupet, imo vero alias longe ignobiliores. Sic ergo muſculorum vel intercoſtialium, vel abdominis, vel aliarum corporis partium affectiones, poterunt diſpares magnitudine ac paruitate, tarditate, ac celeritate eſſe, non tamen intercurrentes, & multo minus intermittentes. Hanc veritatem pauca expreſſit Gal. de cauſis pulſus ſic dicens: *Quare ut vno verbo doceam, cum aut valide comprimentur arteria, aut cum obſtruntur, ut integra omnino ſancti ſit inæqualitas quadam corripit pulſus.* Per hæc verba, docet inæqualitatem diſparem, quæ ſit ex affectibus quidem obſtruentibus, aut comprimentibus, ſed à corde remotis: poſtea inæqualitatem proponit cum intermiſſione, aut intercurrentia, ex corde, partibusq; cordi proximis factam, cum inquit: *At ſi facultas vna ſit affecta, cum eo affectu inſtrumentum clariffimum eſt, magis variam oportere inæqualitatem exiſtere:* Per facultatem enim affectam, locum inſinuat eſſe vel cor, vel cordi propinqua; per magis variam inæqualitatem, aliquam intelligit à diſpari diuerſam & maiorem: hæc vero eſt intermittencia, vel inter-

A intercurrentia. Itaque paret ex Gal'e. ob varietatem loci, ac læsionis facultatis, varios fieri pulsus, quamquam eadem sit affectio. Et de primo hoc quesito hæc sufficiant.

Secundo scilicet quis possit, quomodo ex vnicō affectu corde predeant caprizantes, vel alio quouis modo interrupti, di-roti, tremuli, ac palpitantes: Dico fieri caprizantes, & interruptos ex facultate non dissoluta, sed grauata à materia, in pericardii tunicis cavitare, vel cordis corpore contenta. Dirotos autem ex materia, cordis vasa obfident, atque ideo comprimere, vel obstruere, & facultatem magis debilitante. Tremulos vero ex facultate magis dissoluta, quam grauata: Palpitantes denique ex facultate sentiente & expultrice naturali irritata. Hæc omnia ex hæcenus dictis absque noua probatione colliguntur.

*Quomodo
fiunt capri-
zantes, in-
terrupti, di-
roti, tre-
muli, palpi-
tantes.*

B Sed si diroti sunt ex vasorum cordis compressione, quomodo ergo docet Gal. fieri illos quandoque in lethargicis, & peripneumoniacis? Respondeo, id docuisse Gale, quia harum partium compressio, vel obstructio, propter vasa maxima, cordique vel proxima, vel valde consentientia, potest perinde vsu in corde augere, atque eiusdem cordis affectio. Vsu autem aucto, dirotos fieri, antea docuimus.

Obstru.

Sed quomodo ex his locis sunt diroti duri, cum doceat Gal. ex iisdem vndosos fieri, qui molles sunt, durisq; omnino oppositi? Dico fieri ex cerebro, a: pulmonibus dirotos duros, cum scirrhus, vel alia sicca affectio illos occupauerit, vndosos autem, cum cedema, vel morbus humidus.

Alia obstr.

C Sed qui fieri potest, vt hæc partes his affectibus tententur, intermittentes pariant, qui ab his omnibus longe distant? Dico molles affectus tunc facere intermittentes, cum magna fiat vasorum compressio: Vndosos autem, cum leuior.

*Tertia
Duroti du-
rig. merito*

Ad duros autem affectus quod attinet, dico illos in vno & eodem patiente parere intermittentes, ac dirotos duros, imo vero in intermissione esse dirotorum causam.

Sed dicet quisq; am: Estne ergo omnis intermissio cum diroto connexus? Respondeo minime hoc esse necessarium. Quid ergo (instabit adhuc aliquis) si hoc non est necessarium, cur quandoque intermissione succedit dirotus, quandoq; non? Dico, tunc dirotum succedere, cum præter intermissionem, facultas quoq; langueat, vt distentiones, quæ intermissionem sequuntur, sint paræ: Non sequitur autem, si facultas valeat, & distentiones sint magnæ, vsusque non sit admodum auctus. Idcirco in intermissione facta propter pulmones, ac cor, semper fiunt diroti, ex aliis vero partibus, nõ item, nisi vsus sit valde auctus, in quo casu erunt diroti potius vibrati.

*Alia.
Non omnis
intermissio
diroto con-
iungitur.*

D Sed quomodo nam fiunt quandoque intermittentes ex illis ipsis locis, causis & affectionibus, nempe inflammationibus, ex quibus etiam ferrini, vibrati, conuulsiui, simpliciter duri, atque dispares magnitudine, ac paritate? Respondeo, fieri simpliciter duros ex tunicarum arteriarum siccitate, refrigeratione, tensione, impletione absque compressione, atque obstructione, & absque vsu aucto, vel absque vchementia facultatis: Vibratos vero ex his quidem causis, sed accedente vsu aucto, & robore facultatis; conuulsiuos autem irritata sentiente, expultriceque nerui facultate: vel ex maiori impletione, quam in simpliciter duro: Sertinos vero, accedente tensione, eompressione moderata: Dispares magnitudine, ex moderata, compressione aut obstructione, absque tensione: intermittentes denique, aucta vsque adeo impletione, obstructione vel compressione, vt tota vasis cavitates in ea parte sit angustata. Idcirco in intermittetibus atque magnitudine dispa-rib. ipsemet arteriarum tunice, vel cavitates implentur, comprimuntur, vel obstruuntur, in aliis vero pulsibus iam dictis vel siccantur ac refrigerantur, vel ad aliarum partium impletionem, ac tensionem comprimuntur, atque tenduntur.

Ratio est clara, quia in dispa-rib. & intermittetibus, non necessario adest durities, & ramen maior est vasorum angustia; in aliis contra maior est durities, minor autem angustia. Angustatur autem arteria absque duritie, obstrueta, ac compressa; induratur vero absque angustia siccata, refrigerata, & ob nerui membranz affectionem tensa.

Diffinitio

F Hoc multiplex posset experimento confirmari, sed recens tantum afferam: Caroli pharmacopœi ad insigne Coronæ, qui pridie obiit cum peripneumonia, & hydropneumomum. Hic enim duros non habuit pulsus, sed in dextra manu fere abolitos, quod durior, maiorque in dextro pulmone: in sinistra, magnitudine, ac paruitate dispa-rib. quod minor ac mollior, & aliqua ex parte suppurata esset in sinistro pulmone inflammario.

Quod si quispiam à me quatrat, cur hydropneumonis laborarit? Cæleo ex febre ar-

N denti

- A** durior, ut scirrhus, duriores: minus frigida, minus sicca, minimeque scirrhosa, minus quoque duros pariet pulsus.

Cæterum quia affectio ex se duritiem faciens, potest esse in parte molli, quæ vero mollitiem facit, in dura: docet Gal. 4. de *præfag. cap. 9.* pulsus semper potius affectionis, quæ partis naturam sequi, ut propterea pars dura cedemate affecta, faciat molles, molles vero scirrhus tentata, faciat duros: Hinc scribit membranis cerebri cedemate vexatis molles fieri, non tamen perinde, atque ex cerebro, ac pulmone: Cerebro autem ac pulmone scirrhus renatis, duros esse inquiri, non tamen perinde, atque membranarum.

Pulsus firmus per affectionem autem partem naturam sequitur.

- B** Vtrum vero cerebrum, ac pulmo capiantur scirrhus, & vtrum iecur cedemate, res dubia atque apprimè controuersa est. Etenim *cap. 9. quartæ de præfag.* aperte docet Gal. cerebrum, ac pulmones scirrhum non admittere: Et tamen *cap. 8.* dixerat, ex materia crassa vel pituitosa, vel melancholica, in cerebro existente, scirrhos inibi fieri: id quod de pulmonibus patitur *cap. 2. eiusdem libri* asserit, duriores scilicet per illius partis scirrhos, reddi pulsus.

Leuissimum Galen. tradidit.

Ad cedemata etiam quod spectat, scribit Gal. 4. de *præfag. cap. 4.* nunquam ex thorace, aut iecore molles fieri pulsus, eo quod nec innascatur his locis cedemata pituitosum: *cap. autem 9. eiusdem libri* inquit, ex cerebro, ac pulmonibus pulsus esse ita molles, ut nullus alius: Postea subdit, his viciniore esse illos, qui ex liene, & iecore cedemate affecti sunt.

- C** Priorem contradictionem facile possumus conciliare, ex addita à Gal. particula, dubitativa, in *cap. illo 9. quartæ de præfag.* ubi dum docet cerebrum, ac pulmones scirrhus non vexari, addidit, *fortassis*: per quam particulam, non omnino scirrhos ab his partibus excludit, sed hoc tantum uoluisse indicat, difficilius, ac rarius in his fieri.

Leuissimum addit. r. conciliatur.

Ad aliam vero contradictionem quod attinet, maioris sane momenti esse videtur quam ut conciliare doctissimi quidam viri, dixerunt textum non sic legendum, prout stat, sed ubi dicit, *cedemata*, legendum esse *cedematosus affectiones*: Affectiones autem cedematosas nil aliud significare inquit, quam hepatis feruorem, vel ut alii interpretantur, fermentationem: culus affectionis meminit Hippo. 4. de *morbu. vulgaribus* pag. 328. ver. 47. ubi de Meandri Cæci vxore scribit *in uero*.

- D** Cæterum ut ingenue dica in quid censeo, hanc minime amplecti possum conciliationem: quia si aliud dicamus esse in iecore affectum ab eo pituitoso cedemate dixerimus, quem Galen. 4. de *præfag. cap. 9.* describit, non stabit illius loci sensus: Vult enim ibi Gal. ostendere, molles fieri pulsus ex liene, ac iecore: Non possunt autem esse ex natura partis, quia nec lien, nec iecur molles esse oportet ergo ut molles pendeat ex affectu. Hepatis autem feruor, vel fermentatio, multoque minus ullus alius affectus cedemate pituitoso excepto, mollitiem efficere potest, ergo sequitur ibi de vero cedemate verba fieri. Confirmatur hæc veritas ex Hippocr. & Gal. 1. *prægnat. 34. text. c. com.* ubi tam aperte uterque author, iecori cedemata pituitosum tribuit, ut nihil clarius esse possit. Loquebatur Hipp. de iecoris tumoribus, quos omnes in *text. 29.* vocauerat cedemata: cum hac tamen distinctione, quod inflammationes vocaret cedemata dura, ac dolentia, de quibus agit in 30, 31. 32. & 33. *text.* tumores vero pituitosos, cedemata mollia, indolentia nuncupabat, & quæ digitis pressa cederent. Hæc iecori accidere, & de his Hippo. in *text. 34.* loqui, apertissime docet Gal. in *com.* itaque in dubium minime est reuocandum, quin iecur cedemate possit tentari.

- E** Quomodo ergo conciliabuntur hæc duo contraria Gal. loca? Ego sic conciliari posse existimo, iecur cedemate tentari, dupliciter accipi posse, vel feruore illius calore innato, & soliditate substantiæ, vel eo amisso: Primo modo non potest cedemate vexari: Secundo autem modo potest. Ratio elicitur ex verbis eiusdem Gal. *cap. 4. quartæ de præfag.* Duplicem enim proponit causam, propter quam iecur non admittat cedemata: prima est, quia compactor est iecoris substantia, quam ut pituitam admittat: secunda est calor innatus, propter quem potest pituitam concoquere. Demum ergo calorem imminui, carnemque substantiam rariorem fieri, ut in cachexia, & hydropse contingit, sane tunc nihil prohibebit, quominus iecur cedemate vexetur. Itaque 4. de *caus. puls.* 2. quando negauit fieri cedemata, ad iecur sanum respexit: cum vero *cap. 9.* cedemata in eo admisit, iecur considerauit, iam aliqua ex parte refrigeratum ac laxatum.

Iecur indolens calore innato non potest dupliciter accipi.

Sed his iam dimissis, ad vltimum deueniamus quæsitum, quod nobis ad aliud caput

longe vtilissimum viam aperiet: Cur scilicet, vnicus tantum affectus, plures ex iam dictis obtineat pulsuum differentias? Respondeo, quia affectus quanquā vnus in genere, multiplicatur tamen in specie, ratione loci, causæ, magnitudinis, paruitatis, morus velocitatis, ardui, boni vel mali moris, debilis vel robustæ facultatis, irritatæ, vel nõ irritatæ, vsus aucti vel immutui, symptomatumque variorum, quæ quomodo se habeant, in sequenti capite declarabimus.

CAPVT XC VII.

Quinam sint omnium affectionum pulsus, & quæ sit illorum causa.

C Aput hoc ab omnibus præcedentibus apprimè differt; hætenus enim vnico pulsū proposito, illius causas & affectus quæsiuimus, & inuenimus: Nunc autem ab affectu ad pulsuum differentias sane varias in eo repertas accedemus, atque varietatis causam adducemus. Id quidem fecit Gale. 4. de puls. caus. fecit & Struthius, & alii; faciemus & nos sed faciliori forte, & breuiori methodo.

A dolore autem in epiemur, qui dum vires valent, secundum Gale, facit magnos, celeres, crebros, vehementes; dum tuunt, oppositos, crebritate excepta, quæ non nunquā ita augetur, vt in formicantes transeat. Hæc Gale. Ego vero addo hos etiam duos esse: Etenim nunquam grauis est dolor, absque membranæ, tendinis, aut nervi affectione; neque erunt hæc affectus, absque duritie. Idcirco idem Gal. inflammationi tendinosæ, nervosæ, ex qua fit dolor, tribuit tensores, serratos, vibratosque pulsus; dum modo non alii symptoma prohibens; paræ autem, molli, in carne, vel glandula, aliaue molli, parte existente, oppositos concedit, præcipue si aliqua adsint symptomata vibrationem, ac ferrinitatē prohibentia, qualia sunt conuulsio, syncope, quæ fit ex ore ventriculi, suffocatio, quæ fit ex pulmonibus, & id genus reliqua, quæ in inflammato lepto, ac membranæ cerebri plenumque succedunt.

Inflammationum pulsus.

Porro, inflammationes habent quoque crebritatem, modo magis, modo minus, prout pulsus maiores aut minores fuerint; prout inflammatio calidior, aut minus calida extiterit. Calidior enim inflammatio, quo minores habet pulsus; eo crebre ore obtinebit: Frigidior autem rariore, & tunc potissimum cum aliqua accesserit magnitudo.

Phreniticorum pulsus.

Quæ de inflammatione diximus in genere, ad phrenitidem, ad pleuritidem, omnemque aliam inflammationem in specie transferuntur: Sed quia diximus, conuulsium affectum inflammationi superuenientem, obscurare ferrinitatem, ne gratis hoc dixisse videamur, audiamus quæso, quæ Gale. de phreniticorum pulsibus habet; Inquit enim eos habere crebros, celeres, durum, paruum, modestate vehementem, tensum, vibratum. Et hæc quidem omnia fiunt ex vsu aucto, instrumento duro, facultate moderate se habente. Addit raro esse vndosum. Iure dixit, raro: Etenim vndosus in hectica tantū phrenitidis locum habet, vt antea docuimus; Tremulum esse subiungit: Ego huic tremorem, non ad arteriæ tantum, sed ad totum brachium refero; Neque enim aliū in phreniticis inuenio tremorem, quam eum, qui conuulsionem sequitur: Conuulsio autem in phreniticis ne dum concurrit arterias, sed & musculos, ac totum membrū. Idcirco non est primo ex corde, sed ex cerebro. neque est tremor antea descriptus, sed alius conuulsionē sequens; vt iure Gal. addat, conuulsium esse phreniticorum pulsuum, & ideo distentionem quandoque interrumpi, deinde impetu quodam exilire: ex quo patet vibrationem, ac citi tinitatem, si quæ fuerit, amitti.

Lethargicorum & peripneumonicorum pulsus.

Quæ vero scribit Gal. de febtili inæqualitate, caloris scilicet dispartite in vnico idū valde sensibili, hætenus sunt exposita, neque noua egent interpretatione. Itaque ad lethargicorum, peripneumonicorumque pulsus transibimus. Sunt hi magni, celeres, crebri ex calore; angusti, ex facultate grauata: molles vndosique, ex partibus & affectibus mollitibus, eum subtensores; neque intermittentes ex arteriarum compressione. Intercurrentes, ac dicroti duri, ex viroque vsu, præcipue autem calore aucto, cum facultate languida in dicroto, non admodum languida in intercurrente. Sunt autem ex cerebro potius intermittentes, quam intercurrentes, ex pulmonibus autem potius intercurrentes, quam intermittentes, ob causas ante dictas.

Neque vero existimandum Auitennam Galeno hæc in parte aduersari, qui in capite de lethargo, scribit in lethargicis esse pulsuum in medio eadem, quem ipsemet *secunda*
primus

- A** *primi* vocat intercurrentem: Possimus enim dicere, per pulsum eadentem in medio, intermittentem intelligi. Et quanquam *2. primi* intercurrentem vocauerit eadentem in medio, non tamen sibi ipsi contradicit Auic. Etenim tam intercurrentes, quam intermittens dici potest eadens in medio: ille quidem, quod inter vnam & aliam distentionem; tertiam admittere multiplicata: hic vero, quod inter vnam & aliam distentionem, vnicā, vel plures amittat, quas facere posset. Cum ergo vtrique possit dici eadens in medio, diuerso tamen respectu, decens est existimare Auic. nomine eadentis in medio, intercurrentem ibi voluisse intelligere, quia conuenit cum Gale. & cum ratione, cerebrum compressum facere intermissionem: distans vero à corde & affectu frigido rentatum, non facile parere intercurrentem. Hæc de lethargicorum, ac pneumonicorum pulsibus. Venio ad mixtos affectus, ex phreniride, & lethargo, qui non semper eisdem habent pulsus, sed varios, prout coma fuerit vigil, vel soporiferum. Vigil enim magis ad phrenitim accedens, pulsus habebit duriore, soporiferum vero lethargo appropinquans, molliore.

Quod autem subiungit Galen. horum pulsus esse largos, sed breues, dictum videtur mihi propter coma soporiferum; sicuti reliqua, quæ addit propter coma vigil cū inquit: *Externum motum non habent subito truncatum sed alio modo veluti intro se proripientes subterfugiant, ac concitant contractionem. & quasi suffragantur distentionem.* Hæc verba dicta esse propter coma ad phrenitim accedens, patet ex sequentibus, dum inquit: *Verum in capulis phreniticorum non sunt similes, quod truncatione illa careant.* Quasi dicat, in pleuride ob affectum conuulsuum, distentio nem subito interrumpi, vt postrema illius pars quando-

- C** que subito truncetur, in comate vigili, interrumpi quidem eandem distentionis partem, sed non dubito truncari, imo ob fuliginum copiam, quæ in hoc comate, longe superat calorem, arteriam intro trahi, distentionem interrumpi, & suffragari. Hæc igitur de comate vigili dicta esse, nemo debet in dubium reuocare. Quæ vero de breui & lato pulsu dicta sunt, ad lethargi distinctionem prolata esse, ex eo coniecio, quod cum videret Gal. in lethargo molliorem longe esse maiorem, quam in comate soporifero, ratio et dictabat, vt comatosi haberent pulsum aliquem mollem, non tamen vndosum. Talis est, qui aliquam habet magnitudinem: Durus enim nullam habet magnitudinis distinctionem. Comatosi itaque tribuit pulsum latum, vt ostenderet mollem esse arteriam, faciliorem tamen languidam, atque grauata, quæ longum, altumque simul eum latitudine patere non possit.

Sed cur porius latum, quam altum aut longum faciet? An quia facillius est in his affectibus comprimi arteriam secundum altitudinem, ac longitudinem quam secundum latitudinem.

Veniamus ad Catochicorum pulsus, quos inquit Gale. esse minime languidos, aut molles. Ego verus duos dixerim: Etenim rigentia in toto corpore, rigent quoque arteria, hinc æqualiter tensæ, æqualem facient duritiem cum paruitate, non tamen cum imbecillitate connexam.

Quæ de conuulsorum pulsibus scribit, partim manifesta, partim obscura sunt: Tendi arteriam, in conuulsione diuerso quodam modo quam in siccitate, refrigeratione, aut impletione, manifestissimum est: tendi eundem quoque æqualiter, nonnunquam inæqualiter, ita vt in eadem distentione sursum deorsumque, & quandoque cum magna vibratione, quandoque intra hanc moueatur, est compertissimum.

Strepitum vero in hoc pulsu ad tactum sentiri, vt docet Galen. non alio modo intelligo, quam eo, quem in cap. de pulsu strepente proposui. Hunc etiam pulsum Epileptici maxime conuulsione tentatis concedo: Vbi vero moderata, levisque fuerit conuulsio, differt Epileptici pulsus, à conuulsio, conuenit autem quandoque cum attonitorum pulsibus, aliquando autem minime.

Si enim fiat Epilepsia per essentiam in capite, & ex eodem humore, ex quo Apoplexia, vt sensit Galen. *2. aph. 45. & alibi*, sane pulsus erunt in vtroque affectu, cum virtute valida, magni, vehementes, non admodum celeres, erebri aut duri; Grauiata autem facultate, inæquales, intermittentes, tardi, duri, ac rari euadent.

Vbi autem Epilepsia sit per consensum, vel fiat à simplicij vapore, aut flatu, non necessario hos habebit pulsus, sed alios de quibus non est præsentis loci petrastrare.

Paralyticis pulsus esse tardos, paruos, raros, molles, languidos, ratio suadet, quia ex frigidityte ortum ducunt. Esse intermittentes inæqualiter, docuit Gal. rationem tamen

non assignauit, nec facile patet, quia paralyſis nec obſtruit arterias, nec comprimit. Cur ergo inquit Gal, in paralyſi eſſe intermittentes? An quia in paralyſi raro cerebrum abſq; in ſigni putitæ ce pia reperitur, quæ vel inibi exiſtens, vel ad pulmones tranſmiſſa inordinatam facit intermiſſionem.

*Angina pul-
ſus.*

Anginæ pulſum Gale, quadruplicem proponit: Vnum quidem illius, propriam naturam & locum ſeruantis, quem dicit eſſe ceteris quoque inflammationibus communẽ. Alterum eiufdem, quæ ad pulmones mutatur, quem vnoſum vocat: Tertium illius ad ſpalmum tendentis, conuulſiuum ſcilicet: Quartum morituri, crebrum, & inæquale.

*Orthopne-
æram pul-
ſus.*

Ad Orthopneæcos quod attinet, pulſus, hi varii ſunt pro vſu aucto, vel non aucto, pro viribus valdis, aut cadentibus. Hinc Gal de orthopneæa cum virium robore ſcribit, illam habere pulſus inæquales, inordinatos, non nihil deficientes, id eſt intermittentes: deficientibus autem viribus languidos ac tardos: & quia vſus augetur, creberrimos, ſed languidiſſimos.

Nomine autem Orthopneæ, omnem pulmonis affectum intelligo, arterias tam aſperas, quam læues obſtruentẽ, vel comprimentẽ, ſive adſit tumor, ſive nõ; ſive humor ſit calidus, ſive frigidus, aut ſpurus. Venio ad vteri præſocationem, ac ventriculi affectum.

*Duri pulſus
preſentat
vteri præſoca-
tionem.*

Vteri ſuffocatio varios præfert pulſus: paruos, tardos, ac raros, ob frigidam in temperiem: tenſos quandoque, ob conuulſionem; inæquales, inordinatos, intermittentesq; ex arteriarum obſtructione, vel compreſſione: Deficientes, & aboliõs; ex omnibus hiſ cauſis eoripſum obſidentibus.

*Pulſus an-
xioſitatis vti-
trius.*

Degramitate vel anxietate ventriculæadem fere eſt ratio. Etenim cum ex frigida in temperie ac materia proueniat, paruos, tardos, raros, languidos, & inæquales facit. Aliæ vero ventriculi affectiones alios habent pulſus.

*Pulſus alia-
rum affec-
tionum ventri-
culi.*

Mordicatio, nauſea, ſingultus, vomitus, cholera, paruos, celeres, crebros, languidos, ac quandoque vermiculoſos,

Inflammatio, duros, tenſos, conuulſiuos, crebros, ac paruos.

Quod vero dicat Gal, inproducta raritate, arteriam apparere multis locis perforatam, & in diſtentione ſentiri quaſi arenæ occurſum; viderur mihi apprimè obſcurum. Credo tamen, nil aliud voluiſſe Galenum, quam quod ore ventriculi valde refrigerato, ac compreſſo, fiat & aritas, & interruptio vnius iſtus, cum aliqua duritie. Interruptionẽ vero vnius iſtus ſignificauit dicens, arteriam apparere perforatam, & adeſſe inæqualitatem in vno pulſu. Adeſſe vero duritiem quandam indicauit, cum dixit, adeſſe quaſi arenæ occurſum. Dura ſane videbatur hæc interpretatio, ſed forte vſus eſt hac in parte Gal.

Archigenis vocibus obſcuris ſatis, atque impropris; per quas ni fallor ſic voluit inæqualẽ innuere duritiem, vel aſperitatem: vt ſicuti aſpera conſequenter ſubdura eſt arena, nõ tamen continua, ita vt arteria aliquando inæqualiter aſpera à digitis ſentiat. Talem ergo pulſum fieri in propoſito affectu, ratio ſuadet, quia frigida materia os ventriculi obſidẽs, & necroſi efficit duriores & arterias cõpiimir, & cor valde refrigerat, vt ratione nerui pulſus euadant duriuſculi, ratione cõpreſſionis interrupti, ratione refrigerationis apprimè rari.

*Hydrops
pulſus.*

Hydros aſcites, paruos, ac duros habet pulſus, ſed breues: paruos ex refrigeratione & facultatis imbecillitate; duros ex membranarum refrigeratione, ac reſiſtione. Breues ex compreſſione.

Tympanites vero tenſos habet pariter, ſed longos, quia non adeſt compreſſio; minnque paruos, quia minor eſt refrigeratio, virtusque magis valet.

Vtraque tamen hydros habet crebros, ſi febris adſit, imo etiam celeres, ſi virtus conſect, vt in Tympanite.

Multo autem duriores erunt, ſi adſit vſcetum ſcirrhus, qui cum magnus fuerit, etiam in leucophlegmatia duros pariet, quamuis ex propria natura leucophlegmatia vnoſos obtineat.

*Tympani-
tis pulſus.*

Alii ſuperſſent affectus proponendũ multi, ſed ne longior euadat noſtra hæc oratio, tres tantũ adhuc recensẽbimus: Empyema, marcorem, ac phthiſin. Empyema in ſui initio talem habet pulſum, qualem inflammatio in ſtatu, nempe inæqualẽ, & tunc quoque ferrinum pleuritide fiat; inordinatũ præterea, quia dum maxima eſt alteratio & conuulſio, fit ſuppuratio: hæticum vero ſeu ſtabilẽ, quia locum non mutat, ſed in membrana manet incluſum: crebrum, ac celerem, quia vapor multus putridus cor petit. Facto iam pure, deſinit inordinatio; minuitur inæqualitas, quia deſinit pugna caloris natui cõ materia concocta.

Rupto

- A** Rupto abscessu, latior, tardior, rarior, languidior fit. Latior, quia non amplius comprimitur arteria; tardior, rarior, languidior, quia simul cum sanie, spiritus multi euolant, & vapores putridi cor perunt, vt animi defectio quandoque sequatur. Hinc scribit Hipp. 7. aph. 8. *A tuberculi introrsum eruptione, vomitio, & animi defectio fit.*

Marasimum, est quidam triplicem contineat, nihilo minus ego duplicem tantum inuenio, febrilem, ac non febrilem. Neque enim reperitur vnquam defectus humidi radicalis, absque refrigeratione. Horum ergo pulsus vel sunt vtique Marasimo communes, vel specierum proprii. Communes sunt duri, parui, languidi, cminuli, seu decurtati in vnico idu, hecicique, id est stabiles. Proprii sunt marasimi senilis, id est frigidi cum siccitate, rari ac tardi; febris autem marasimodes, vel principalis, vel symptomaticæ, ex inflammatione scilicet, vel erysipelate prodeuntis, crebri, quales etiam in phthisicis apparent: quarum omnium ratio cum sit in promptu, non est pluribus proponenda, sed ad alia iam nostra conuerti debet ratio, ad futurorum scilicet præsignia, de quibus statim dicere aggredior.

*Marasimum
quæsitum.*

CAPVT IIC.

De fulgurum præsignio, & primo, quænam sint præsignificanda

- T**ria sunt, quæ in morbis præsignificandi debent Ex tus, Tempus, ac Modus. Circa primum, quæritur, quo nam erupturus sit morbus, ad exitumne, an potius ad salutem: Circa secundum vtrum breui, an longo tempore: Circa tertium vero, an si moriturus sit quipsi iam, suffocatione, vel prostratione sit moriturus? Sin autem valetudinem sit recuperaturus, an sine crisi, an vero per crisin; & si per crisin, per quam, vtrum per abscessum, vel per effluxum, & denique per quem, vel abscessum, vel effluxum.

*Quæ sunt hæc
morbi de-
significanda.*

CAPVT IC.

Quis sit modus, quo hæc præsignificari possint.

- S**alus, aut exitum in morbis, ex facultatis vitalis comparatione, est morbo, facile prædicti potest. Cognito enim ex vna parte affectionis genere, loco affectio, causa, affectionis magnitudine, motu, more, symptomatum numero, ac vi: ex alia veto, facultatis robore, aut imbecillitate; Si facultas sit morbo inferior, mortem: sin superior, salutem prædicemus.

*Vnde salu-
tu & ceteri
supradicti
fit desumpti-
da.*

Imbecillitatis nomine, momentaneam breuemque non intelligimus, quæ humores, aut spiritus sequitur: Ex qua fallax admodum plerumque desumetur iudicium; sed illam accipi volumus, quæ vel solidorum cordis morbos consequitur, vel humorum quidem ac spirituum, sed non absque solidæ substantiæ læsione. Hæc igitur mortem minatur certam: Contra vero eiusdem partis robur, quod com modum sequitur temperamentum, conformationem atque vnitatem, certam salutem prænuñciat.

- T**empus autem mortis vel salutis, tunc expectandum est, cum natura acius aduersus noxiam causam sit pugnatura; siue tempus hoc fuerit septima, siue decima quarta, a liæue dies. Enim cum circa hoc tempus virtus fuerit morbo superior, statim salus succedet: Sin vero inferior, eodem tempore contiget mors.

*Quæda
salutis aut
moris tem-
poris expe-
ctandum.*

Quod autem modum mortis concernit, non quid suffocatione, an dissolutione, an vtroque modo æger sit moriturus, ipsa affectio, atque locus demonstrabunt. Etenim omnis morbus ex impleione, vt obstructio, compressio, impletio, à materia multa, crassa, cum tumore, & citra tumorem, cum fluxione, & citra fluxionem, in corde, pulmonibus, faucibus, gutture, cerebro, ore ventriculi, vtero, arteriisque omnibus, ac venis, suffocatione; omnis autem morbus ex inanitione, vt inrempies sine materia, calidæ, frigidæ, siccæ, humidæ, ac compositæ, cum euacuatione & citra euacuationem, cum veneno, & citra venenum, dissolutione interimunt. Sicuti quæ vtrumque continent, vt pestilentes quædam, & ardentes colliquatiæ, vel præcipuæ, vel ex inflammatione oriundæ, vtroque modo possunt interimere.

*Modi mor-
tis aut salu-
tis, & affec-
tionis, & lo-
cus demon-
strat.*

Modus autem salutis partim ex natura, partim ex magnitudine, ac motu morbi comparatur. Calidus enim morbus in parte calida, cum veloci motu, crisi, & ea quidem per effluxum facta, iudicabitur: Frigidus, paruus, tardus morbus, paulatim soluetur; mixtus

ex virisque, crīsin quidem habebit, sed potius per abscissum, quam per effluxum. A

Ceterum de his alias, neque enim omnia, quæ ad futurorum præſagia ſpectant, huc transferemus, ſed ea duntaxat, quæ pulſibus ſunt propria, de quibus nunc in ſpecie diſſe-
rendum.

CAPVT C.

Ex quibusnam pulſibus mori prædicti poſſis, & primum de languido ex diſſolutione.

*Rari pulſus
offendunt
ſummam
facultatis
vitalis im-
becillita-
tem.*

Inter pulſus, qui omniū maxime futuram mortem prædicere poſſunt, illi ſunt, qui ſum-
mam offendunt vitalis facultatis imbecillitatem, ex diſſolutione emerſam; Secundo B
loco, qui proſtrationem atque ſuffocationem indicant; Tertio, qui ex ſuffocatione duntaxat exoritur.

In prima ergo claſſe ſunt aboliti poſt hōs languidiſſimi, miniſimi, tardiſſimi, ſive rari, ſive crebri.

*Rari pulſus
crebris dato
nom.*

Rari enim natiui caloris extinctionem, à cauſa frigida factam; creberrimi vero, quæ-
ſus ſunt formicantes, eiſdem natiui caloris diſſolutionem, declarant: Ex his multo dete-
rioribus eſſe, inquit Gal. raros, ipſis crebris *2. de præſag. ex pulſ. 3.* dum ſcribit: *At crebris autem quidem ſumma, non ſecus, ac ſyncopa, adeſt febribus vehementer virentibus, quæ non proſuſa ſunt pernicioſa. Rari autem vero nunquam vacat periculo, ſicut nec remiſſio, nec paruitas: ſiquidem tres hæc diſſerētia pul- ſuum cum ad ſummum perveniunt, perpetuo ſunt periculoſa.* C

Ceterum hac in parte leſtotes moneo, ne ſolis ſint addiſti auctoritatibus, lociſque, ſed diligenter conſiderent, qualiſnam ſit, tam extremæ raritatis, quam crebritatis, imbecillitati connexa, cauſa. Invenient enim pro cauſarum varietate, aliquando crebrum, raro eſſe deterius, quandoque autem rarum, crebro. Si enim raritas eſſentiali cordis in-
temperie ſit c. borta, omnium maxime eſt lethalis: Si vero per conſenſum à liene, vtero, oreque ventriculi prodeat, non item.

*Rarus pul-
ſus rariſſi-
ſus lethalis.*

In buſimo dicebat Gale. *4. de pulſ. cauſ. 23.* pulſus eſſe raros, tardos, paruos, languidos, nec tamen neceſſario lethales ſunt; In affectionibus hyſtericis non modo ad paruitatem, languorem, raritatem, & tarditatem deveniunt, ſed & ad aſphixiam, in qua tamen pauce inveniuntur, quæ intereant. D

Circa acceſſionum valde refrigerantium initia, pulſus ſunt viſque adeo parui, tardi, ac languidi, vt non paucos etiam Excell. deceperint Medicos, qui patientes iam iam morituros putabant, cum tamen ſuperueniente febris augmento, nil periculi continuiſſe declararent.

Hiſtoria.

Sed & in melancholicis non raro ſiunt pulſus paruiſſimi, rariſſimi, tardiſſimiſque ſine vilo vitæ periculo. Dum hæc ſcribo, patientem habebam melancholia laborantem, Ariminenſem, cui pulſus eſt viſque adeo languidus, parvus, rarus, ac tardus, vt inter vnam & aliam diſtentionem, ſex ad minus aliz diſtentiones in quocunque pulſu moderatæ etiam raritatis cadere poſuiſſent. Ex quo certo mihi perſuadebam, illum tandem integre motum amiſſurum. Et eo poſſiſſimum, quod illud idem non ſemel ſuperioribus annis ſibi contigiffet, ac per plures meſes perduraſſe patiens reſerebat; Nec tamen fuit illi vnquam lethalis, imo vero nunc ſatis bona frui: ur valet: dine. Itaque non omnis languidus, rarus, parvus, ac tardus pulſus eſt lethalis. Sed neque omnis creber, quamvis languor, paruitas ac tarditas illi ſit connexa: Cum enim crebritati accedat languor & paruitas, ex humorum ac ſpirituum diſſolutione, ſed abſque ſolidæ cordis ſubſtantiæ inſignitaxione, malus quidem eſt hic pulſus, ſed non perinde exitialis, atque eſt ille, qui ſolidorum intemperie ſequitur, qualis eſt vere formicans vocatus. Hinc Galenus libro de pulſ. ad Tyron. *11.* acutas ſyncopas, ait, formicantem comitari, quia ſyncope acuta ſit ex cordis corpore eſſentialiter affecto, imo vero & maligna febre tentato, vt docuit idem Galen. *3. de pulſ. cauſ. vltim.* his verbis: *At facultatem, quæ à febre cacoethæ diſſoluitur, formicantes conſequuntur.* E

*Hiſtoria
Languidus,
rarus, par-
vus, tardus,
ac creber
pulſus eſt
lethalis.*

Hoc ergo modo tam rari, quam crebri, quandoque certam, aliquando dubiam pollicentur mor-
tem.

CAPVT CI.

De vermiculorum prasagio.

Post predictos pulsus prauis admodum sunt vermiculosi. Cum enim omnes sequantur corporis excedentes euacuaciones, nemini non constar, alimenti ac spirituum defectum facile mortem subsequi. Sed quia ante diximus, illam facultatis dissolutionem malam esse, quæ cordis sequatur intemperiem, non spiritus, aut humores, idcirco immmediate fluxionis causa, in hoc etiam pulsū est attendenda: Nam si fuerit error externus, ut hæmorrhagia ex vulnere, vel recenti anastomasi: aut ventris deiectio, vel vomitus ex prauo aliquo cibo, vel potu, aut medicamento: Vermiculosis non necessario est lethalis: Quod si sanguinis excretio, magnum vlcus, antiquæ anastomosis sequatur, siue hæc in venis pulmonis, siue vteri, hæmorrhoidum, iecoris, alteriusue partis inueniantur: Aut ventris subductio, vel vomitus, magnum pariter sequantur iecoris, aut ventriculi morbum, inflammationem scilicet, vlcus, vel quid tale, vermiculosum oportet appropinquare lethalem euadere. Hinc Galenus 2. de prasag. ex puls. 9. scribit vermiculosos aliquando fieri in illis, in quibus ex nimia humiditate computruit pulmo. Ex quibus verbis, contradictionis cululdā in Galen. colligi potest conciliatio. Cum etiam Galenus 3. de puls. caus. cap. 17. hæc de vermiculosis scribat: *Cur: cholera, magnos aliusque profluvium muliebri vocatum, omnia denique, quæ ex corpore vacuando facultatem dissolunt, committunt pulsus vermiculantes, ac facultatem, quæ a febre casetibz dissoluitur, formicantes consequantur. An quia pulsus, qui sunt vermiculantes, tardus esse omnino, & rarus debet: neque enim possit fieri, ut prior arteria pars prius moueri videatur, neque ut postea veluti circumscriptiones in una distensione multa, nisi admodum simulque rarus sit motus.* Sane locus iste docet, vermiculosos esse absque febre, quia tardos, et rarios vult illos esse: At si sunt absque febribus, quomodo ergo secundo de prasag. ex puls. 9. de vermiculosis hæc scribit: *Quamobrem etiam sine febribus fere solet largi vacuatiuibz succedere, &c.* Nota illa verba, *etiam sine febribus*: Nam si etiam sine febribus, ergo & aliquando in febribus. Confirmatur, quia si sunt in pulmonum putrilagine, nulla est ratio, cur putredo vique adeo cordi propinqua, febrem non inferat. Quod si concedamus illos cum febribus reperiri, falsa videtur sententia 3. de puls. caus. illos esse raros, ac tardos.

Pro contradictionis solutione, dico vermiculosos pulsus, sane tunc febriles fore, cum larga humiditate computreat pulmo. Ad locum vero tertii de caus. puls. dico, quod tamen si ratione febris deberet pulsus euadere celerior, attramen ob summam facultatis imbecillitatem, febremque exiguam, vel raritas potius, ac tarditas consequetur, quam frequentia, vel saltem fiet talis celeritas, ac crebritas, quæ in comparatione ad alios pulsus febriles, qui his semper multo sunt celeriores, ac frequentiores, tarditas ac raritas dici poterit.

Contradi.
Et non solus
est.

CAPVT CII.

De myurorum prasagio.

Etiam si myurorum nullus sit, qui periculo vacet, est tamen inter illos non paruum discrimen: Etenim myuri in vnicuique deteriores sunt myuris in acervo. Ex his vero omnibus deficientes non reciprocissimi sunt: Hos sequantur deficientes reciproci: omnium minus mali erunt absolute deficientes.

De eminulis vero, ac prominulis, non idem semper pronuntiandum: Etenim illi dumtaxat pessimi sunt, quos parit facultas languida, nullo autem modo grauata. Contra vero periculi expertes erunt illi, qui in accessionum bene refrigerantium initio sunt, qui quidem duplici ratione, à prioribus distinguuntur: Primo, quod transacta refrigeratione, non amplius trianguli rationem repræsentent, sed circuli: Priores vero perpetuo trianguli cuspidem præ se ferant.

Secundo, quod qui ex facultatis prodeunt imbecillitate, cum decurtato in acervo coniungantur, reliqui autem minime: Coniungi autem cum decurtatio, ratio docet: Etenim si adest vnius istius decurtatio, quæ maiorem annunciat facultatis imbecillitatem, nulla est ratio, cur non ad sit etiam collectiua, quæ minorem. Ut propterea non possim non mirari Galen. qui tamen si 2. de prasag. ex puls. myuros istos tam vnius istius, quam plurimum,

Neque enim
vni pulsi
periculi vacet.

rium, simul aliquando coniungi concedat, dixerit tamen, eos, qui in vni eo sunt ictu, absque aliis reperiri posse. Mihi sane probabilius videtur oppositum affirmare, Myuros scilicet in acervo, utpote qui minus languidam habeant facultatem, esse absque myuris vnius ictus.

Sed quocunque modo res habeat, myuri isti lethales sunt, dum modo decurtatio imbecillitatem facultatis sequatur, non autem vitium instrumenti, vel naturale, vel temporaneum, compressionem scilicet: In hoc enim casu, nullus decurtatus vnius ictus erit lethalis, de quo alias diximus. Et hi tandem sunt omnes perniciosi pulsus, facultatis prostrationem significantes, atque futuræ mortis prænuntii, quos Galen. 2. de præfag. ex puls. s. complexus est, hoc ordine, atque his verbis: *Quare oratione summam repetita, sermonis huc finem faciamus. Omnes pulsus, qui longe à naturali mediocritate discesserunt, non sunt boni: languidissimus vera, et tardissimus, rarissimusque omnium pessimi sunt: ab illis minimus, mollissimus: inde creberrimus: at non celerrimus, vel maximus, sed sunt hi modice periculosi.* Ergo per illa verba, languidissimus, tardissimus, rarissimus, intelligit priores à nobis explicatos; per illa vero, inde creberrimus, Formicantes insinuat: per minimos autem, ac mollissimos, vermiculosos subaudiendos existimo: denique per minimos durissimosque, etiam alios plurimos complecti possumus, de quibus mox dicam, attamen decurtatos quoque complexum esse arbitror: quales vero alii sint, nunc edisseramus.

CAPVT CIII.

De intermittentiâ præfagia.

Intermissio pulsus collectiua, quanquā apprimè periculosa, absque distinctione, & præmeditatione accepta, potius ignominiam, quam gloriam Medicis prælagientibus asferre poterit. Etenim quandoque naturalis est, ut ex lib. de præcog. ad Posthumum, antea cum Gal. docuimus, quæ nihil mali in se continet.

Ad temporaneam vero quod attinet, maxima habenda est ratio ætatis, in qua sit, longitudoque ac breuitatis intermissionis, frequenter ac raritatis, continuitatis, aut redditus periodici, ordinis, atque inordinationis: Denique vero intermissionis simplicis, vel cum aliis connexæ inæqualitatem, quas postea explicabo.

Igitur ad ætates quod attinet, docet Galenus 2. de præfag. puls. 4. in iuuenibus & adultis, maxime periculosa esse intermissionem, in pueris minus, in senibus haudquaquam.

Ad longitudinem vero, ac breuitatem quod spectat, nemo venit in dubium, intermissionem quo longior fuerit, eo periculosiorem fore. Ut propterea vnius tantum distensionis amissio, non sit quidem spernenda: duarum sit periculosior: plurium omnino lethalis censetur.

Ad hæc intermissio, quæ frequenter fit, omnium est lethaliissima, quæ per rariora interualla minus.

Quarto perseverantia quoque est attendenda: Nam intermissio, quæ accedit & recedit, minus; quæ vero perstans est, magis est periculosa.

De ordine vero, atque inordinatione ita censeo (quanquam inferius de hac re disputabo) ordinem in hoc casu deterius esse, quam ordinis carentiam: Ille enim stabilis, firmus, atque assiduus difficilè ostendit affectionem; hic vero mobilis, ac vaga, quæ à natura quandoque superari potest.

Denique quod inter mittendum periculum maius aut minus declarat, sunt inæqualitates aliæ collectiue, vel vnius ictus, vel ambæ his quam æquissime connexæ. Pro quarum numero ac natura, varia quoque præcendi ratio comparatur. Cum enim intermittentibus, quandoque copulentur dispares tantum magnitudine, vehementia, acceleritate, aliquando intercurrentes, Non raro microti & interrupti, ut antea nos abundè docuimus, & ex Gal. lib. de puls. ad Tyron. 11. atque 4. de caus. puls. vbi de lethargo, peripneumonia, aliisque id genus affectibus loquitur, aperte colligi potest: Si illi connectantur, qui simul cum arteriarum compressionem, languidam quoque ostendunt facultatem, usumque, vel valde auctum, vel valde imminutum, hi omnium maxime lethales erunt, quod si neque magnam facultatis exolutionem, nec validum usum à naturali statu recessum ostendant, hi nec admodum lethales, nec quandoque villo modo periculosi erunt.

Qui-

Remo-
di
Myuris
primam po-
tius inter
pulsus
classis sui
referendi.

Intermissio
ordinata,
deterius est
inordinata.

Qui diffi-
cilius
per arteriarum
compressionem le-
thales.

A Quinam ergo facultatis imbecillitatem, vsumque apprime auctum delectant & intermittentes ereberrimis, intercurrentibus, diicrotisq; duns connexi, qui simul cum crebritate sunt quoque tardi, liguidi, ac parui, Hi sane, vtpote qui vsum auctum, imbecillam facultatem, instrumenta que valde compressa significant, semper lethales sunt: Neque ego vllum ex his seruatum vidi, qui tales habuerint pulsus, vt hoc potissimu in anno obseruari.

Periculosissimi etiam sunt illi, qui præter intermissionem, habent quoque raritatē, tarditatem, paruiorem, imbecillitatemque maximam. Hi enim emorientem ostendunt facultatem, atque innari caloris extinctionem, vt *a. de præfag. expuls. 4.* docuit Gale. his verbis: *Si raritas quidem pulsuum tantam habet perniciem: Si intermittentes multo maiorem, si-*

B *quidem generantur hi prodiciat raritate, ac cum procurantur reuertuntur per raritatem ad pristina medietatem.* Sunt ergo ex intermittentibus hi iam enumerati omnium maxime lethales.

Qui vero post intermissionem euadunt maiores, celeriores, vehementiores, minus habent periculi.

Sed neque admodum periculosi sunt illi, qui dicroros habent duos, non admodum tardos, paruos ac languidos, potiusque raros, quam crebros. Hi enim cum febriculolum affectum minime sequantur, sed potius causam frigidam, crassitie, ac copia suffocantem, non est à ratione alienum, facultatem posse materiam hanc concoquere, attenuare, dissoluere, & tussi, aliaue quadam via expurgare, vt tandem intermissio, aliaque omnis infrequentius, ac facilius continget, si dicroti, intermittentibus connexi, minime fuerint duri. Cum enim dictum sit, hos fieri pugnante facultate expulsi: nec eum noxia materia, quâdoque etiam minime et assa, aut multa, nec per essentiam in eorde existente, sed tenui, ac vaporosa, per consensum ab aliis partibus cordi impertita; sane multo facilius superabis naturam materiam paucam, quam multam, tenuem, quam crassam; alunde confluentem quam cordi infixam, aut essentialiter inhzentem; siq; intermittens hic, dicrorusq; non durus, plerumque vacabit periculo.

C Vt vero aliqua certa habeatur in his præfagis ratio, omnia, quæ pulsibus istis insunt, accurate admodum obseruanda.

D Etenim si dicroti pulsationes habeant aliquid robotis ac magnitudinis, bene sperandum, sin minus, male.

Quando de dicrotis bene aut male sperandum.

Adhuc attendendum, sintne omnes distentiones, quæ intermissionem sequuntur, dicrotæ, vel non si fuerint omnes dicrotæ, maius est malum, si non omnes, adhuc distinguendum: quæ enim dicrotæ non sunt, vel paruæ, languidæ, ac tardæ existunt, vel contra: Primo modo, maximum est malum: Secundo autem minus.

Sed neque hoc sufficit, reliqua quoque sunt inspicienda; respiratio, vis animosæ, lingua, lotium, somnus, actiones motrices, reſtrictæ, appetentia, & reliqua id genus. Si enim facile spirent, nil timeant, non sitiant, dormiant, validi sint, mente consent, appetant, reliqua denique omnia bene habeant, optime sperandum; contra vero, si hæc, vel plura, vel

E omnia sint mala.

Duos habui hoc anno S. Iustini monachos, quorum vtrumque iure optimo Medicus quisque periculosissime habere dixisset, vtpote intermittente, dicroroquoque pulsu retarum, & vnum quidem eum palpitatione cordis, alterum sine palpitatione: Vterque tamen est senatus. Et senior quidem palpitatione cordis tentatus, biduo conualuit: Iunior vero, non nisi post septimam. Virique facta est materix defluxio à capite in laues arterias, & cor. idcirco vterque etiam seruatus elyſteribus, pilulis, expectorantibus, reuulsione materix ad nares, rotulis, bolis, epithermatibusque cordialibus; Sed de his alias: Nunc autē ad intermittentes rediens, cum interruptis quoque copulentur, quantum ex hac copulatione periculi habeant, in sequenti exponemus capite, in qua sigillatim de interruptorum præfagio verba facimus.

C A P V T C I V.

De interruptorum præfagio.

Sicuti præfagium ex intermittentibus acceptum, diximus non esse absque distinctione & præmeditatione proponendum: ita & in interruptis agendum esse arbitramur, vt sci.

vt scilicet, varias illius proponamus differentias, mox vero subiungamus, quznam ex his maius, quzue minus periculum minerur.

Interruptorum pulsi quid sit, quidam duo habet tempora.

Interruptorum ergo quidam habent tria tempora, quidam vero duo, vel vnicum.

Tria habent, qui in medio interrupti denuo reuertuntur.

Duo tantum, qui non interruptuntur, sed exteriorem amittunt quietem.

Vnicum denique, qui in medio interrupti, reliquam amittunt distentionis partem:

Interrupti pulsi duo sunt.

Interrupti qui si deteriorum.

Ex his deteriores, ni fallor, erunt, qui distentionis partem ex toto amittunt: Post ipsos illi, qui externa carent quiete, minus mali videbuntur illi, qui si quid in media distentione amittunt, recuperant tamen, ad motum redeunt: quorum cum non sit vnica differentia, sed multiplex, neque vnicum quoque apprime varium erit prafagium. Etenim vel habent priorem distentionis partem postrema vehementiorem, consequenter celeriore: vel posteriori priore; vel vtramque debilem, siue celerem, siue tardam, siue equaliter sine inaequaliter. Vtraque hzc postrema, omnium vnus ictus intermissionum quz tria habent tempora, est deteriora; duz priores minus male sunt; sed quz postrema ictus partem habet celeriore (in reliquarum comparatione) omnium maxime vocat periculo, vt pote, quz facultatem ostendit causis noxiis longe superiore.

In interrupto pulsi, si scilicet unum quoniam summo e Langue.

His ergo sic propositis, posset iure quispiam querere: vtra ex duabus interruptionibus sit deterior, an collectiua, an vnus ictus? Galen. 2. de prafage, expulsi de eam, quz vnus est ictus, semper altera deteriore esse putat; quod hzc in prima statim distentione artetias a motu prinet, illa vero non nisi post aliquas integras. Ego vero rem hanc satis controuerfam, dubiamque esse cenfeo, quia in interrupto pulsi, qui habet tria tempora, facultas nunquam in summo languida esse potest: Etenim si in summo langueret, nec magni ederet pulsum, nec semel interruptum recuperaret motum, at facit vtrumque, ergo languida esse admodum non potest. Magnum facere pullum, ex eo patet, quod tria habeat tempora, duo scilicet extrema, in quibus sit motus, & medium, in quo quies. Itaque ex eodem Gale. hic nunquam erit paruus.

Collectiua interruptio est periculis, si scilicet pulsi interrupti.

Quod autem motum recuperet, minime est probandum; Quomodo enim postremam comparemus partem priore, si post interruptionem non reuerteretur? Est ergo magnus interruptus hic pulsus; qui ergo fieri potest, vrin facultate vsque adeo valda, maius sit periculum, quam in collectiua intermissione? Nonne cum intermittit pulsus in acervo, amittitur ex toto motus? profecto: at vero minus est malum, fieri omnes distentiones, sed interruptas, quam nullo modo fieri. Hzc igitur cum sint dubia, & controuersa, egent interpretatione, ac conciliatione.

Ego itaque hac in re duo dici posse existimo: Primum est, pulsum in vno ictu interruptum duobus modis considerari posse; vel ratione loci affecti & affectionis, vel ratione facultatis lz fit.

Primo modo semper interruptus est deterior intermittente; quia in interrupto locus affectus est ipsum cordis corpus, affectio quoque est grauis in intermittente, vel non est affectum cor vel saltem non est affectum secundum corpus, sed secundum vasa: itaque hanc ob causam, magis periculosus est interruptus, quam intermittens.

Quod si ad facultatem respiciamus, profecto quamdiu vsque adeo viget, vt post interruptionem insurgat, quandoque erit validior, quam in intermittente, siueque variatone, modo hic, modo ille deterior dici poterit.

Pulsus interrupti tres differentie.

Alterum quod dici potest, illud est, interruptorum, vt paulo ante dicebam, tres esse precipuas differentias, quarum prima cum aliis duabus comparata, semper (ceteris paribus) est minus mala: Etenim tria habet tempora, idcirco aliquam continet magnitudinem reliqui habere non possunt, cum vnus illorum duo tantum, alter vnus duntaxat habeat tempus, postremaque; distentionis partem prorsus amissam contineat. Itaque hi duo ad intermittentes collati, sunt deteriores, prior autem non semper est deterior, sed adhibita distentione, quandoque melior, quandoque autem deterior. Melior enim plerumque est interruptus cum tarditate, deterior autem est celeritate, quandoque autem est conuerso. Est melior cum tarditate, tardus enim quatenus reuertitur, nec facultatis imbecillitate, nec febrem sequi potest. Non facultatis imbecillitate, quia magnus est; non febrem, quia tardus; Ergo ex sola duntaxat oboritur grauitate, quz admodum verenda non sit.

Interruptio autem cum celeritate pter causam grauantem, habet plerumque febrem connexam, quz semper maius minatur periculum, quam affectus minime si brilis.

Dixi

- A Dixi plerunque; non enim inficior celeritatem quandoque sequi calorem intra naturæ limites existentē, in quo casu magis grauata[m] annunciant facultatem tardi, quā celeres. Hæc tamen de intermittentibus, atque interruptis, ad intercurrentes nunc accedamus, si prius dubium quoddam de ordinatis, atque inordinatis propositum discusserimus.

CAPVT CV.

An pulsus inordinatus sit ordinato deterior.

- B H O c in capite illud paucis comprobandum, quod in præcedenti absque probatione supposuimus, inæqualem scilicet pulsum intermittentem ordinatum, inordinato longe esse deteriorem. Hæc fuit Gale. sententia 2. de præfag. ex puls. 13. dum scribit: *Eiusdem generis addidi, quod fieri possit, ut ordinis perturbatio, ex altero genere præstet ordinis alterius generis: Exempli gratia, qui magnitudine est inordinatus, vel celeritate, minus incommodus est intermittente in ordine aliquo. Item productus rarus, licet ordinem aliquem seruet, deterior est inæquali in vehementia, magnitudine, & celeritate.* Hæc Gale. loco citato. Quia vero loca quædam adduci possunt, huic repugnantia, idcirco his respondendū, & quomodo ordo sit in ordinatione deterior, aduersam esse, passim docet Gal. idcirco 3. de crisi. g. *vehementius inquit semper sit pulsus, & æqualior, atque magis ordinatus in optimis inclinationibus: debiliior autem atque inordinatior, & inæqualior in mortalibus.* Et lib. de puls. ad Tyron. in fine capituli de Leihargicis inquit: *maiores ergo lesiones inæquales, & ordinatos efficiunt, maiores, inæquales, & inordinatos.* Si ergo res ira habeat, videntur inordinati pulsus, ordinatis longe periculosiores. Pro contradictionis solutione, distinctione opus est.

Intermittens inordinatus, et diu natus est deteriorum.

Ordo naturæ familiari inordinatio eadem natura.

- C Ordo igitur atque perturbatio in pulsibus aut sunt eiusdem generis, aut diuersi. Si eiusdem generis, aut ambo pulsus mali sunt, aut ambo non admodum mali, aut alter eorum malus, alter non item.

Ordo & inordinatio non distinctæ.

- Si ambo sint mali, deterior est ordinatus inordinato: Nam ordinatus cum certo est coniunctus exitio, inordinatus autem cum incerto: ille enim firmam stabilemque indicat affectionem, hic autem variantē, nec in vna magnitudine, vel specie, vel regione permanentem. Cum ergo facile minus possit copia, formeque & locus in melius mutari, idcirco inordinatio hæc cum mala ordinatione collata, minus est mala.

Quando inordinatio non ordo deterior.

- D Quod si nulla ex his fuerit admodum mala, deterior plerumque est inordinatio ipso ordine. Ordo enim causam ostendit permanentem, quæ in deterius non permutabitur. Inordinatio variantem, quæcum aut copia angere, aut specie mutari, aut in nobiliorum commigrare locum possit, & morbum grauiorem, & inordinationem ordine deteriorem reddet.

Quando inordinatio deterior ipso ordine.

- At vero si ordinata inæqualitas sit mala, inordinatio non perinde mala, ordinatio sane inordinatione est exitiorior; contra vero inordinatio est ordine deterior, cum hæc fuerit mala, ordinatio, ex non malis.

- E Quod vero de eodem genere dico, idem de diuerso intelligendum. Etenim si ordinata inæqualitas fuerit, verbi gratia, intermissio, inordinata autē disparitas tantum, inordinatio præstat ordinem. At si ordinatio fuerit disparitatis duntaxat, inordinatio autem intermissio, ordo inordinationi præstabit. Hæc est Gal. sententia 2. de præfag. ex puls. 13. Ex quo constat, quid dicen dum ad locum tertii de crisi. b. Etenim cum pulsus ex magis inordinato magis ordinatus euadat & æqualis magis, optimum est signum; at si deteriori inæqualitati ordo accederet, maximum minaretur malum.

- F Ad librum vero de puls. ad Tyron. dicimus inæquales, inordinatos, maiores facere lesiones ordinatis, cum ordinati copulantur inæqualitati minus periculose, quam sit inæqualitas inordinata. Idcirco non est audiendus Valesius, qui 3. contra. pro huius contradictionis solutione, inquit Galenum iunioribus scripsisse. Etenim iunioribus breuia quidem æ facilia sunt scribenda, non tamen falsa: At falsa est hæc Galen. sententia, nisi eam hac distinctione intelligatur, idcirco iuniorum animis non est inserenda. Ex iam dictis patet, cur nos in præcedenti capite dixerimus, ordinem esse in ordinatione deteriorem. Etenim de intermissione, & inæqualitate exitiali loquebamur, in qua ordo est deterior in ordinatione.

Tamet si Intercurrentes pulsus non modo salutis ac mortis præfagia esse possint, verum etiam modi salutis, attamen hoc loco, vt mortis prænuntii, non aliter considerabuntur.

Pulsus intercurrentes, quomodo sit lethalis.

Non est ergo intercurrentis lethalis, ratione facultatis languidæ, sed ratione magnitudinis affectus, accepta magnitudine ratione propriæ essentia, & ratione partis. Sine enim pulsus iste sequatur febres continentes, siue periodicas, semper necessum est eorum magno incendio flagrare. Si enim non atdeat, non fiet intercurrentis. Hinc ostendimus alias cum Galeno, in lethargicis minus fieri intercurrentes, quam in pneumonicis, quod in illis focus caloris sit à corde remotior, in his autem proximior. Sicuti ergo ad intercurrentem producendum, opus est calore vehementi, qualis est in synochis, aut peripneumoniis, ita necessaria est aliqua virtutis constantia; alioquin non possent absque virium robore, & distentiones conducipari. Fieri enim pulsus intercurrentem, nil aliud tandem est, quam distentiones conducipari.

At vtro statim quæret quispiam, si in intercurrentibus facultas valet, quomodo ergo ab Archigene, consentiente etiam Galeno, in peripneumonicis, qui periculosissime habent, concedatur. *2. de præfag. cap. 5.* Respondeo dupliciter, primo intercurrentes in pneumonia ac synochis reperi, circa morbi initia, ubi adhuc virtus valet; deficientibus autem viribus deficere intercurrentiam, vt proxime in Nicolao Barbaro obseruauimus, continente febre maligna laborante, cui per quatuor tantum priores dies intercurrentes adfuit, reliquis autem quatuor postremis, quibus vixit, desuit, & primo in intermittentem, mox in paruum ac languidum, absque intermissione finiuit.

Secunda responsio est, intercurrentem reperi quandoque etiam in proxime moritris cum virtute languida, non tamen solum, sed aliis plurimis, ac grauissimis inæqualitatibus connexum. Hoc facile quæque concedet, si ea memoria repetat, quæ de peripneumonicorum pulsibus, ex Gal. sententia adduximus. Neque enim duntaxat intercurrentes sunt, sed & diuor, aut interrupti, vel intermittentes, vel multiplici modo inæquales. In hoc ergo casu intercurrentis pulsus est lethalis, quandoquidem non ideo sit, quod modico sit granata facultas, vel quod moderate valeat, sed quod ex intermissione, calor mirum in modum auctus, diastoles conducipationem pariat. Aliud est ergo vitalem facultatem ad hoc, vt noxia expellat, plures adhibere motus; aliud eandem coactam, propter impeditas distentiones, easdem conducipare illud salutare, hoc mortem significat. Talis ergo est intercurrentis natura, talia sunt mortis, aut salutis præfagia ab eo desumpta; quæ ad modum salutis spectant, suo exponemus loco.

CAPVT CVIL

De Præfagio disparium pulsuum in vno ictu atque in acerno.

PRÆfagium, quod ex disparibus pulsibus desumi potest, eodem procedit modo, quo ex interruptis, atque intermittentibus. Quamuis enim ratione affectus grauantis, disparēs vnus ictu, collectius videantur deteriores, attamen ratione facultatis, quæ satis viget non semper deteriores censendi sunt. Etenim si in duo, quandoque etiam in tria diuiduntur tempora, parui certe ac languidi minime esse poterunt. Et copiosissimum, quod horum quoddam in vtroque tempore celeres inuenias, alios quidem celeriores in principio, quam in fine; alios in fine, quam in principio; quos (sane prout celeres) constar, imbecillitatem effatu dignam sequi non posse. Nam si vsus sit auctus, langueat autem facultas, pro celeritate, ac magnitudine, facit crebritatem, cum insigni paruitate atque imbecillitate, qualem in Formicantibus apparere diximus.

Disparēs pulsus in vno ictu, celerioresque potissimum in fine, quam in principio, minime sunt periculosi. Confirmatur, quia si non admodum exitialis est capricans, multo adhuc minus dispar; nam deterior est interruptio disparitate. Adde, quod disparitatem hanc celeritatis in vno ictu docuimus cum Gal. esse proprium illius febris signi, quæ sit inæqualis intemperies, ephemera etiam non excepta; itaque si sit in ephemeris, tertianisque benignis, omni sane caret periculo. At si periculosi non sunt disparēs celeritate profecto

Cur periculi non sunt disparēs pulsi in vno ictu.

- A**ffecto minus periculi habebunt dispares tarditate, quia vt antea docuimus, non sunt absq; virium robore, & febre vacant.

Inrer dispares autem celeritate, qui inæqualiter procedunt, periculo superant dispares æqualiter: Illi enim facultatem grauaram ostendunt, hi vero inæqualem tantum intemperiem: Atque ideo hi vt antea docuimus, in ephemeris, ac benignis, syncerisque biliosis apparent, illi in putridis, spuris, compositis, pituitosis, melancholicis, ac malignis febrib. Quid sit, vt neque omnes hi æque sint periculosi, sed illi magis, quoru finis est languidior principio: Et quorum duo tantum sunt, nec admodum sensibilia tempora. Illi antea minus ac minime, qui in tria distinguuntur, quales in quartanis fieri, ex Gal. antea docuimus. Ita ergo de disparibus in vno idu sentio.

B Quantum vero ad dispares in aceruo, hi longe sunt periculosiores, non quidem semper, sed enim minores, languidiores, tardiores, crebrioresq; longe superent magnos, minus languidos, celeres, ac raros. Etenim dum plures sunt languidi, ac parui, quam oppositi, semper natura est morbo inferior, opposito modo, est superior. Idcirco si pulsus ab initio morbi, minor ac languidior accedente concoctione, fiat validior, ac maior, statim coniectandum, mutatum esse malum morbi morem in bonum, periculi timorem in salutis spem; sicuti dum in priori permanet statu, de vita semper summopere verendum.

C Monco tamen hoc in loco, non esse attendendam disparitatem hanc collectiuam, inter pulsus principii, & incrementi ex vna parte, & pulsus status ex alia; multo autem minus conferendos esse pulsus eiusdem principii inter se: Etenim circa initia & incrementa, pulsus semper fere, vel ratione materię multæ, crassæ, ac frigidæ confluentis ad eor, vel ratione angoris ventriculi, aut alterius symptomatis, parui, tardi, languidi, que esse consueuerunt, vt propterea si ad hos tantum respiciamus, præsigium non nisi pessimum fieri possit. Itaque ad pulsus status respiciendum, hi inter se conferendi; & cum boni superat malos, bene sperandum; cum mali bonos, male augurandum, nisi hoc quoque tempore disparitas ex animi affectibus, amore scilicet, proueniat, quæ profecto peritum quemque Medicum potest decipere. Ne vero decipiatur, attente consideret patientis temperiẽ, ætatem, vitæ rationem, studia ac mores, factasque pulsus mutationes, ex alieuius ingressu, aut facta cuiusdam apud ægrum mentione, sic enim facile nouisse poterit, numquid Amor, an morbus malum pariat pulsum: quem aliquando consentos esse Erasistratum atque Gale, antea docuimus.

CAPVT CVIII.

De Vndosi pulsu præsigio.

Vndosus pulsus, pro causarum, ac locorum affectorum diuersitate, modo præsentaneum, modo non nisi longi temporis periculum ostendit: Est quoque nonnunquam salutaris.

Præsentaneum minatur periculum, si dicroto, vel alio insigniter inæquali, siue interupto, aut intermittenti eom misceatur. Hic enim lethargum, peripneumoniæ, aut si gn fiat, ex bile productam, vel arteriarum membranas insigniter affectas, quæ absq; euidenti periculo esse non possunt.

I Longiorem vero sed periculosam ostendit affectionem, cum minime celer aut dicroto fuerit, sed tantum scddurus, vt in hydropo, cum scirrho, aliquando illud fieri docuimus. Qui vero solâ hanc habet inæqualitatem, nulli duritiei admixtam, siue tardus, siue celer fuerit, periculo vacat, vt qui fit in pituitosa febre, aut sopore, vt in consimili affectione humida, de qua alias diximus. Quid vero de critico sit sentiendû, suo loco dicemus.

CAPVT CIX.

De Serrati pulsu præsigio.

Serrinus pulsus tribus modis maximum minatur periculum.

Primo cum serrinitas maxima, & valde fuerit conspicua: Hæc enim maximam, crudamque ostendit affectionem.

Secundo cum serrinitati crebreitas accedit; Hinc Gale. 4. de præsig. ex puls. j. exitialis pleuritidis signum inquit esse pulsum durum, paruum, ac creberrimum: neminemq; cuius esse seruatum, eo, quod magnitudinẽ inflammationis, in viriû imbecillitate ostendat.

Tertio lethalis aliquando est, cum durities illa insignis mitescat, ac quasi mollior euadat;

vadat: certum enim est suppuracionis signum, præcipue si inæqualitas quædam stabilis perseueret. Hinc Gal. lib. de puls. ad Tyren. atque 4. de puls. caus. g. suppuratorum pulsus, tam ante, quam post ruptionem describit his verbis: *Suppuratorum pulsus initio statim pulsus est: si vigescens inflammationis: ipsa enim initium est suppuracionum. Neminquam inæqualis est inordinatus, sed omnibus bellis. Cum autem pus prope sit maturum, cætera similis est, nisi quod æqualior sit: at cum erumpit, languidior, latior, tardior, rarior.*

*Quod si
pul-
sus est: cum
virescit tam
suppurat, ut
quoniam
suppurat.*

Ex his patet inflammationes tam suppurantes, quam suppuratas, & ruptas, pulsus efficit imbecilliores, & consequenter minus duos, non amplius proprie serratos. Quod multo clarius colligitur ex comm. quod habet Galen. ad caput de suppuratis ex liagoge desumpto. Ad quem locum lectores remitto.

Sunt ergo in maximo vitæ discrimine pleuritici, tam cum durissimo, quam cum minus duro pulsu, dum modo facultatis imbecillitas accedit. In durissimo enim magna ac eruda declaratur inflammatio: in minus autem duro, sed erebro, ac languido, & inæquali, suppurata: Nemo autem est, qui nesciat, maius esse pleuritici, aut peripneumonici discrimen, cum ad scirrhum, vel suppuracionem, quam cum ad resolutionem, vel evacuationem tendat; Et adhuc deteriore esse ruptum abscessum, qui non expurgeretur, quam non ruptum. Etenim qui adhuc ruptus non est, quamuis, quatenus inclusum detiner materiam; illam minime expurgari sinat, attamen nec latius vagatur, nec alias credit, nec cor putrido admodum vapore inficit, nec spiritus digerit: In ruptione vero, cum multi ali euolent spiritus, vires oportet effici languidas; vt hinc dicitur Hippo. 7. aphor. 13. *à tubercula introrsum ruptione fit animi defectio.*

*Quod si
pul-
sus est: cum
virescit tam
suppurat, ut
quoniam
suppurat.*

Præterea vero maximum impendit periculum, ne pulmones, lo-lique cordi affines exulcerentur, maiorque vehementia, vapores putridi, & virulenti in cor, atque totum corpus effundantur, vnoque verbo, omnes facultates, maxime vero vitalis destruantur. Patet ergo serratum tam valde durum, quam minus durum, ac creberrimum, semper lethales esse.

CAPVT CX.

De Dicroti præfagio.

Dicroti præfagium multiplex est, cum multiplex sit eorundem differentia.

De non duro, quidnam demonstrat, quidue ex eo præfagendum, antea docuimus. Etenim ostendimus, illum demonstrare vsum auctum, præcipue vero calorem, facultatisque expultricis robur; idcirco non necessario lethalem esse, vt in capite de intermit. tentibus declarauimus.

Ad duos autem vibratos quod attinet, cum non careant virium robore, minus sunt periculosi, quam non vibrati febriles: Nam dicroti non vibrati absque febre, non admodum exitiales sunt, qui vero fuerint cum febre, omnibus periculosissimi sunt censendi, quia & facultatis imbecillitatem, & gravem indicant morbum, cor, aut instrumenta grauante. Hinc solus non erit hic pulsus, sed cum aliis prauis connexus, nempe cum intermitteute, vel myuro, vel alio simili, quo in casu de ægro iam conelamatum, censendum est.

CAPVT CXI.

De Vibrati præfagio.

Ex hit, quæ de serrato, ac dicroto nuperrime diximus, quid de vibrato sit sentiendum, aperte constat.

Vibratus enim, vt solus est, ac constans, vires semper ostendit validas, ideo ex se nunquam erit lethalis. Sed cum modo vibratus, modo non vibratus exierit; siquidem vibratio desinat propter virium imbecillitatem, pessimum est; si propter vsum imminutum, bonum potius, quam malum significat. Sed quando in alias longe deteriores degeneret inæqualitares, vel alias sibi adsciscat, vt conuulsuam, tremulam, vel intermitteutem, aut huius generis aliam, tunc perinde, atque alii propositi, periculosissimus erit.

*Vibratus si
non ex-
cessus
inducit
febrilem
vibram.*

CAPVT CXII.

De Conuulsivi præfagio.

Conuulsus pulsus in omnibus acutis morbis, præcipue vero febribus, semper est exitialis: quod enim de ipsa conuulsione aliquando à diuino Hippo. 2. aphor. 16. scriptum est; *Ateliu est febris conuulsioni, quæ conuulsione febris superuenit*: id ipsum de conuulsuo pulsui est intel-

- A** intelligendum, melius videlicet esse conuulsio pulsi febrem, quam febri conuulsium superuenire pulsum. Per has autem febres, conuulsio, pulsusque conuulsus, semper deterrimus est, non quod nervosum genus siccat, atque ex inanitione spasmus oboritur, ut communis est sententia, à Gal. & Hippo, accepta, quam nos publice refutauimus, dum de conuulsione ageremus; sed quod vel cerebrum ita implicatur, ut etiam nervi ipsi in consensum trahantur, vel saltem eiusdem materia à loco ad locum permittitur: ut indicauit Hippo. 2. in primum proreth. 27. cum inquit, frequentes in phreneticis permutationes, conuulsione significare. Docuit enim Gal. in fine istius commentii, permutari omnes istas idco conuulsione significare, quod inflammationis materia à cerebri substantia, ad nervosam permittitur. Siue ergo auct. febribus succedat conuulsus pulsus, quia permittitur materia à cerebro ad nervos. siue quia à toto, vel parte inferna, cerebro ac nervis communicetur, siue quia in cerebro tantum existens, ita augeatur, ut etiam nervos lædat, semper n. alius erit: Eum vero, qui sit absque febribus ex inanitione, ut aiunt, quanquam inter periculosos ego quoque reponam, non tamen inter apprime lethales reponendum censco.

Neque. n. eorum sententiam accipio, qui omnes ex immodicis euacuationibus conuulsos ad nervorum siccitatem referunt: Falsū profecto est hæc opinio: Etenim ex euacuationibus immodicis conuulsus, potius ex vaporū, humorumque acrimonia, & motu nervosum genus vellicante id patiuntur, quam ex ipsa siccitate. Quo factum est, ut ego plurimos videim ex inanitione conuulsos, sanitati restitutos. Nec tane absq; causa: Cū enim per illas euacuationes, solida cordis substantia vel nihil, vel parum patiatur, nihil mali erit ex pulsu languido, vel conuulsio. Quod si cordis, cerebri, nervorumq; solida substantia grauitur sit afflicta, tunc conuulsus hic pulsus inanitionem sequens, erit omnino lethalis. Hinc conuulsio ex helioboro, ex fluxu sanguinis, ex nimia ventris euacuatione, ex hæmorrhoidibus, mcnibus, cholera, quandoque lethalis est, quandoq; autem minime periculosa.

Sed quid, dicit quispiam, tu ne ergo negas conuulsione ex inanitione factā? Non equidem; sed hoc tantum dico, spasmus, qui ex inanitione dicitur, non nervorum siccitate, sed ex irritamento fieri, ut alias publice demonstraui.

- Scio quidem non defuturos quamplures, quibus hæc minus arridebunt, ut porro **D** quæ nec cum Hippo. nec Galen. convenire v. deantur: sed quod sæpius dicere consuevi, id & nunc moneo, non esse cortici litteræ æquiescendum, sed medullam intimius erudam; si quis hæc fecerit, facile intelliget, nullam esse totius corporis vniuersalem conuulsione ex inanitione, id est ex nervorū siccitate orinndam, sed fieri irritari facultate ex pultrice ab acribus, vel alia ratione infectis vaporibus, humoribus, aut qualitatibus; quæ omnia ratio suadet, tunc fortius in nervos agere, cum ex corporis superpurgatione sint debiliores redditæ, vaporesque ipsi mobiliore, calidiores, acrioresque sint efflu. Tunc ergo dicitur ex inanitione conuulsio, non quod ex immodica siccitate, tanquā ex immediata causa nervi contrahantur, sed quod inanitionem excitentur, ac moveantur mordaces illæ causæ, quæ immediatæ sunt censendæ. Si ergo ita res habet, conuulsio, pulsusq; **E** conuulsus ex inanitione, periculosum quidem, non tamen deploratum corporis statum significat.

Multo autem minus exitialis erit conuulsus ex repletione absque febre, siue cum epilepsia, siue citra epilepsiam; & si cum epilepsia, vel essentiali, vel per consensum. Monoco tamen essentiali epilepsiam apprime frequentem, pulsumque conuulsium in ea factum, excoethalem esse, quod in apoplexiam facile transcat, ut proxime in Augustino Santonino senecæ annorum L X V. obseruauimus, qui cum decies ac pluries in die grauisima conuulsione epileptica tentaretur, tandem subita apoplex a extinguitur est.

CAPVT CXIII.

F

De Tremuli atque palpitanti pulsu præfatio.

Tremulus pulsus, inter valde exitiales semper est reponendus, palpitans vero nonnunquam inter illos, qui omni prorsus destituuntur periculo, aliquando autem & ipsè periculosus est.

Porro inter tremulos deterior est continuus, æqualis, permanens, hæticus Galeno vocatus,

O 3

Cur in dem-
tis febribus
pulsi con-
uulsus sit
periculosus.

Conuulsi-
on pulsi
ex inanitione
ne absque fe-
bre non com-
mune deplora-
tur periculosus
est.

Spasmus ex
inanitione,
necesse est
nervorū sic-
citatem.

Non datur
vniuersalis
conuulsio ex
nervorum
siccitate.

Quando res
mala pul-
sus sit peri-
culosus.

vocatus, maxime vero si frequentem animi defectum habuerit connexi, de quo loquebatur Hipp. 2. aphor. 41. *Qui frequenter, vehementerque absque manifesta causa, animo delinquit, de repente moriuntur.*

Post hunc non absque insigni periculo erit inconstans, & inordinatus, dummodo hic quoque frequentem habeat syncopen; Hi enim cor per se laesum esse declarant, priores quidem ex graui intemperie sine materia; Reliqui vel ex intemperie, vel ex alio quouis morbo cum materia.

Quod si animi defectus non adsit, motus hic palpitationem potius, quam ad tremorem accedit, & vt plurimum vacat periculo. Ex vaporibus enim, aut humoribus, aliunde in cor irrudentibus exoritur, qui facile alio transferri, digeri, euacuarique possunt. In eo autem distinguuntur hi à prioribus, quod illi sint continui, hi vero interpolati, atque periodici. Rursumque ex solidis facti, hystici erunt, atque constantes, parui, languidi: ex humoribus autem, inordinati, inconstantes, maiores, validiores. Hos puto esse præcipuos pulsus, à quibus mortis sunt perenda præagia: eos vero, qui supersunt, aut salutares esse, aut certe minus periculosos, facile quisque experietur. Quid autem de præagio temporis salutis, aut mortis, ex pulsibus desumpto, sentiendum sit, iam iam exponemus.

CAPVT CXIV.

Quomodo ex pulsibus, mortis, aut salutis tempus præagiri possit.

Quemadmodum lethalius pulsum quidam maius, quidam vero minus periculum prænuntiant, ita & eorundem alii citissimam mortem, alii vero post aliquod tempus tutam significat.

Qui pulsus proximo futuram prædicant mortem.

Proxime futuram portendit asphixia, deinde languidissimi, tardissimi, rarissimi, qui duas aut tres habent istum intermissiones, Tum formicantes, mox myuri omnes, deficientes non receptoci, em nulli quidam, diœti duri febriles, vermiculosi; in superpurgationibus facti, quæ morbos tam acutos, quam chronicos graues consequuntur. Hi omnes, raro vnam vel alteram de egrum transire permittunt. Reliqui omnes mali, eam moris diem expectant, quæ proxime critica sit futura, horamque in qua grauius afflictabatur æger, pulsuque deteriores, diebus prægressis habebat.

Soluti tem poris prædicantur.

Salutis autem tempus, ex coctione, ac crisi futura facile prænuntiat.

Quomodo autem coctio est pulsibus comparari possit, & quomodo crisis, & per quæ, in sequentibus declarabimus.

CAPVT CXV.

Qui pulsus coctionem, aut cruditatem significant.

Nilh extra rem me dicturum existimo, si dum pulsus coctionis aut cruditatis nuntios explicare profiteor, ea in medium afferam, quæ de pulsum mutatione ex somno proposuit Gal. lib. de puls. ad Tyron. & in commentario ad hunc locum, quem habet idem Gale. 3. de caus. puls. cap. 9. ita que in lib. Isagoge sic scribit: *Iam somni etiam sint, si quid aliud, secundum naturam, qui & ipsi variant pulsus. Dum incipiunt, minores, languidiores, tardiores, rarioreque reddunt: Dum progrediuntur, tarditatem pedetentim augent, & raritatem præsertim à cibo: at maiores sunt, & vehementiores. Cum remissiones fuerint, ad remissionem & paruitatem redeunt, tarditatem, & raritatem retinent.* Hæc dum Gal. 3. de caus. puls. 9. interpretatur, aperte docet, pulsus antequam coquatut alimentum, minores, languidioreque rariore ac tardiores esse, alimentato coctio, & subactio, validiores, atque prioribus oppositos.

Eadem est ratio coctionis humorum putridorum, quæ & ciborum, per somnum: Antequam enim natura noxios concoquat humores, oneratur, ac proinde pulsus reddit languidos, ac paruos, vbi vero iam superior extitit, validos, magnosque pulsus excitat. Itaque somnus & coctio in eo facta, facile coctionis, ac cruditatis pulsus docet. Hinc Galenus in comm. ad caput de pulsibus summi, hæc scribit, quæ ad vnguem hanc explicant veritatem. *Qua sit causa, cur coctiones per somnum sint meliores, non in ventriculo modo, verum etiam in venis, in arteriis, in omni denique animalis habitu, non est huius loci explicare, neque enim de causa, quamam illa sit, conuenit inter omnes Medicos. Equidem hoc in præsentiarum de illa dico: Facultas concoctrix se inaro per somnam recipit magis, & in alium. Ergo, quia inaro mouetur, & materiam conficit, primo, veluti imbecillior redditur, ac eneratur: paulo post cum fruatur alimento, quod conficit,*

A conficit, roboratur ipsa, & calor animantis crevit, ut, qui frigidiore cibis comederant, illico frigidiores se animadverunt, multique adeo illorum manifeste & horrent, & rigent, haud multo post sunt calidiores. Præinde, si maximus calor est, qui concoquit cibos, ac qui huic præsent motus (ut ratio fuit Hippocrati, qui foras tendunt, vigilias, qui intro, somnos conciliant: facillime rationem, ac naturam commencentur pulsuum mutationis, quæ ex somno proficiscitur. Idem Gal. 9. meth. 5. tunc, inquit, congruum est, aquæ frig. dæ exhibitionis tempus, cum crâtion pulsibus apparuerit. Apparet vero, quando ex patuis magni; ex languidis validi; ex inæqualibus æquales; ex celeribus minus celeres; ex frequentibus rariotes evaserint.

Quando frigida perit ex hibitus.

Qui ergo sint crâtionis, atque cruditis pulsus, brevitè dictum est: Ex quibus brevitatis, aut longitudo morbi prædici pot. st. Ex crâtion enim brevitatis ex cruditate longitudo prædicitur, si Galeno, & Hippocr. credimus, dicentibus. concoctionem crileos celeritatem, & salutis securitatem ostendere; ctudâ vero & in prauos abcessus conuersâ, aut mortem, aut acrisiam, aut longitudinem significare. Sed quia de crâtionibus & nunc, & alias quoque facta est mentio, huic tractationi de pulsibus, Deo Optimo Maximo auctore finem imponemus, si aliqua de pulsibus, erisim significantibus, coronidis loco addiderimus,

CAPVT CXVL

De pulsibus crâtionis.

Criticorum pulsuum quidam crâtion de longe pollicentur, quidam vero proxime futuram, ac bonam, alii denique futuram, sed imperfectam.

Crisin de longe pollicentur in æquales in æqualiter, in interrupti, intermitteres, intercurrentes, celeres ac frequentes. Hi enim grauari irritariue facultatem cum acuta febre significant, Crâtion vero acutorum est morborum, non quidem omnium, sed eorum, qui ex grauata, vel irritata produnt facultate.

Qui pulsus crâtion de longe producit, Crâtion nam morbum est.

Cum ergo adhuc parui, ac inualidi fuerint pulsus, distare crâtion ostendunt: si vero iam maiores murentur, proximam esse prænnelant. Mutatio autem fit ex languido in validum, ex paruo in magnum, post hæc etiam ex inæquali in æqualem. Hoc docet Gale. his verbis 4. de præfag. ex pulsib. 12. Languidus igitur pulsus nunquam altus est: ceterum magis, & minus vehemens, quo aliter simul, & vehementior euaserit, facultatis robur nunciabit, liberumque motum. Simul autem cum ea mutatione mutari prius necesse est in æqualitatem, ac primum magnos, &

Daltos pulsus contrariis multo fieri plures, deinde omnes ordine æquales: hi excretionibus, necesse est iudicentur.

Quoniam autem magnus euadat pulsus, cum futura est crâtion, secundum omnes sui dimensionis, altitudo tamen ceteris longe euidentior esse videtur, ut propterea Gal. loco citato altos pulsus proximæ futuræ crâtionis prænnuncios esse dixerit.

Hæc quidem & rationi consentanea, & sensui conspicua sunt: Quæ vero de contractionis celeritate subiungit, quod scilicet in futura crâtion celeritatem deponat, neque sensui perinde conspicua sunt, neque rationi apprimè consona.

Non quidem sensui conspicua: Etenim contractionem minime sentiri, in superioribus docuimus.

Exterum, quod ad hoc spectat, difficilis hæc contractionis notio facile superatur, si ad intervallum confugiamus, ut antea monuimus. Etenim cum febre intervallum inter duas diastoles fiat longius, certum erit argumentum amissæ aliquæ ex parte celeritatis in systole, itaque diminuta celeritas in systole, & altitudo in distentione aucta, crâtion proximè annunciat futuram, si Gale. credimus. Quod tamen, ut dixi, cum ratione haudquam conuenire videretur.

Etenim si, dum fit crâtion, expelluntur excrementa, quo magis expelluntur, eo contractio deberet esse celerior, vnde ergo dicit Galeno contractionis celeritatem, hoc crâtion tempore abiici? Adde, quod si in distentione facultas in se trahit, ut antea docuimus, quid quæso est, cur alii fiant pulsus per crâtion? Nonne in crâtion expellitur materiam profectio?

Excrementum Galen. p. 10.

Fat si expellitur, in distentione autem attrahitur, quid ergo est, cur in crâtion alta fiat distentio? Augetur difficultas, quia 2. de præfag. ex pulsib. scribit Gal. intercurrentes sæpe iudicationem attulisse, at intercurrentes est omni si ereberrimus quomodo ergo Gal. in futura crâtion contractionis celeritatem amitti dicit?

Si enim amittitur, rarior euadit pulsus. Hæc est dubitatio, quam vidit Gal. loc. cit. 4. scilicet de præfag. ex pulsib. 12, atque sic dissoluit (placeet, n. illius verbis huic adductis rem expedire, cum

cam facile ad modum, & appositè totum negotium explicent. (Non eadem est vitalis facultas, quam vocant, & nutritia, naturalisque: illius enim hac vnum opus est, pulsus generatio: naturalis, id quod familiare est, ad nutritionem allicere, & quod alienum est, excernere. præterea retinere, alterareque familiare alimentum: ad nutrienda enim corpora postulat hæc omnia, sicut ad nasci calorem tuendam mediocritatem, distentionem, & contractionem cordis, & arteriarum. Quam facultatem nec in stirpibus invenias, nec in animalibus frigidis, cuius generis sunt ostrea, & quæ petriæ, vel alia duris corporibus adnascuntur. animalia calida, potissimum sanguine prædita, apertissimam hanc facultatem, & vehementissimam obtinent. Hæc ergo in pulsuum contractionibus cunctis solum sublimissima excrementa, quæ obstitit calor naturalis mediocritati, sicuti in distentionibus, quæ se refrigeret, alliciat.

Intercurrentes non indicant crisi præsumunt.

Ad rationem vero de intercurrentibus dico, intercurrentes, futuram prænuntiare crisi, sed minime proximam: diximus enim paulo ante, pulsus inæqualitatem futuræ crisi esse signum, non tamen proximæ, sed remotæ: Cum enim proxima fuerit, tunc rolli inæqualitatem docuimus. Sic ergo & intercurrentis pulsus futuram prænuntiat crisi, sed non proximam; cum autem proxima fuerit, tollitur intercurrentia.

Qui pulsus præsumunt crisi ostendunt.

Ergo ut tandem receptui eanamus, pulsus illi, qui ex languidis validi, ex parvis magni, ac potissimum alti fuerint, inæqualitatemque deponit, & contractionis celeritatem (cum optimis coctionis signis) abiciant, optimam, proximamque pollicentur crisi. Quod si vel parum de contractionis celeritate amittant, vel contractionis signa usque adeo perfecta non habuerint, expectanda quidem iudicatio est, per exertionem, non tamen vndeque probata,

CAPVT CXVII

De pulsibus speciem crisis demonstrantibus.

EX pulsibus non modo crisis prædici potest in genere, sed & aliquando in specie.

Qui pulsus crisi præsumunt hæc ostendunt.

Cum enim altus ac vehemens omnis pulsus exertionis sit indicium, qui tamen non modo altus, sed & absolute magnus est, sanguinis fluxum; qui vero vndulos, sudorem prænuntiat. At si durus fuerit, nec secundum omnes dimensiones magnus, vel alui fluxum, vel vomitum portendit.

Vtrum vero vomitus, an alui fluor sit futurus, alia demonstrabunt, de quibus Gale. 3. de crisi cap. vii. quæ consulto prætermitimus: nam si in hoc loco proponerentur, iam pulsuum limites excederent, & integram naturæ crisi explanationem desiderarent. Quæ vero ad has crisi species ex pulsibus acceptas spectant, hæc partim ex 3. de præsig. ex puls. vlt. partim vero ex libris de præsig. excepiimus, ad quorum diligentem, frequentemque lectionem, benignos lectores hortamur, ut quæ nos in erudite, incompete, inordinare, effice, obseque de his protulimus, ipsi vel proprio Marte, vel alieno auxilio adiuti, solidiora, potiora, compra, magisque ordinata, completa, atque conspicua inueniant.

Nos hæc contenti, Deo ter maximo gratias interim agamus, qui hæc nostros labores, qualescunque tandem futuri sint, ad finem perduxerit, precantes, ut alios etiam suscipiendos, ad optatum portum sic perducatur.

A M E N.

F I N I S.

INDEX RERVM ET VERBORVM MEMORIA DIGNORVM, IN TRIBVS his libris de pulsibus Saxonie contentorum.

A.	
Abfcessu rubeo, quare vires flaccescant	160
Abundantia spirituum, quae pulsus excitet	26. d
Aegro Medicum decepturo, quomodo occurrendum	22. b
Aerem non esse rem simplicem	10. a
Aeris in spiritum vitalem, & huius in animalem conuersio	9. c
Affectiones cordis, ex quibus fit pulsus dicrotus durus	112. d
Affectionum ventriculi pulsus	130
Affectum cordis per effectum	67. b
Affectum magnitudinem in tribus consistere	144. d
Affectum pulsuum differens inaequaliter	124. b
Amorem variis excitare pulsuum inaequalitatem	109. e
Amor irrationalis quid	109. f
Animantium pulsus	109. b
Angina pulsus	150. d
Anomalia calor quomodo deficiat	8. b
Anxietas ventriculi pulsus	150
Arterias posse dupliciter considerari	62. a
Arterias duplicem continere spiritum	64
Arterias semper pluri habere spiritum quem sanguinis	137. d
Arterias spirituum inclusum cerebro communicare	10. a
Arteriarum qualitas verum perinde possit mutare cordis temperiem, ut qualitas cordis	79. b
Arteria, an simul moueantur cum corde, an vero peculiariter habeant motum	3. c
Arteria cerebri, an eodem moueantur tempore cum reliquis	3. c
Arterias simul moueri cum corde	4. d
Arteria quomodo descendunt à corde 4. d Et quomodo contrahantur. ibid. diffinitionem fieri à facultate pulvisifica	ibid.
Arteriarum motum nullum fieri à se, solum	8. d
Arterias omnes vitum habere motum à via mouente facultate producentem	3. a
Arteria durities quot modis fiat	110. c
Arteria quomodo grauetur	114. b
Arteriarum diffensio unde	129. c
Arteriam non esse digitorum pulpa durior em	42. c
Arteria vbi & quomodo tangenda 48. c. quid diffusum in arteriis, item quid fissum, quid altitudo 49. c. vbi latitudo ac profundior, ibi longitudo ibid. Quarum arteriarum motum magis aut minus sentiantur	ibid. f
Arteria loci, quot pulsus proferat	112. c
Arteriarum labilium affectum omnium generum inaequalitatem fieri	62. a
C.	
Calor quando magis abundet	107. d
Calor incrementum, quomodo celeritatem, magnitudinem, ac celeritatem pulsus pariat	21. d
Calor animantium quomodo deficiat	8. b
Calorem conservantia, quae	8. b
Caloris aucti causa	71. c
Caloris aucti causa, quomodo inter se distinguantur	72. a. b
Calor, qui pulsus aperi ventralatur, quid	2. c
Calor & frigus in merasme, in hydropo, fluore hepatico	80. d
Cafus ab auctore observatus	94. c
Carochi pulsus	149
Canda maris	114
Causas continentes quatuor modis inuicem complicari	109. b
Causa vitalem facultatem exsulentem 65. d. quomodo inter se distinguantur	ibid. e
Causa propter quam humores strantur, & intra retrahantur	118. d
Causa & morbi grauitatem, obstruclionem, vel compressionem facientes, quomodo in specie inter se distinguantur	
Celeritas & tarditas inaequalis, quot modis comparatur	33. a. d
Celeritatem inaequalem dignoscendam magno & vehementi pulsus opus esse	ibid. e
Cerebro propriam inesse facultatem motricem	8. a
Cerebri substantiam motum	3. c
Cerebri ventriculorum motum	3. d
Cerebrum duplicem habere dilationis & constrictionis motum	3. c
Cerebrum & pulmo, an firmiter, iuncti autem a domate pendentur	142. b
Cinetum pulsus	149
Complicatas trium causarum continentium	110. f
Complicatas quadruplex ex facultate & instrumentis consergens	120. d
Conformatio naturalis, quomodo pulsus variat	
Conformitas communis in omni parte	8. a
Conformitas causis in genere esse etiam in specie vero plures	112. a
Conuulsiones pulsus 149. partes conuulsiones conuulsiones exaltationis	135. d
Conuulsiones ex inuentione non fieri ob motuum fixitatem	16. c
Conuulsiones vniuersalem ex nervorum fixitate non dari ibi, conuulsiones determinatas à causa	121. c
Cordis facultas triplex	97. a
Cor non esse principium neruorum	13. d
Cordis substantiam non esse pulsus instrumentum	61. c
Cor temperies vitium perinde possit mutari à qualitate arteriarum, ut à qualitate cordis	70. b
Cor quale sit organum	117. d
Cordis motum nullum fieri à se, solum	2. d
Cordis motum interdum esse tantum explorantem	79. c
Cor motum, quot modis ab humoribus possit impediri	22. c
Cor quomodo per arteriam venalem refrigeretur	8. c
Cor non egere refrigeratione ab arteriarum diffensione facta, si d. aere à venali erit suscepto	7. b
Cordis interperies duplex	82. c
Cordis interperies inaequalem tripliciter accipi	82. a
Cor tribus modis posse esse frigidum, vicina vero calida	102. a. 103. a
Corde existente frigido, quomodo possit adesse febris	104. a
Cor quomodo & frigidum & calidum sine febre dici possit	ibid. d
Cordis affectus per effectum	67. b
Cordis affectiones, ex quibus fit pulsus dicrotus durus	112. c
Cordis inflammationem, & circa eam Galeni sententia	69. c
Cordis solidiorum triplex vitium	65. c
Cordis solidiorum interperies varias habere pulsus	66. b
Cor primario laesum proferre omnium generum inaequalitatem	61. d
Cor quomodo possit esse frigidum arteriis	70. d
Cor di partes propinquas, quae	105. b
Cor quomodo cum iecore & aliis partibus communicet	80. a
Corpus plenum ratione contenta materia quid 13. b. Et quid vacuum	ibid.
Crobritis pulsus duplex	72. a
Crisis fieri à facultate expultrice naturali non pulvisifica	91. d
Crisis acutatum esse morbum	162
D.	
Diffiliatimes quando pulsus dirotet & interruptus efficiat	94. d
Diastoles duas partes	12. a
Diastoles secundum Gal. interdum quatuor habere sensibiles ratione,	P

<p>rationes 10. s. duobus modis dignescit 40. a. non sentiri omnes distinctionem partes ibid. b. cur non tota sentiat ibid. c. Galeni in syllaba deprehendenda institutum 41. c. in quibus deprehendatur ibid. d. qui pulsus infine distinctionis 42. a. b. distinctionis servandis consistunt magnus & parvus pulsus 42. b. distinctionis celeritatem facile ex tactu cognoscit 52. d. dissolutes ad interitum, qualis sit proprietas 54. d. in qua affectus tanta sit eorum si gidas, ut parvus ac crebris faciat distinctionem 88. e. dissolutes duobus modis reddi breves 99. a. causa, à quibus interitum parat distinctione 124. f</p> <p>Dignorum pulsuum non posse redire ad suum locum 43. a</p> <p>Differens arteriarum vnde 129. e</p> <p>Dolentium pulsus 148</p>		<p>Hydrops pulsus 150</p>
<p>Emphysematis pulsus 150.</p> <p>Empisus pulsus 149. f</p> <p>Excessum incertum tripliciter fieri 32. b. certum vero dupliciter ibid.</p> <p>Excrementorum fuliginosorum causa 76. c. eadem distinctio ibid.</p>	I	<p>Locum edematæ laborare dupliciter accipi posse 147</p> <p>Inequalitatem intemperatarum quatuor modis fieri 145. a</p> <p>Inequaliter febri quid 16. C. quod & reperitur in ephemeris ib. d. quare in quatuor & quænam sit consuetudo 87. a</p> <p>Inequalitatem febrium propriam non esse eam quæ cadit inter systolen & diastolen 108. a</p> <p>Inequalitas pulsus duplex 13. C. Inequalitas Systematica duplex 16. b. duplex in iudicio in unequalitate ollectiva 25. C. omnium generum iniquitatem fieri affectu laudibus arteriis 62. C. quomodo inæqualis vsum ab aliis distinguatur 99. e</p> <p>Inequalitas variatatis pulsuum quæ sequatur causas 85. a</p> <p>Inequalitas autem pulsus non esse eorum propriam 109. a</p> <p>Inflammationes cum suppurantes quam suppuratae quales efficiantur pulsus 160. a</p> <p>Inflammationum pulsus 148</p> <p>Inflammatio cordis & circa eam Galeni sententia 69. c</p> <p>Instrumentorum vicia dupliciter considerari 97. c</p> <p>Instrumentorum vicia non esse proximam languorem ac paritatis pulsuum causam 59. f</p> <p>Intemperiem præter naturam semper dissolvere vires 82. b</p> <p>Intemperies nulla quomodo possit esse causa gravitatis 67. d</p> <p>Intemperies à quibus partibus cordis communicetur 12. a. c</p> <p>Intemperiarum inæqualitatem quatuor modis fieri 105. a</p> <p>Intemperies inæqualis quid 77. c. quod inæqualis pariet pulsus ib. d</p> <p>Intemperies inæqualis duplex 101. d</p> <p>Intemperies inæqualis duplex consideratio 108. a</p> <p>Intemperies inæqualis nomine quid Galenum intelligat 28. a</p> <p>Intemperies inæqualis propria duplex ibid. à quæ intemperies inæqualis inæqualis fiant pulsus ibi. Impropria inæqualis intemperies multiplex ibid. d. Intemperies inæqualis duplex 161. a</p> <p>Intemperies facultatis facta rebus destruit 87. c</p> <p>Intemperies cordis duplex 84. e</p> <p>Intemperiem cordis inæqualem tripliciter accipi 82. a</p> <p>Interrum prædictis vnde sumenda 151</p> <p>Interrumpere solidum cor dū variis habere pulsus 66. b</p> <p>Interruptionem pulsuum frequenter factam omnino esse periculosissimam 154. Interruptionem ar dinatam deterius esse inordinatam ibid. Interruptionem collectivam esse periculosissimam pulsus interrupto 156</p> <p>Irrem non esse causam efficientem pulsus proximam 157. f</p>
<p>Facilitatem intemperies facta rebus destruit 87. a</p> <p>Facilitatem cum vso 4. modis complerari 119. a</p> <p>Facultas valida, quous exciet pulsus 59. a</p> <p>Facultas valida proprii pulsus ibid. b. familiaris ibid. c.</p> <p>Facultas gravata proprii pulsus 61. b</p> <p>Facultas languida pulsus ob spirituum distinctionem 66. c</p> <p>Facultas languida pulsus proprii & familiares 59. d</p> <p>Facultatem suffocata causa per consensum 62. d</p> <p>Facultas suffocata quous exciet pulsus 60. b</p> <p>Facultas suffocata pulsus 65. a</p> <p>Facilitatem à nulla causa magis quam à tumore prouti 123</p> <p>Facultatem nunquam valere in febribus heclicis 80. d</p> <p>Facultas cordis triplex 27. a</p> <p>Facultatem vitalem excretionis causa 61. d</p> <p>Febris quid 104. a. quomodo cordo existente frigida febris adesse possit ibid.</p> <p>Febris inæqualis quid 86. c. quod & reperitur in ephemeris ibi. d. quare in quartanis & quotidianis sit consuetudo 87. a</p> <p>Febris inæqualitatem propriam non esse eam, quæ cadit inter systolen & diastolen 108. a</p> <p>Febrim tempora, quomodo dignoscantur 83. a</p> <p>Febris nuda, cur habeat inæqualem vsum 82. d</p> <p>Febris putrida nunquam habere pulsus differeat aequaliter 104. b</p> <p>Febris putrida phlegmorum, quo tempore mouetur 112. b</p> <p>Frigus & calor in mensum eod. in hydropo, fluore hepatico 84. d</p> <p>Fuligo, quando magis abundet 107. d</p> <p>Fuligo abundans contractionem pulsus molitur viribus non imminuit 87. d</p> <p>Fulgens aucta ac diminuta pulsus 75. d. fuliginosorum excrementorum causa 76. c. parum distinctio ibid. e</p> <p>Fulgens quomodo per arteriam venalem expellatur 82</p>	II	<p>Lethargum esse duplicem 131. d</p> <p>Lethargi pulsus 94. b. 141. 149</p> <p>Lethargi pulsus molle esse cum tensione 131. i. tensionis causa ibi. 84. d</p> <p>Loci, quibus cor valde consentit 84. d</p> <p>Locorum affectuum distinctionem non ex sole pulsus esse petendam 68. b</p> <p>Locus arteria, quous pulsus proferat 113. c</p> <p>Magnam aut parvam nibi dici, dum adhibet sit 16. f</p> <p>Magnam videtur affectum in tribus consistere 164. d</p> <p>Mam, in qua consistit pulsus, quomodo firmandum 48. d. mensura varia sit nato ad pulsus dignoscendum quid conferat 50. a</p> <p>Marasmus quatuorplex 151. a</p> <p>Marcor non esse proximam pulsus eminali causam 66. a</p> <p>Membranis affectu, cur pulsus modo fiant duri, modo molles duri, 146. e</p> <p>Mobilis omne, quod movetur, ariem quiescere secundum Gal. 13. a</p> <p>Modum morbi & salutis demonstrari ab affectione & loco 151</p> <p>Mortui modum demonstrari ab affectione & loco 151</p> <p>Mortui tempus, quando expellendum 151</p> <p>Morbi quous habeant dignoscenda 151</p>
<p>Graciliter non esse immediatè pulsuum inyarum causam 60. d</p> <p>Gravum mutationis humorum quomodo cognoscantur 83. f</p>	III	
<p>Medica ex pulsibus & aliis dignoscantur 103. a. b. c</p> <p>Medica quomodo possit haberi inæqualis intemperies 101. d. quomodo à putrida & ephemeris differat ibid.</p> <p>Humorum mutationis gradus ut cognoscantur 83. f</p> <p>Humores quous modum morbum cor dū impicere valeant 125. b</p> <p>Humor maximam circa, quam cum febre absq. crisi inæqualis potest facere pulsus, dom expulsi cruentur 95. a</p> <p>Humorem vitæ omnem, qui in corpore sit, esse frigidi simum 81. b</p> <p>Hydrops facies, quando pulsus habeat vndeque 152. a</p>		

I N D E X.

Morbi & cause gravitatem, absque ulla ratione vel compressione facientes quomodo in specie inter se distinguantur 69. c.
Motus duo contrarii esse posse absque ulla quiete 22. f.
Motus celer & tardus qui 12. b. motum ex quiete cognosci non possunt 12. b. motus esse continuus transgressus 1. allejo 10. c.
Motus substantia cerebri 3. f.
Motus ventricularum cerebri 3. d.
Motus cordis & arteriarum absque fibris non fieri 8. d.
Motus cordis interdum esse taciti explorandum 72. c.
Motus cordis quomodo ab humoribus possit impediri 123. b.
Musculum nullum esse absque nervo & membrana 14. b.

N.

Nervus quid 1. c.
Nervus ex spiritali medulla pullulantes omnes esse duros 14. b. f.
Nervi censualium parescentes qui 14. b.

O.

Ordinem naturae esse familiarem, inordinationem vero aduersam 157. arduum & inordinatum distinctio ibi. quando inordinatione ordinis detestari ibi. quando inordinatio detestatur ordine ibi.
Ore ventriculi affecto fieri pulsus inaequales 62. c.
Orthopneusorum pulsus 170. d.

P.

Palpitatione triplex 91. d. palpitatio propria & naturalis 113. d.
Palpitatio tenens solum motum esse operationem, non facultatem 7. d.
Palpitatio cum dicitur quomodo pulsus nomine dicitur 2. c.
Palpitatio an sit perpetua pulsuum deteriorum & interruptio ibi comes 98. b.
Palpitatio vera quomodo a pulsui differat 2. d.
Palpitatio ex flatu salda duplex 17. c.
Paraliticorum pulsus 149. f.
Partium omnium communis consensus 8. a.
Partem organicam dicitur suam qualitates contrarias continere posse 80. a.
Partes cordis propinquae quae 105. b.
Partes penitiores cor parum quomodo ventilentur 2. c.
Partium autem magnam nihil dicitur dam adhibere 16. f.
Peripneumoniam pulsus 94. b. 1. d.
Pessimum febri hectica signa 103. d.
Phlegmaticorum pulsus 108. f.
Phthoricosum affectum 108. b.
Phthoricosum potius febris quo tempore mouetur 118. b.
Pituitam vitream humorum omnium, qui in corpore sunt esse frigidissimam. 103. d.
Potentia naturalis varia species 5. c.
Potio frigida quando exhibenda 163.
Proprio quid. 33. a. quatuorplex ibi. superpartialis. ibi. superpartialis. ibi. supra bipartialis. ibi.
**Pulsus quid, solum a praesentia contemplationis pulsuum 1. c. difficultas cognoscendi ibi. e. pulsuum triplex acceptio ibi. f. pulsuum primum mouetur. 2. a. pulsus genus 2. a. pulsus quietes an sint a. dicitur. ibi. f. pulsus subiectus 3. b. pulsuum compendium. quod ex a. non esse Galeni synopsin. 4. c. opiniones de pulsuum effectu. 5. c. causa 1. c. quae sit proxima efficiens pulsuum causa ibi. c. quomodo utatur ut pulsificatio ad pulsuum elidendum ibi. d. pulsificatio virtutem accedere arteriae, non posse. 6. c. pulsus quomodo differat a vera palpitacione. 7. a. pulsuum duplex vsus ibi. pulsuum alius vsus. 8. f. 7. d. pulsuum differentia 10. d. a. f. 11. a. b. 12. c. 17. d. 30.
Pulsuum medietatem nunquam fieri ab vsu praeternaturaliter 140. d. 12. a. pulsuum motum esse pulsui sine ulla & sine arteriae molliore ac duritie, non tamen ulla absque motu 12. d. pulsuum calidum ac frigidum non dari ibi. c. pulsuum vacuum ac plenum dari ibi. f. tempus in quatuor pulsuum partibus 25. f. nec esse.**

**tractationes nec quietes pulsuum esse sensibiles. 2. b. c. logica pulsuum differentia in triplici inaequalitate genere consistere. 30. c. difficultas dignationis pulsuum in quibus consistat. 39. c. quia in pulsuum sine dignatione ibi. f. ex vario pulsuum tangendi modo quod contingit 40. d. quia pulsuum sunt commota & quae propria 44. c. quomodo excrementorum pulsuum notitia comparatur ibi. c. unde dependet comparatio non pulsuum dignatio 47. b. quomodo superlatum pulsus dignoscantur ibi. dignationis morbosus pulsus & non morbosus & veniens & tactu percipi possit ibi. d. in pulsui attendendum esse corporis dispositionem tantum, non corporis amplitudinem vel angustiam 48. a. quia etiam veniens dicatur pulsus tactui ibi. c. pulsus vbi & quomodo tangendus ibi. & collocandum brachium ibi. quomodo tangendi modum pulsui distinguat ibi. d. dubia circa pulsuum longum & latum 49. a. totam pulsui longitudinem mente potius, quam tactu comparari ibi. c. quae sint longitudinis ac breuitatis pulsuum signa ibi. c. quomodo debeat esse tangendi modum in longitudine ac breuitate dignoscenda ibi. pulsus quietem non percipi. 53. f. autem iustitiam in proponenda pulsuum causis 5. d. tres continent. pulsuum causa ibi. d. quomodo pulsus & reliqua omnia tres dicantur habere causas ibi. c. pulsus proprii facultatis valde 59. b. familiaris eiusdem ibi. c. proprii & familiaris languida ibi. d. pulsus ex gravitate causa procedentes quomodo tribuantur facultati 62. c.
Pulsus facultatem suffocata 65. a. pulsus facultatis languida ob spirituum dissonantiam 66. c.
Pulsus febrium proprius 71. c. pulsus excitati a spirituum abundantia qui. 74. d. pulsus subigitur aucta ac diminuta 75. d. pulsus inaequales ipsius vsu 27. b.
**Pulsus facultatem praeferentia causa morbi quomodo in pulsui Medici imponant ibi. d. pulsus iidem quomodo ex arteria compressione mutantur 114. b. pulsus semper per affectiones primum quam partem naturam sequi 147. a. pulsus motem proximam suam praedicentes qui 161. pulsus ante & post alimenti concoctionem qui 162. f. pulsus crisi praedicentes qui 163. 164. pulsus proximam futuram crisi praedicentes qui 164. quomodo dicitur pulsus proximam futuram crisi sciendum Gal. ibi. d. pulsus crisi per haemorrhagiam indicantes 164. a. qui per sudorem ibi. d. qui per alui fluxum ibi. d.
Pulsus summam facultatem vitalem imbecillitatem demonstrant qui 152. d.
Pulsus abolitus quomodo dignoscatur 48. d.
Pulsus aequales 15. c. aequales pulsus vsu qui 70. d.
Pulsus affectum venteris 150.
**Pulsus alius qui 12. f. quae ratio sit adhibenda in casibus alii pulsui inveniendum ibi. c. semper iste triplex alii pulsus causam 112. d.
Pulsus angina 170. d.
**Pulsus anormalem 109. b. nullum esse pulsuum vere anormalem 110. a.
Pulsus anxietatis ventriculi 350.
**Pulsus arhythmici quid 17. c. quatuorplex ibi. quid per arhythmicos ibi. quid hetero arhythmicos ibi. f. quod erythmicos 28. a. pulsus arhythmici quomodo a naturalibus recedant ibi. pulsus arhythmicos sequentes quae consentiant proportionem & excessum 32. a. rhytmicos tamen non dignosci 36. a. cum talium non fugiant rhytmicos ibi. d. quorundam opinio de rhytmicorum cognoscendo ibi. d. pulsus b. pulsuum generatio 89. c. differentia inter b. pulsantem & interruptum ibi. c.
Pulsus capriciosus 28. c. quando fiat 61. c. quomodo fiat 145. a. a qua cordis inflammatione fiat capriciosus 155. a. capriciosum etiam fieri ex commotione 125. c.
Pulsus carotidis 149.
Pulsus celer quid 10. c. quod de causis ex se celeris ac tardis pulsus dignoscantur difficultas 5. c. celerum ac tardis pulsus dignationem**********

tionem à Galeno difficiliorum esse redditam ibid. quatuor rationes, quibus antiqui celeris ac tardi pulsus dignotionem sibi composuerunt ibid. d.

Pulsus celer Archigeni quid 70. a. ex intervallo tempore non dignoscitur ac tardum pulsus ibid. Tempus & intervallo proportionem non conferre ad celerem & tardum pulsus dignoscendum ibid. f. quia sit celer pulsus Galeno ibid. 71. a. solo tactu aut mente celerem ac tardum pulsus dignoscitur secundum Gal. ibid. celer & tardus pulsus multiplex ibid. h. quia ratione celer pulsus mente fit innescigandus ibid. celer & tardus pulsus secundum Vallisium quia 52. c. pulsus celer & celerior ibid. a. omnem pulsus celeritate inaequalem esse magnum 53. a. celeritatem & fissilem nente posse percipi 56. c. celeritatem pulsus esse febrilis propriam ac perpetuam 66. b. celeritatem esse proprium suble sustinens cordis caliditatem 71. c. pulsus celeritatem esse cordis /supersalsabuli signum 78. b. omnem celeritatem esse febrilem 85. c.

Pulsuum circumventuum dignosio 85. a. Qui sunt pulsus circumventui 115. b.

Pulsus comitatus 149.

Pulsus compositi, ex quibus consentant 28. d.

Pulsuum compositorum duplo 218. f.

Pulsus compositus 28. f. 149. c. consensum in omni morbo acutus esse extenualem 161. a. cur in febris in acutis sit pernitissus ibid. Consensum esse inane in aliquo febre non omnino dupliciter praedicere affectus 6. c. pulsus consensuum vel esse vniuersalem, vel vniu. tantum arteria propriam 13. a. c. pulsus consensuum esse cum febre & cum febre 135. c. Omnia febricitantium consensuum pulsus esse etiam vibrantes ibid.

Pulsus crebris quid 11. a. Crebris duplex 72. a. Crebris pulsus aliquando esse ar. deterior, & vltimus 152. a. non omnem crebrum esse letalem 152.

Pulsus decurtatus in vnicu istu 2. f. Decurtatus pulsus triplex differentia 63. a. quomodo inter noscendus 64. a. quomodo eamgendu ibid. c.

Pulsuum decretorum seu recurrentium diffinitio esse considerationem 18. d. non fieri ad malles in eadem feriens similitudinem 19. c. opinio variis de bonum pulsuum generi 18. c. neg. tam v. tractu decretum vite comparari posse 20. a. decretum vibratus duplex ibid. b. Galeni de decreto sententia 21. b. decretum non habere bonas pulsationes eadem magnitudine aequalis ibid. c. decretum pulsus triplex ibi. decretum non carere contrahione 22. c. Inter duas decreti diffinitiones dari quidem medium, non à facultate pulsifica, sed naturaliter factam 23. a. decretum fieri ex inaequali beatitudine temperie 20. a. Audire de decreto sententia ibid. Quia sit decreti causa 21. a. decretum esse duplicem vel triplicem diffinitionem ibid. habere contrahionem medium ibid. decretum quid sit ibid. b. decretum esse crebrum ibid. c. plures esse quodque decreti diffinitiones ibid. d. decretum esse pulsus inaequalem ibid. quomodo fiat decretum ex inaequali calore ac frigore istu ibid. c. causa crebritatis in decreto ibid. f.

Pulsus decretorum duplex 20. a. Tertia & nona decreti causa 92. b. quomodo ab expultrice & sensu facilius fieri dicitur ibid. b. Quando & vltimae fuerint decreti à praedictis facultatibus 93. a. cum qua palpatione cordis decretum reperitur ibid. b. In quo affectu pulsus decretum habere adesse causam cordis & arteriarum expultrices insonum 94. a. quomodo diffilant omni pulsus decretos efficiant ibid. d. decreti fieri etiam ex irritatione 95. a. ab interuentione speciei non differre 96. b. quanto excruciat 98. c.

Pulsus decretorum magna ex parte esse inaequalem, quomodo eam aqualem 100. b. anadu quo Galenus ostendit, quomodo

decretum esse inaequali cordis intemperie ortu differat ab eo. quid ex instrumentorum virtute confertur 100. a. decretum nunquam fieri ex inaequali intemperie ibid. d. quomodo fiat 105. a. decreti duri generatio 105. Quomodo ex decretis non admodum sint periculosi 105. Quando de decretis bene aut male spectandum ibid. c. omnium decretorum vibrati quomodo non vibrati causa 123. d. modum, quo generantur isti decreti ibid. c. diffinitio decreti vibrati à non vibrato 126. a. decretum in omni corpore arteriarum reperiri ibi. c. decretum ex varia manu applicatione variis modo mutari ibid. nullum decretum duri fieri eo modo, quem ponit Galenus 127. b.

Pulsus decretum ex inaequali intemperie prodians, quomodo à duro distinguatur 127. d. decretos duros tam ex seride, quam ex partibus cordis praenatum fieri ibi. f. vibratum decretum quando generatur 128. c. vibrati decreti sanja ibid. f. cur vltim angustari non dicant non vibrati 129. c.

Pulsus dispares in vnicu istu 14. c. pulsus dispar quomodo fiat 61. d. ad granatam spectare facultatem ibid. f. d. spars vniu. non carere calore 63. b. omnem pulsus disparem habere aliquam inaequalitatem 65. f. vniu. istu d. sparsitatem esse febrilem inaequalitatem 85. d. quomodo 85. c. unde pulsus dispares fiat 84. f. Dispare pulsus vni & sine febre 149. a.

Pulsus dispar triplex 105. a. dispar aequaliter, inaequaliter & vltimam speciem 105. d. in quibus affectibus dispari praedicti inueniantur ibi. c. in febrili partibus quomodo dispari aequaliter 106. b. qui dispares pulsus omnium in maxime letales 156. d. dispar vniu. vniu. aut non sint periculosi 158. d. dispari inaequaliter celeritate esse reliquos periculosiores 159. a. Quomodo dispares sint periculosi ibid. cur dispares in acuto sint reliquos periculosiores ibid. d. dispari tam aequaliter, quam inaequaliter, quomodo fiat seu utendum Galen. 23. c. a. maliter nunquam ex gerente materia excutit ibid. c.

Pulsuum disparum inaequaliter affectus 124. b.

Pulsus dolorum 148.

Pulsus durus quid 11. b. durum & mollem duris modo inter se distinguunt 54. c. durum pulsus nunquam esse magnum ibid. c. modum saltem deprehendi ibid. f. pulsus durum esse instrumenti proprium 65. f. Qui affectus ex hoc cognoscantur 111. a.

Pulsus durus, quando sunt ex iustis non ibi in inflammatione 146. d. modi quibus leui duritiei cum multa arteria molitiae notatur 110. f.

Pulsus emittimus quomodo dignoscendum 64. b. quomodo tangendum ibid. c. emittimus proprium mortuum esse pulsus 65. f. bonum proximum causam non esse mortuum 66. a. quomodo fiat 116. a.

Pulsus empyematia 150.

Pulsus epilepsia 149. f.

Pulsus facilius instrumenti 110. b.

Pulsus formicantes 27. d. 64. c. quando formicantes sint letalissimi 152.

Pulsus frequens quid 52. c. 54. a. frequentia duplex causa 17. b.

Pulsus heticus 28. d. quid 29. c.

Pulsus hydrops 150.

Pulsus inaequalis duplex 15. c. pulsus inaequalis sub variis dignis considerari duplex 21. c. pulsus omnem aequalem esse etiam ordinatum, non omnem inaequalem mortuum 25. c. inaequales pulsus cipsi 28. b. omnem pulsus inaequalem esse longiore & debiliore ad granatam spectare facultatem 61. a. ex quibus affectibus fiat 68. c. d. inaequalem intemperiem inaequales parere pulsus 72. c. ex qua intemperie inaequalis fiat 78. a.

Pulsus inflammationum 148.

Pulsus inuolutus 66. d.

Pulsuum inuolutum dignosio 61. a. Qui sunt pulsus inuoluti 115. a.

Pulsus proprii instrumenti 110. b
Pulsus intercurrentes 16. d. intercurrentem fieri ab expultricis irritamento 96. a. à dicto specie non differre ibid. b. intercurrentem ratione crebilitatis esse inaequalem, & inde hoc crebilitas 10. 6. c. pulsus intercurrentis quomodo sit lethalis 158. c. quando sit lethalis ibid. intercurrentes non indicare signum proxime futurum 16. d. intercurrentia causa 142. d
Pares, qui intercurrentem efficerent pulsus 145. b. intercurrentem nunquam fieri ex causis frigidis ibid. omnem intercurrentem esse summe crebriorem ibid. c. intercurrentis crebrius ibid. c. symptomaticum ibid.
Pulsus intermittens 16. e. fieri ex facultate imbecilla 41. c. item ex producta raritate & aucta refrigeratione ibid. quid proprium habeat ratione languida facultatis 64. f. intermittentem fieri ab expultrice irritamento 96. a. non omnem intermittentem dictum communi 145. **intermissionem** frequenter facilitam omnium esse periculosissimam 154. intermissionem ordinatam deteriorem esse inordinatam ibid.
Pulsus intermittentem inordinatam ordinatam esse deteriorem 157. a. intermissionem duplex d. differentia 130. a. intermittemes esse dicto communi 130. b. quas sequatur causas pulsus intermittens 140. a. pulsus intermittens varias obtrine inaequalitates ibid. c. cur pulsus intermittens non semper, sed per intermissione intermitat ibid. c. intermittens cum & sine febre 141. d. locum quo sit intermittens ibid. c.
Pulsus interruptus quid 137. f. quae cum d. differentia 138. a. pulsus sub variis digitis interrupti differentia 23. c. ad granatam spectare facultatem 41. f. omni pulsus interruptum habere aliquam magnitudinem 66. f. quae pulsus interrupti nominis intelligendum 87. b. alii interrupti pulsus ibid. non solum inaequalem v. sicut esse interrupti causam ibid. c. ex inaequali caloris & frigoris vi fieri interruptum vltimum differentis parte amittentis 88. d. differentia inter lui pulsantes & interruptum ibid. e
Pulsus interrupti quomodo ab expultrice & sensuina facultate cordis fiat 92. c. tres interruptorum species ibid. d. cum qua palpitatio cordis interruptum reperitur 93. b. in quousque sit interruptum pulsus habentem adesse causam cordis & arteriarum expultricis infensam 94. a. quando distillationes pulsus interruptum efficiant ibid. d. quomodo fiant 98. c. 145. a. interruptum pulsus quomodo habere tria quosdam quatuor tempora 116. a. interruptorum distinctio ibid. qui sunt determinati ibid. in interruptu facultatem nunquam summe languere ibid. pulsus in uno ista esse interruptum non duobus modis considerari 156. b.
Pulsus interruptorum tres differentia 156. b.
Pulsus languidus quid 121. a. quomodo premitendo percipi 40. d. quod palpando sit dignoscendum ibid. c. 54. b. d. solum facultatem languorem esse causam proximam 60. a. non omnem languidum esse lethalem 152. b.
Pulsus laevis in quibus affectibus reperitur 122. d
Pulsus lethargicus multum esse cum insensu 131. e
Pulsus longus qui 122. b. item causa secundum Gal ibid.
Pulsus magnus quid 14. b. maximum & tardum stare simul non posse 12. b. maximum ac durum 42. a. specificam magni ac parui pulsus differentia 47. d. Galeni de magni & parui sententia ibid. e omnem magnum ac paruum pulsus quodammodo esse comparatum ibid. c. qui magnus & parvus pulsus se deorsum ibid. magnus pulsus in parua fieri arteria ibid. magnus pulsus dupliciter fieri 74. d
Pulsus magni ob calorem auctum dignior 74. b. quomodo differentia inter se magni pulsus quae excitat spiritus defectus ab eis quas facit caler auctus ibid. c. Quid pulsus magnitudinem impedit, ibid. d. varia magnitudinis in pulsibus differentia 113.

Pulsus moderatum modis esse tangendum 41. e. qui pulsus moderatus 34. c. moderatus & immoderatus & saltu & mure dignoscitur ibid. ubi reperatur moderatus, ibid. quo bonum moderatum saltu reperitur ibid. c. tangendi modus in moderato ibid. quomodo immoderatus per se dignoscatur ibid. f. moderatus pulsus celeritate atque 34. d
Pulsus molis quid 11. b. **molis** saltu deprehenditur 4. f. pulsus mollem esse instrumenti proprium 95. f. quas sequatur causas 110. c. in quibus affectibus fiant 111. b
Pulsus myrtus quomodo d. amittit inaequales 15. e. quae cum differentia ibid. f. esse duplicem differentiam 59. e. paritatem in myrtus duplici causa ibid. myrtus solum inlequi facultatem exolutam 60. d. gracilitate non esse immutata d. myrtus causam ibi myrtus facultate exoluta & ex eadem partem exoluta, partem oppressa 63. c. modum myrtus dignoscitur ibid. e. myrtus deficiat cognoscatur ibid. a. nullam myrtus terat periculo 153. d
Pulsus myrtus quomodo in primis periculis pulsus mollem esse referenda 154. d
Pulsus naturalium termini quomodo comparantur 41. f. quod ad naturalem & non naturalium dignoscitur requiratur ibid. naturalis pulsus etiam inveniatur pulsus acquiri 46. b. quae ratione studiorum naturales pulsus in causa dignoscatur ibid. c. quae sint non naturalium causas ibid. d. dignoscentes esse explicatum non naturalium causas non facultatis ibid.
Pulsus nominati & inordinati 16. b
Pulsus ordinatum & inordinatum habere inter se medium 25. d
Pulsus orthopneusticum 130. c
Pulsus palpitantes qui 137. f. quomodo fiant 145. a. quae eorum causa 136. e
Pulsus paralyticorum 149. f
Pulsus parvus quid 14. b. paruum pulsus in magna etiam fieri arteria 47. f. brevis tempore v. etiam parvus pulsus in arse 10. e. non omnem paruum esse lethalem 152. b
Pulsus peripneumonicorum 142. b
Pulsus phreneticorum 143. b
Pulsus plenus ac vacuum d. 12. f. à Galeno 146. e. non admitti 13. a. quae modo dicatur ibid. prima eius significatio ibid. b. quid secunda ibid. c. quid tertia & quarta ibid. f. pulsus plenus quomodo à magno differat 14. c. a Galeno non admitti 55. a. plenus ac vacuus pulsus quid ibid. b. plenum pulsus non carere illu ibid. d. ad pleni & vacui pulsus dignoscitur & saltu & mure opus esse ibid. e. quid observandum in taliu pulsus pleni ibi, quae eorum causa & affectus 111. f. 112. a. quando & ubi fiat pleni & vacui pulsus inaequalitas 118. d
Pulsus rari quid 12. a. 52. f. 53. e. 54. a. raritas duplex 72. e. rarus pulsus crebris esse deterioribus 152. quando rarus sit lethalis 152. non omnem rarum esse lethalem 152. b
Pulsus serratus 28. e. serratum pulsus raris modis maximum minari periculum 159. f. serratus inaequalitatem nec solus nec omnia plenitudo esse signum 133. f. serratum inaequalitatem saltu solum & magnam arguere plenitudinem 134. a. serrata inaequalitatem causa 159. b
Pulsus strepens 30. a. b. d. pulsus strepens in causis opiniones 110. e. pulsus strepens ab auctore observatus 139. b. pulsus strepens ibid. d
Pulsus tardus quid 10. f. tarditatem esse frigiditatem propriam 11. d. **tarditatem** nomine quid Galenus audiat ibid. **inagratia** tarditatem quae sequatur causas 85. c. non omnem languidum esse lethalem 152. b
Pulsus tremulus quomodo fiant 145. e. quando fiat periculosus 162. a. quomodo à palpitante differant 116. a. unde habent nomen. ibid. quando fiat tremulus arteriarum motus ibid. b.

I N D E X.

Pulsus vehemens quid sit. a eius duplex consideratio ibid. c. dari
vehementer naturalem ibid. d. in hoc distinguendo premen-
dam potius esse arteriam 40. a. quid facientium, ut pulsus, qui a
maxima & vehementissima parum defleunt c. cognoscantur
37. d. quid sit 74. b. quando a reliquis distinguatur ibid. quomodo a
conuulsio & vibrato ibid. e

Pulsus vermiculosus 29. b. quando ab vndoso differat ibid. c. Om-
nibus vermiculosus sequi immo dicitur c. corpori euasuationes 159. a. in
quibus casibus vermiculosus necessario sint lethales ibid. quando
sint determini ibid. vermiculosus pulsus casus alius ef-
fectus ab vndoso 122. f. vermiculosus ab vndoso sola distinguuntur
paritate ibid.

Pulsus vibratus 28. f. vibratum solum existentem indicare sa-
lutaritatem vobis. 160. f. vibratum aliu pulsuum prauu conexum
prauum euadere ibid. vibratum discretu quando generetur 128. e. vibrati
discreti causa ibid. f. in quibus affectibus fiat 124. d. quando fiat
continua vibratio & quando periodica 129. bina pulsationu causa in
discretu vibratu 130. e

Pulsus vndosus 29. b. quomodo a vermiculoso differat ibid. c. quomodo
fiat 114. a. fieri ex arteria molliori 115. a. in quibus effec-
tibus reperitur ibid. quando vndosus praesentatur indicet
periculum 159. quando longiores affectus ibid. quando non sit
pulsationu causa 130. b. hydropis species quando habeat pulsus vndoso-
sus 122. e. alius esse vndosus alius vermiculosus pulsus 129. a. 132. f.
quomodo vndosus a vermiculoso differant & quomodo cum eo-
dem committantur ibid. vndosus quomodo fiat 136. e

Putredinis signa 66. d. 107. e

Q.

Qualitatem contrarietatem triplicem concursus 72. f

Qualitates duas contrarias simul esse non posse. 80. e

Qualitates duas contrarias possunt simul in vna parte organica
reperi posse 80. e

Qualitas arteriarum vitium perinde possit mutare eorum tempe-
ricum ut qualitas cordis 79. b

Qualitatem venenata signa 66. e

Quotes an sine actione 2. f

R.

Raritas pulsus duplex 72. e

Refrigerationis causa 78. d. e

Rhythmus quid sit. a. quae eius significatio ibid. quid rhythmus in
pulsibus ibid. f. quid rhythmus *Herophili* 26. b. rhythmi secon-
dum antiquiores diuisio ibid. d. quid sit iuxta Galenum ibid. f. quae
eius differentia secundum eundem ibid. pariu rhythmo-
rum diuisio 27. a. imparium differentia ibid. qui rhythmi sub
sensum cadunt ibid. b. puerorum rhythmus esse pariu reliqua-
rum aetatum imparis esse ibid. c. alia rhythmoru diuisio ibid. vnde
rhythmi & celeritatem inaequalitates in vno actu 34. e

Rhythmorum inaequalitas quid annunciet 128. b

Rhythmi pulsuum inaequales quando 128. d

S.

Salutis modum demonstrari ab affectu & loco 151

Salutis praedictio vnde sumenda 151

Salutis tempus vnde praedictur 162. f

Salutis tempus quando expectandum 131

Signum certum putredinis 107. d

Signa putredinis & venenata qualitatis 66. e

Soni quid 116. l

Spiritus ex inanitione non fieri ob nervorum siccitatem 161

Spacium in tempore quid sit 26. e

Spiritus non nutritis sed generari 10. b

Spiritus abundantia quos spiritus excitet 24. d

Spiritus concutere ad elidendo pulsus 55

Spiritus animalem reuocari potius ex animali quam ex aere 9. e

Spiritus corporis qui attracto aere reficitur 9. e

Spiritus insitum ex duplici oriri materia 6. d

Spiritus insitum ex se non facere pulsus ibid.

Spiritus praecipuus pulsus auctor quoniam 6. b

Spiritus per arteriarum cavitatem meantem non excitare pul-
sum 6. b

Status morbosus ex praecognita naturalium & non naturalium
pulsuum notitia deperdet 45. e

Substantiam Gal. sit percipibilem non esse pulsus instrumentum 62. d

Suffocatio vteri quos proferat pulsus 150

Systolen aquae esse motum ac diastolen 3. b

Systolen non esse arteria subdiastolen 6. e

Systolen ex spatio temporis totius intervalli cogiti posse 26. d. Ga-
lenum in systole diagnoscenda multos consumpsisse annos 39. a.
an secundum Gal. sit percipibilem 42. a. in systole diagnoscenda
valida opus esse compressione ibid. d. systoles illam non motum
quandoque deprehendi 43. e. quinam systoles illius sentiantur
ibid. c. cum systoles reflexa linea percipi ibid. c. qua requirantur
ut systoles illius percipiatur ibid. cur debeat diagnoscere systo-
le ibid. d. motum tantum systoles partem esse sensus obtin-
am ibid. e.

Systolen non dignosci ex reditu pulsa digitorum in suum locum
42. d. systoles motum esse insensibilem 51. e. systole latente
debet fieri distinctionem ad intervalli proportionem 56. d. Sy-
stoles & celeritatem mente posse percipi posse 5. d. alius modus
quo celeritas & tarditas systoles deprehendatur 37. d. quomodo
systole cognoscatur 73. e. f

T.

Tarditas & celeritas inaequalis quod modum comparatur 51. e

Tarditas autem pulsus esse frigiditatem propriam 6. d. tarditatem no-
mine quod Galenus audit ibid.

Temperies cordis vitium perinde possit mutari a qualitate arto-
riarum ut a qualitate cordis 79. b

Tempus cum spatio collationem considerato multum interesse
12. d

Tempora febrium quomodo diagnoscantur 83. e

Tumorem species & materia quomodo inter se distinguantur
69. d

V.

Ventriculi affectuum pulsus 150

Ventriculi ore affectu fieri pulsus inaequales 62. e

Virtutem pulsificam accedere arteriis non existere 6. d

Vita instrumentorum dupliciter considerari 37. e

Vitus instrumentum quod modum complicitatur 119. f

Vitus cum instrumentum duodecim coniugationes 120. d

Vitus a causa praeternaturali autem nunquam efficere motu-
raturum pulsus 12. e

Vteri suffocatio quos proferat pulsus 150

Vteri affectu fieri inaequales pulsus 62. d

ERRATA.

Fol. 2. lin. 15. in crebrius. ibid. lin. 20. fuerit. f. 4. l. 17. tuncitatem
f. 6. in marg. a. arteria duplicem continet spiritum. ibid. in marg.
c. videretur. fol. 7. in marg. b. eger. f. 8. l. 37. patens. f. 15. 22. secun-
das. f. 19. l. 10. quae. f. 23. l. 15. habere locum. f. 26. l. 20. quod. f. 35. b.
4. quidem. f. 62. l. 2. grauius. f. 63. l. 16. motum. f. 66. l. 22. quadam
f. 69. l. vlt. parvulenta. f. 80. l. 4. tamen. f. 83. l. 42. varia. f. 83. l. 50.
confirmat. f. 94. l. 10. Sal. ibid. l. 45. patens. f. 105. lin. vlt. vnde
tate. f. 107. l. 11. arguitur. f. 112. l. 28. annuam. f. 114. l. 37. Ga-
leno. f. 116. in marg. f. facti inaequales. ibid. l. vlt. tuberculi non. f.
137. l. 5. pulsus autem. f. 118. l. 1. remissiones. f. 139. l. 6. esset. fol. 133. d.
6. intra. f. 144. l. 13. e. post.

R I N I E



